

18高虫防第93号
平成18年10月4日

各位

病虫害防除所長

平成18年度病虫害発生予察技術情報第13号（ハスモンヨトウ）について

フェロモントラップによる雄成虫の誘殺数は、県東部から中央部の香南市野市町にかけては、平年より多めで推移しています。同地域では9月上旬には平年並まで落ち込みましたが、中旬以降上昇に転じ、特に香南市野市町では発生の多かった昨年を上回る誘殺数となっています(図1)。

県農業技術センター（南国市）の卵塊数調査では、8月下旬から9月中旬にかけて平年を上回りましたが、その後は少なく推移しています(図2)。各地区における卵塊調査でも、1昨年よりは多いものの昨を下回っています(表1)。また、県中西部から西部にかけての誘殺数も平年より少ない推移を示していますが、向こう1ヶ月の気象予報によると、気温は平年並みか高い、降水量は平年並か少ないと見込まれ、密度の上昇も考えられますので、ショウガ等の露地作物や定植後の果菜類では注意が必要と思われます。

なお、病虫害防除所ホームページ（発生状況速報）ではフェロモントラップ調査結果等を随時更新していますので、参考になしてください。

ホームページアドレス：<http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/byoki/boujosho/>

問い合わせ先
病虫害防除所 西
TEL 088-863-1132

表1 各地区のハスモンヨトウ卵塊調査結果（サトイモ50株当たり）

時期	調査年 調査地点		平成18年(2006年)		平成17年(2005年)		平成16年(2004年)	
			調査日	卵塊数	調査日	卵塊数	調査日	卵塊数
9 月 中 ・ 下 旬	安芸市	川北	9/27	15	9/29	18	9/24	3
	安芸市	井ノ口	9/27	9	9/29	14	9/24	5
	※安芸市	黒鳥	9/27	11	9/29	21	9/24	6
	越知町	今成	9/20	3	9/21	1	9/17	1
	いの町	枝川	9/20	1	9/21	1	9/17	1
	須崎市	上分	9/27	0	9/15	0	9/21	0
	津野町	三間川	9/27	5	9/15	2	9/21	6
	中土佐町	久礼	9/27	2	9/16	1	9/21	2
	中土佐町	上ノ加江	9/27	4	9/16	1	9/21	8
	津野町	船戸	9/27	0	9/15	1	9/21	0
	四万十市	竹島	9/19	1	9/29	6	10/4	2
	四万十市	古津賀			9/29	11	10/4	3
	四万十市	間崎	9/19	1	9/29	6		
	平均		4.3		6.4		3.0	

※平成16年は田野町、

図1 各地区のフェロモントラップにおける雄成虫の誘殺数（9月5半旬まで）




図2 サトイモにおけるハスモンヨトウ卵塊数（南国市、農業技術センター内）

