

各位

高知県病虫害防除所長

平成18年度 病虫害発生予察技術情報第1号（カンキツ黒点病）について

本病については、5月下旬に実施したカンキツ園の巡回調査で、県中央部から東部にかけての中晩柑類の春葉で発生が多く、中央部、東部とも平年に比べほぼ1.7倍の発生面積となっています。さらに、本病に比較的強い温州ミカンにおいても、県中央部で平年の発生面積のほぼ7倍と多くなっています（表1）。昨年は春葉での発生は多かったものの、6月以降は天候に恵まれたこともあり、果実での発生は平年並か少なく推移しました。しかし、本年は向こう1ヶ月予報で降水量は平年並か多い、日照時間は平年並か少ないと予想されることから、今後、果実での発生の増加が懸念されますので、これからの気象情報や果実への発病状況などに留意し、防除対策の徹底を図ってください。

防除対策等

- ・保菌した枯枝は伝染源となるので、できるだけ除去し、園外に持ち出してください。
- ・降雨が予想される場合は、事前に薬剤による予防散布に努めてください。
- ・薬剤防除にあたっては各地域の防除暦を参考に、農薬使用基準を遵守するとともに、周辺に他の農作物がある場合は飛散防止の対策を講じたいうえ実施してください。

表1 カンキツ類における黒点病の地域別程度別発生面積(春葉) 単位:ha

樹種	年別	地域	発生程度				
			甚	多	中	少	計
中晩柑	本年	東部			32	49	81
		中央部			32	194	226
		中西部				83	83
		西部					0
		合計	0	0	64	326	390
	平年	東部			18	30	48
		中央部			45	93	138
		中西部			42	42	84
		西部			16	48	64
温州ミカン	本年	中央部				100	100
		中西部					0
		西部					0
		合計	0	0	0	100	100
	平年	中央部				15	15
		中西部			1		1
		西部			1	6	7
		合計	0	0	2	21	23

ホームページアドレス：<http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/byoki/boujoshou/index.html>

問い合わせ先
病虫害防除所 西、西岡
TEL 088-863-1132