

各 位

病害虫発生予察技術資料について

高知県病害虫防除所長

平成15年度病害虫発生予察技術資料第2号を送付します。

高知県版BLASTAM (AMeDASデータを用いた葉いもち感染予測システム)の結果について

5月第2半旬から、県内でBLASTAMによる感染好適条件が出現しています(第1表)。

感染好適条件が、連続して広い地域で出現した場合、通常それから約1週間～10日後、広域に葉いもちの初発生が認められるようになります(全般的初発生時期)。さらにこの全般的初発生時期から約1週間～10日後に、発病の増加が始まります(発病増加開始期)。通常、この時期が粉剤等による一般的な防除適期となります。

週間天気予報でもここ数日は曇雨天が予想されているため、今後、感染好適条件及び準感染好適条件が連続して発生した場合、箱施用剤等で防除を行っていないほ場では葉いもちが多発生する可能性がありますので注意が必要です。

第1表 高知県版BLASTAMによるいもち病の感染好適条件の判定結果:5月12日現在(平成15年度分)

日付	本川	本山	大栃	高知	後免	安芸	梶原	須崎	窪川	室戸岬	江川崎	佐賀	宿毛	中村	清水
4/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/07	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
5/08	-	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	●	●	-
5/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<用語説明>

好適条件(●):

葉面湿潤条件が充分で、湿潤時間中の平均気温が15～25℃、前5日間の平均気温が20～25℃であり、葉いもちの大量感染に好適な気象条件が出現した場合。

準好適条件(○):

葉面湿潤時間は充分であるが、その他の条件が一部不足している場合。これが続いても発病が始まるので注意が必要。

* 移植20日後程度までの好適条件の出現は、いもち病菌の感染に無効であり、BLASTAMの適用開始時期はそれ以降とする。

下記のホームページに詳しい情報やメッシュ(5km四方)気象でのBlastam適応地域を記載しています。

<http://www.nogyo.tosa.net-kochi.gr.jp/byoki/boujoshou/>