

平成 14 年 7 月 4 日

各 位

病虫害防除所長

病虫害発生予察技術情報資料第 6 号の送付について

早期稲の斑点米カメムシ類の発生状況（県中央部）について、別添のとおり資料を送付しますので、防除指導の参考にしてください。

カメムシ類の発生は、県中央部の極早稲種（乳熟期）中心にやや多い発生です。穂揃期以降カメムシ類の発生が見られるほ場では、カメムシ類の吸汁による斑点米の発生が予想されますので薬剤による防除が必要です。防除適期は出穂 10 日後及びその 5 ～ 7 日後ですが、詳細については県病虫害防除指針を参照してください。

なお、県下全域の発生状況については 7 月 10 日頃に発表する予定です。

平成14年度県中央部における早期稲すくい取り調査結果（捕虫網50回振り）

孕：穂孕期、始：出穂始、揃：穂揃期、乳：乳熟期、糊：糊熟期、-：欠測

調査場所	調査日	()	ミナミアオカメムシ			ホソハリカメムシ			クモヘリカメムシ			トゲシホシカメムシ			その他斑点米カメムシ類	合計
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		
夜須町 坪井	1	7/1	(始)													
	2		(揃)			1		1	1		1					
	3		(始)			1		1		1	1					2
香我美町 岸本	1	7/1	(揃)													
	2		(揃)				1	1		2	2					
	3		(揃)													3
吉川村 吉原	1	7/1	(揃)				1		1							
	2		(揃)													
	3		(揃)	1		1									アカシ成 8 & アカヒゲホリ成 2	11
野市町 富家	1	7/1	(始)						1		1					
	2		(始)			1		1								
	3		(揃)			3		3							ヒメナガ成 2	3
土佐山田町 戸板島	1	7/1	(揃)				4		4							
	2		(揃)			1		1								
	3		(始)													
南国市 日章	1	7/1	(乳)	6		6	1		1	1		1			アカシ成 1	8
	2		(乳)	48		48	4		4	3	1	4			ヒメナガ成 1	57
	3		(糊)	9		9	4		4	5		5			シラホシ成 1	19
南国市 前浜	1	7/1	(糊)	6		6	1		1							
	2		(糊)	1		1										
	3		(乳)	2		2	1		1						アカシ成 1	4
南国市 三和	1	7/1	(乳)	11		11										
	2		(乳)	1		1										
	3		(揃)	9		9									アカシ成 1	10
南国市 十市	1	7/1	(揃)													
	2		(始)													
	3		(始)													
南国市 住吉野	1	7/1	(乳)													
	2		(乳)													
	3		(乳)													
南国市 立田	1	7/1	(乳)	15		15									アカシ成 1	16
	2		(乳)	1		1										
	3		(乳)	1		1					1		1			
南国市 長岡	1	7/1	(始)													
	2		(乳)													
	3		(乳)	1		1	2		2							
南国市 国府	1	7/1	(揃)				1		1							
	2		(乳)				2		2				1		アカヒゲホリ成 1	1
	3		(乳)												アカシ成 1、アカヒゲホリ成 1	4
南国市 岡豊	1	7/1	(乳)							2		2				
	2		(乳)												ヒメヒラ成 1	1
	3		(乳)	5		5			1		1					
南国市 久礼田	1	7/1	(乳)	1		1	3	1	4	2		2			シラホシ成 1	8
	2		(乳)	6		6	12	1	13	3		3			シラホシ成 2、アカヒゲホリ成 1、アカヒゲホリ成 2	27
	3		(始)													
高知市 布師田	1	7/1	(乳)												アカヒゲホリ成 9	9
	2		(乳)													
	3		(乳)												シラホシ成 2、アカヒゲホリ成 1、アカヒゲホリ成 1	4
高知市 介良	1	7/1	(乳)				1		1							
	2		(乳)						1		1				アカヒゲホリ成 1	1
	3		(乳)						1		1					
高知市 高須	1	7/1	(乳)													
	2		(乳)													
	3		(揃)													
高知市 五台山	1	7/1	(乳)													
	2		(乳)													
	3		(乳)												シラホシ成 1	1
高知市 朝倉	1	7/1	(乳)	3		3	2		2	1		1			シラホシ成 3	9
	2		(揃)						2	1	3				アカヒゲホリ成 1	4
	3		(乳)	7		7	2		2	12	1	13			アカヒゲホリ成 3、ヒメナガ成 1	26
伊野町 是友	1	7/1	(始)													
	2		(始)													
	3		(揃)				2		2	56	3	59			ブチヒゲホリ成 2	63
日高村 日下	1	7/1	(始)				1		1							
	2		(始)						10		10	2				
	3		(始)				1		1	2		2	1	2	ヒメナガ成 1、アカヒゲホリ成 1、アカヒゲホリ成 1	7
1 ば場当たりの密度				2.0		2.0	0.8	0.0	0.8	1.6	0.1	1.7	0.1	0.1		0.8
平年 (平成8～13年)				0.2		0.2	1.0		1.0	1.2		1.3	0.2	0.2		1.3