

平成13年7月6日

各 位

病虫害防除所長

病虫害発生予察技術情報資料第6号の送付について

水稲（早期稲）の斑点米カメムシ類の発生状況について、別添のとおり資料を送付しますので、防除指導の参考にしてください。

カメムシ類の発生は、中央部、中西部、西部ともに平年並～やや多い発生ですが、穂揃期以降カメムシ類の発生が見られるほ場では、カメムシ類の吸汁による斑点米の発生が予想されますので、県病虫害防除指針に準じた防除指導の徹底をお願いします。

第1表 県中央部におけるすくい取り調査結果

場所	調査日	ミナミアオカメムシ		ホソハリカメムシ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		その他斑点米カメムシ類	合計					
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼			計				
夜須町 坪井	1		3	3		0	5	1	6	アカスジ成1	10					
	2	7/2		0		0	3		3		3					
	3			0		0		1	1		1					
香我美町 岸本	1			0		0	1	1		ヒメナガ成1	2					
	2	7/2		0		0		0			0					
	3			0		0		0		アカヒゲネソミドリ成1	1					
吉川村 吉原	1		2	2	1	1		0		アカヒゲネソミドリ成3, ヒメシラタナガ成1, ヒメナガ成7	14					
	2	7/2	1	1		0		0			1					
	3			0		0		0			0					
野市町 富家	1			0	1	1		0			1					
	2	7/2		0		0		0		アカヒゲネソミドリ成1	1					
	3			0	2	2		0			2					
土佐山田町 戸板島	1			0		0	1	1	2	シラネシ成2, アカヒメハリ成1	5					
	2	7/2		0	9	9	1	1	1	シラネシ成5	16					
	3			0		0		0			0					
南国市 日章	1			0	1	1	1	1			2					
	2	7/2		0	3	3	1	1	3	アカヒゲネソミドリ成1, アカスジ成2	10					
	3			0	2	2		0	4	アカスジ成1	7					
南国市 前浜	1			0		0		0		アカヒゲネソミドリ成1	1					
	2	7/2		0		0		0	1	クロネシ成1, マルシラネシ幼1	3					
	3			0		0		0		アカヒゲネソミドリ成1	1					
南国市 三和	1			0	1	1		0	3	アカスジ成1	5					
	2	7/2		0		0		0		アカヒゲネソミドリ成25	25					
	3			0	2	2		0			2					
南国市 十市	1		1	1	2	2		0	1	クロネシ成1	5					
	2	7/3		0		0		0			0					
	3			0	1	1		0			1					
南国市 住吉野	1			0		0		0		アカスジ成2	2					
	2	7/3		0		0		0		ヒメナガ成1, ヒメシラタナガ成1	2					
	3			0		0		0	1	シラネシ成2	3					
南国市 立田	1			0		0		0	1	アカヒゲネソミドリ成9, アカスジ成1	11					
	2	7/2		0		0		0	1	シラネシ成2, アカヒゲネソミドリ成2	5					
	3		1	1		0		0		アカヒゲネソミドリ成8	9					
南国市 長岡	1			0		0		0	1	1	1					
	2	7/2		0		0	1	1		シラネシ成1	2					
	3			0		0		0			0					
南国市 国府	1			0		0		0			0					
	2	7/2		0		0	1	1	1		2					
	3			0		0		0			0					
南国市 岡豊	1			0		0		0			0					
	2	7/2		0		0		0			0					
	3			0		0		0			0					
南国市 久礼田	1			0	1	1		0		アカヒメハリ成2	3					
	2	7/2		0	6	6		0			6					
	3		1	1	8	8	18	18	1	シラネシ成1, アカスジ成2, アカヒメハリ成1, プチヒゲハリ成	33					
高知市 布師田	1			0	1	1		0		アカヒゲネソミドリ成4	5					
	2	7/2		0		0		0		アカヒゲネソミドリ成5	5					
	3			0	2	2		0		アカヒゲネソミドリ成1	3					
高知市 介良	1			0		0		0	1	1	1					
	2	7/2		0		0	1	1			1					
	3			0	1	1		0	1	1	2					
高知市 高須	1			0		0		0		ヒメナガ成1	1					
	2	7/2		0		0		0		アカヒゲネソミドリ成2	2					
	3			0	1	1		0		アカヒゲネソミドリ成2	3					
高知市 五台山	1			0	2	2		0			2					
	2	7/2		0		0		0			0					
	3			0		0		0		アカヒゲネソミドリ成2	2					
高知市 朝倉	1			0		0	2	2		アカヒゲネソミドリ成4	6					
	2	7/3		0		0		0			0					
	3			0		0		0			0					
伊野町 是友	1			0	9	9	16	5	21	4	4	アカヒメハリ成2, アカヒゲネソミドリ成1, ヒメナガ成1	38			
	2	7/3		0		0	3	3	1	1	シラネシ成1	5				
	3			0		0		0		アカヒメハリ成2	2					
日高村 日下	1			0		0		0	1	1	1					
	2	7/3		0		0		0			0					
	3			0		0	3	3		アカヒメハリ成1	4					
合 計			9	0	9	55	1	56	57	8	65	28	0	28	123	281
1ほ場あたりの密度			0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.8	0.9	0.1	1.0	0.4	0.0	0.4	1.9	4.3
平年（平成8～12年）			0.2	0.1	0.3	1.0	0.0	1.0	1.3	0.0	1.3	0.2	0.0	0.2	1.2	4.0

第2表 県中西部におけるすくい取り調査結果

場所	調査日	ミナミアカメシ			ホソハラカメシ			クモヘリカメシ			トゲシラホシカメシ			その他斑点米カメシ類	合計
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		
春野町 弘岡上	1			0			0			0			0	アカヒメヘリ成1	1
	2			0			0			0			0		0
	3	3	3	3	4	4	4	1	1	1	3	3	3		11
春野町 森山	1			0			0			0			0		0
	2	7/3	2	2			0			0			0		2
	3			0			0			0			0		0
春野町 西分	1			0	1	1	1			0			0		1
	2	7/3		0			0			0	1	1	1		1
	3			0	1	1	1			0			0		1
春野町 諸木	1		1	1	2	2	2	5	5	5			0	アカヒゲホソミドリ成7	15
	2	7/3		0			0			0			0		0
	3			0			0			0	2	2	2	シラホシ成1, アカヒゲホソ成1	4
土佐市 新居	1	出穂前		0			0			0			0		0
	2	出穂前		0			0			0			0		0
	3	出穂前		0			0			0			0		0
土佐市 高石	1			0	6	6	6	3	3	3			0	アカヒメヘリ成5	14
	2	7/3	20	20	1	1	1	3	3	3	3	3	3	ヒメヒラタナガ成1	28
	3			0	2	2	2			0	3	3	3		5
土佐市 高岡	1		1	1	4	1	5	9	9	9	12	12	12	アカヒメヘリ成1	28
	2	7/3		0	1	1	1			0	1	1	1		2
	3			0	1	1	1			0			0	シラホシ成2	3
土佐市 鳴川	1		3	3	6	6	6	37	5	42			0	クロアシホソナガ成2	53
	2	7/3		0			0			0	2	2	2	アカヒメヘリ成1	3
	3		4	4	16	16	16	25	25	25			0		45
越知町 柴尾	1			0			0	1	1	1			0	シラホシ成1	2
	2	7/3	1	1			0	2	2	2			0		3
	3		2	2			0			5	5	5	0		7
須崎市 立目	1			0	1	1	1	1	1	1			0		2
	2	7/4	1	1	1	1	1	1	1	1			0	シラホシ成1, アカヒメヘリ成1	5
	3			0	1	1	1	1	1	1			0		2
須崎市 神田	1			0			0			0			0		0
	2	7/4		0			0	5	5	5			0	アカヒゲホソミドリ成13	18
	3			0	1	1	1	1	1	1			0		2
須崎市 安和	1			0			0	2	2	2			0		2
	2	7/4		0	1	1	1	2	2	2			0		3
	3			0	2	2	2	2	2	2			0		4
中土佐町 小草	1			0	3	3	3	4	4	4			0	アカヒゲホソミドリ成1	8
	2	7/4		0	4	4	4	6	6	6			0		10
	3			0			0	1	1	1			0		1
窪川町 興津	1			0			0			0			0		0
	2	7/5		0			0			0	3	3	3		3
	3			0			0			0	1	1	1		1
合 計		38	0	38	59	1	60	112	10	122	31	0	31	39	290
1ほ場あたりの密度		1.0	0.0	1.0	1.5	0.0	1.5	2.9	0.3	3.1	0.8	0.0	0.8	1.0	7.4
平年 (平成8～12年)		0.3	0.0	0.3	2.7	0.0	2.7	2.2	0.3	2.6	0.6	0.0	0.6	0.9	7.1

第3表 県西部におけるすくい取り調査結果

場所	調査日	ミナミアオカメムシ			ホソハリカメムシ			クモハリカメムシ			トゲシラホシカメムシ			その他斑点米カメムシ類	合計
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		
中村市 安並	1			0			0			2			0		2
	2			0			0			0			0		0
宿毛市 山奈	1			0			0			0			0		0
	2			0			0			0			0	アカスジ3	3
宿毛市 小筑紫	1			1			6			8			0	イネカメムシ1, ホソナガ1	17
	2			6			4			0			0		10
土佐清水市 下ノ加江	1			0			0			0			0		0
	2			0			0			0			0		0
土佐清水市 益野	1			0			3			0			0	アカスジ3	6
	2			0			2			0			0	シラホシ1, アカヒゲホソミドリ10, ホソナガ1	14
佐賀町 中角	1			0			4			6			1	シラホシ2	13
	2			0			1			1			0		2
大方町 伊田	1			0			6			1			0		7
	2			2			5			11			0	イネクロ1	19
合 計		0	0	9	0	0	31	0	0	29	0	0	1	23	93
1ほ場あたりの密度		0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.1	1.6	6.6
平年 (平成8～12年)		0.2	0.0	0.2	2.6	0.1	2.7	1.3	0.1	1.3	0.1	0.0	0.1	1.3	5.6

県東部におけるすくい取り調査結果

(補足参考)

場所	調査日	ミナミアオカメムシ			ホソハリカメムシ			クモハリカメムシ			トゲシラホシカメムシ			その他斑点米カメムシ類	合計
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		
東洋町 野根	1			0			0			0			0		0
	2			0	1		1			0			0		1
	3			0			0			0			0		0
室戸市 佐喜浜	1			0			0			0			0		0
	2			0	1		1			0			0		1
	3			0			0			0			0		0
室戸市 元	1			0	4		4			0			0		4
	2			0			0			0			0		0
	3			0			0			0			0	シラホシ成1	1
室戸市 吉良川	1			0			0	2	2				0	アカヒゲホソミドリ成1	3
	2			0			0	1	1				0		1
	3			0			0			0			0		0
安芸市 川北	1	7		7			0	4	4		1		1	シラホシ成4, アカヒゲホソミドリ成2	18
	2			0	2		2	1	1				0		3
安芸市 井ノ口	1			0	1		1	1	1				0	アカスジ成1	3
	2			0			0			0			0		0
	3			0			0			0			0		0
芸西村 和食	1	2		2	8		8			0			0		10
	2	11		11	3		3			0			0		14
	3	4		4	7		7	1	1				0		12
合 計		24	0	24	27	0	27	7	3	10	1	0	1	9	71
1ほ場あたりの密度		1.2	0.0	1.2	1.4	0.0	1.4	0.4	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.5	3.6
平年 (平成8～12年)		0.4	0.5	0.8	1.5	0.1	1.6	0.2	0.3	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	3.0