

平成13年7月5日

各 位

病害虫防除所長

病害虫発生予察技術情報資料第5号の送付について

県東部の水稻（早期稲）のアザミウマ類等の発生状況について、別添のとおり資料を送付しますので、防除指導の参考にしてください。

なお、アザミウマ類による黒点症状米対策のポイントは、出穂直前の密度を低下させることです。

アザミウマ類成虫と幼虫の合計で、100頭（捕虫網10回振り）以上のほ場では、黒点症状米の発生が懸念されますので、防除指導の徹底をお願いします。

県東部

県東部における早期稲すくい取り調査結果 (捕虫網10回振り)

場所	調査日	アザミウマ類			セジロウンカ	ヒメトビウンカ	ツマグロヨコバイ	カメムシ類
		成	幼	計				
東洋町 野根	1	80	2	82				
	2	236	15	251				
	3	590	47	637				
室戸市 佐喜浜	1	13		13				
	2	25	1	26				
	3	47	6	53				
室戸市 元	1	189	2	191				
	2	112	3	115				
	3	110		110				
室戸市 吉良川	1	33		33				
	2	76		76				
	3	21		21				
安芸市 川北	1	159	23	182				
	2	16		16				
	3	19		19				
安芸市 井ノ口	1	3		3				
	2	4		4				
	3	3	1	4				
芸西村 和食	1	11		11				
	2	9	1	10				
	3	19	2	21				
平 均		89.4						
平年 (平成6～12年度)		14.0						