

各関係機関長様

24 高 虫 防 第 46 号
平成 24 年 9 月 5 日
高知県病害虫防除所長

病害虫発生予察情報について

平成24年度病害虫発生予察8月月報及び平成24年度予報6号(9月)を送付します。

平成24年度病害虫発生予察8月月報

1. 気象概況 (8月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	28.2	27.8	32.6	32.1	24.9	24.3	94	47	28	35
2	28.4	27.7	33.0	32.1	25.1	24.3	93	48	34	34
3	27.3	27.7	30.6	32.0	25.1	24.2	70	54	10	32
4	28.4	27.6	32.8	31.8	24.9	24.1	10	51	44	32
5	27.0	27.3	31.3	31.7	23.8	23.8	47	43	22	33
6	27.6	27.0	30.8	31.5	24.9	23.4	107	52	26	39
合計及び平均	27.8	27.5	31.9	31.9	24.8	24.0	420	295	165	204

アメダスデータ(高知市)

2. 平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	平年並	多い	少ない
中旬	平年並	平年並	平年並
下旬	平年並	多い	少ない
月平均	平年並	多い	少ない

高知県農業気象速報から抜粋

3. 作物生育概況

1. 水稲

普通期稲 出穂期～乳熟期 時期: やや早い 生育: 並
台風などの影響もなく、生育は概ね順調である。出穂は平年よりも2日程度早い。

2. カンキツ

果実肥大期 時期: 並 生育: 並
着果状況は、ユズでは平年並～やや多め、ポンカンでは平年に比べ少なめ。温州みかんは、極早生では多く、早生ではやや多めとなっている。文旦では、着果量はやや多めで、小玉傾向となっている。カンキツ類全般に果実肥大は順調で、生育は平年並である。

3. 新高ナシ

果実肥大期 時期: 並 生育: 並
全般に果実肥大は順調である。高温が続いており、ミツ症などの高温障害の発生が懸念される。

. 病害虫発生概況		発 生 概 況				
作 物 名	病 害 虫 名	全 般	東 部	中央部	中西部	西 部
水 稻 ＜ 普通期稲 ＞	葉いもち	やや多	平年並	多	やや多	平年並
	穂いもち	少	少	やや少	少	少
	紋枯病	少	少	少	少	やや少
	ごま葉枯病	やや少	少	少	少	多
	ツマグロヨコバイ	平年並	平年並	やや多	少	多
	ヒメトビウンカ	やや少	平年並	少	少	多
	セジロウンカ	やや多	多	やや少	平年並	多
	トビイロウンカ	少	少	少	少	少
	フタオビコヤガ	少	少	やや少	少	平年並
	ニカメイガ	少	少	多	少	少
	コブノメイガ	少	平年並	少	少	少
	イネクロカメムシ	やや多	少	やや多	多	少
	イチモンジセセリ	少	少	少	少	平年並
	斑点米カメムシ類	平年並	多	平年並	平年並	平年並
スクミリンゴガイ	平年並	多	平年並	少	平年並	
カンキツ ＜ 温州みかん ＞	そうか病	やや多		やや多		
	黒点病	平年並		平年並		
	かいよう病	やや少		やや少		
	ミカンハダニ	平年並		平年並		
	アブラムシ類	やや少		やや少		
	ミカンハモグリガ	平年並		平年並		
	カメムシ類	少		少		
	ヤノネカイガラムシ	少		少		
	その他カイガラムシ	少		少		
	コナジラミ類	やや多		やや多		
	カンキツ ＜ 中晩柑類 ＞	そうか病		平年並	平年並	
黒点病		平年並	平年並	平年並	平年並	多
かいよう病		やや少	平年並	少	平年並	少
ミカンハダニ		平年並	やや多	平年並	平年並	平年並
アブラムシ類		多	多	平年並	多	少
ミカンサビダニ		少	少	少	少	少
ミカンハモグリガ		平年並	平年並	少	平年並	少
カメムシ類		少	少	少	少	少
ハマキムシ類		少	少	少	少	少
ヤノネカイガラムシ		少	少	少	少	少
その他カイガラムシ		少	少	少	少	平年並
コナジラミ類		少	少	少	少	少

主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 普通期稲

主要病害虫の発生面積(ha)

	葉いもち		穂いもち		紋枯病		ばか苗病		疑似紋枯病	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
東 部	6.2	6.1	0.0	0.1	7.8	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
中央部	338.5	90.3	4.0	6.3	2.0	30.8	0.0	0.1	0.0	0.0
中西部	564.3	348.4	0.0	15.0	25.0	152.1	0.0	0.2	0.0	0.0
西 部	231.1	242.5	0.0	5.6	53.0	101.9	0.0	0.0	0.0	0.0
計	1,140.1	687.3	4.0	27.0	87.8	305.9	0.0	0.3	0.0	0.0

	こま葉枯れ病		ツマグロヨコバイ		ヒメトビウンカ		セジロウンカ		トビイロウンカ	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
東 部	0.0	4.2	59.2	71.8	4.7	5.3	189.9	76.0	7.8	15.4
中央部	0.0	160.2	96.1	63.6	14.0	35.5	86.1	142.9	2.0	12.8
中西部	0.0	508.0	97.2	301.9	21.9	64.6	539.2	498.9	0.0	50.0
西 部	548.9	223.1	313.0	75.2	38.5	11.8	495.9	110.0	0.0	21.8
計	548.9	895.5	565.5	512.5	79.1	117.2	1,311.1	827.8	9.8	100.0

	ニカメイガ		コブノメイガ		フタオビコヤガ		イチモンジセセリ		イネミズゾウムシ	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
東 部	0.0	0.0	15.6	16.1	0.0	7.0	0.0	2.3	0.0	0.0
中央部	20.3	5.6	16.0	163.1	12.0	17.2	0.0	2.3	0.0	2.5
中西部	0.0	81.6	0.0	274.0	15.7	44.8	0.0	1.6	0.0	52.5
西 部	0.0	11.6	77.0	192.0	19.3	20.7	0.3	0.5	0.0	5.3
計	20.3	98.8	108.6	645.2	47.0	89.7	0.3	6.7	0.0	60.3

	イネゾウムシ		斑点米カメムシ類		イネクロカメムシ		イネヒメハモグリバエ		スクミリンゴガイ	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
東 部	0.0	0.0	428.1	382.6	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.1
中央部	0.0	0.0	1,251.8	1,162.0	50.1	28.4	0.0	0.0	150.2	120.2
中西部	0.0	18.0	1,724.3	1,789.4	12.0	6.0	0.0	2.9	0.0	42.1
西 部	0.0	0.0	842.7	818.1	0.0	0.2	0.0	0.0	180.5	172.0
計	0.0	18.0	4,246.9	4,152.1	62.1	34.6	0.0	2.9	350.2	334.4

栽培面積 東部 467ha 中央部 1,402ha 中西部 2,508ha 西部 963ha 合計 5,340ha

2. カンキツ(温州みかん,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

	そうか病		黒点病		かいよう病		ヤノカイガラムシ		ミカンハダニ	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
中央部+中西部(温州)	79.7	51.7	159.3	156.2	19.9	26.9	0.0	0.0	139.4	150.9
東 部(中晩柑類)	151.9	155.7	253.1	210.1	50.6	47.2	0.0	0.0	202.5	128.5
中央部(中晩柑類)	47.9	3.8	286.7	332.8	0.0	35.5	0.0	0.0	191.5	225.9
中西部(中晩柑類)	23.4	37.5	328.2	238.9	93.8	82.3	0.0	6.3	234.4	169.9
西 部(中晩柑類)	0.0	0.0	270.0	187.7	0.0	52.2	0.0	0.0	236.3	219.3
中晩柑類計	223.2	197.0	1,138.0	969.5	144.4	217.2	0.0	6.3	864.7	743.6
カンキツ計	302.9	248.7	1,297.3	1,125.7	164.3	244.1	0.0	6.3	1,004.1	894.5

	アブラムシ類		ミカンサビダニ		ミカンハモグリガ		カメムシ類		ハマキムシ類	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
中央部+中西部(温州)	39.8	62.9	0.0	0.0	39.8	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0
東 部(中晩柑類)	202.5	66.2	0.0	0.1	202.5	159.3	0.0	0.8	0.0	0.3
中央部(中晩柑類)	47.9	56.6	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0
中西部(中晩柑類)	46.9	25.0	0.0	0.0	140.5	107.5	0.0	6.3	0.0	0.0
西 部(中晩柑類)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.7	0.0	3.4	0.0	0.0
中晩柑類計	297.3	147.8	0.0	0.1	343.0	410.4	0.0	10.5	0.0	0.3
カンキツ計	337.1	210.7	0.0	0.1	382.8	456.9	0.0	10.5	0.0	0.3

	ルビーロウムシ		その他カイガラムシ		カンザワハダニ		コナジラミ類	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
中央部+中西部(温州)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6
東 部(中晩柑類)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
中央部(中晩柑類)	0.0	3.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
中西部(中晩柑類)	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	9.6
西 部(中晩柑類)	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
中晩柑類計	0.0	3.8	0.6	21.7	0.0	0.0	0.0	9.6
カンキツ計	0.0	3.8	0.6	21.7	0.0	0.0	1.0	10.2

温州ミカン:栽培面積 中央部+中西部 239ha

中晩柑類:栽培面積 東部 405ha 中央部 383ha 中西部 375ha 西部 270ha 合計 1,433ha

3. ナシ

主要病害虫の発生面積(ha)

	炭疽病	
	本年	平年
中央部	22.0	37.3

栽培面積 80ha