

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について

平成27年度病虫害発生予察8月月報及び平成27年度予報6号(9月)を送付します。

平成27年度病虫害発生予察8月月報

I. 気象概況 (8月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	29.3	27.8	33.8	32.1	25.6	24.3	0	47	54	35
2	29.4	27.7	34.4	32.1	25.4	24.3	0	48	48	34
3	27.7	27.7	32.0	32.0	23.8	24.2	13	54	31	32
4	26.2	27.6	30.3	31.8	23.9	24.1	134	51	12	32
5	27.7	27.3	31.7	31.7	24.2	23.8	46	43	30	33
6	25.5	27.0	29.3	31.5	22.5	23.4	133	52	18	39
合計及び平均	27.6	27.5	31.9	31.9	24.2	24.0	326	295	193	204

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	かなり高い	かなり少ない	かなり多い
中旬	低い	多い	少ない
下旬	低い	多い	少ない
月平均	平年並	多い	平年並

高知県農業気象速報から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稻

普通期稲 出穂始め～糊熟期 時期:並 生育:並

生育はおおむね順調であるが、梅雨時期の日照不足によりやや分げつが少ない。いもち病の増加が懸念されたが、8月上旬から好天が続いたことで落ち着いてきている。

2. カンキツ類

温州ミカン 果実肥大期 時期:並 生育:並

生育はおおむね順調に推移している。梅雨時期の長雨の影響により、黒点病の発生がやや目立つ。

中晩柑 果実肥大期 時期:並 生育:並

全般的に着果数は平年並～やや少なめとなっているが、梅雨明け以降は好天が続いたため、果実肥大は順調に推移している。

3. 新高ナシ 果実肥大期 時期:並 生育:並

台風の影響で落果が多少見られたものの、全体として生育は順調である。

4. 青ネギ 生育期 時期:並 生育:並

生育状態は平年並みであるが、日照量の増加と気温の上昇により、外葉の枯れ上がりが早く、葉やけが発生しているほ場もある。

Ⅲ．病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般 (面積)	東 部		中央部		中西部		西 部	
			面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜普通期稲＞	葉いもち	多	多	高	多	低	多	平年並	少	低
	穂いもち	少	少	低	少	低	少	低	平年並	平年並
	紋枯病	少	少	低	少	低	少	低	少	低
	ごま葉枯病	平年並	少	低	やや多	やや高	平年並	高	平年並	平年並
	ツマグロヨコバイ	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	やや少	平年並	やや多	平年並
	ヒメトビウンカ	少	多	やや高	少	低	少	低	少	低
	セジロウンカ	平年並	多	やや高	少	やや低	平年並	平年並	やや多	高
	トビイロウンカ	少	少	低	少	低	少	低	少	低
	斑点米カメムシ類	平年並	多	高	平年並	平年並	平年並	やや高	やや多	平年並
	コブノメイガ	少	少	低	少	低	少	やや高	平年並	やや低
	フタオビコヤガ	少	多	平年並	少	低	少	低	少	低
	スクミリンゴガイ	多	少	低	多	高	多	やや高	多	高
カンキツ ＜温州ミカン＞	そうか病	少			少	低				
	黒点病	多			多	高				
	かいよう病	少			少	低				
	ミカンハダニ	やや少			やや少	平年並				
	アブラムシ類	少			少	低				
	ミカンハモグリガ	少			少	低				
カンキツ ＜中晩柑類＞	そうか病	平年並	少	低	多	平年並	多	平年並	多	高
	黒点病	平年並	平年並	やや低	平年並	やや高	多	やや低	平年並	平年並
	かいよう病	多	多	やや高	多	平年並	やや多	平年並	多	高
	ミカンハダニ	平年並	少	やや低	やや少	やや高	やや多	低	少	低
	アブラムシ類	平年並	平年並	やや高	少	低	少	低	少	低
	ミカンハモグリガ	少	少	低	少	低	平年並	やや高	平年並	平年並
	ミカンサビダニ	多	多	やや高	少	低	少	低	多	高
青ネギ	べと病	多			多	高				
	ネギアザミウマ	平年並			平年並	やや低				
	シロイチモジヨトウ	少			少	低				
	ハスモンヨトウ	平年並			平年並	やや低				

トラップ調査※	害虫名	東 部	中央部 (香美)	中央部 (香南)	中央部 (南国)	中西部	西 部
	ハスモンヨトウ	少		少	少	少	平年並
	アブラムシ	少		平年並	平年並	多	少
	オオタバコガ	少		少	少		やや多
	タバコガ	少		やや少	少		少
	果樹カメムシ類	やや多	多			多	多

※各害虫の詳細な発生推移については、病虫害防除所のホームページに掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

	葉いもち		穂いもち		紋枯病		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	174.2	18.3	0.0	0.0	0.0	28.2	0.0	2.6	97.0	76.5
中央部	481.6	155.5	0.0	2.3	1.9	14.5	232.1	139.4	110.3	80.3
中西部	1,026.9	411.1	0.0	2.7	3.2	106.5	494.6	476.4	122.9	194.2
西 部	30.5	135.3	1.0	0.8	30.5	84.0	406.0	380.5	162.4	119.5
計	1,713.2	720.2	1.0	5.8	35.6	233.2	1,132.7	998.9	492.6	470.5

	ヒメビウンカ		セジロウンカ		トビイロウンカ		イネミズゾウムシ		斑点米カメムシ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	21.3	4.4	241.1	118.5	0.0	15.8	0.0	0.0	441.0	370.2
中央部	0.0	41.6	92.8	157.6	0.0	12.0	0.0	2.4	1,305.6	1,199.1
中西部	0.0	91.8	570.2	458.1	0.0	23.0	0.0	47.3	2,047.6	1,876.6
西 部	0.0	18.6	380.7	248.6	0.0	23.4	0.0	5.6	1,015.0	867.3
計	21.3	156.4	1,284.8	982.8	0.0	74.2	0.0	55.3	4,809.2	4,313.2

	コブノメイガ		フタオビコヤガ		スクミリンゴガイ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	0.0	16.8	10.3	5.4	0.0	5.7
中央部	5.8	121.6	0.0	19.5	290.1	125.7
中西部	59.9	184.9	6.3	34.7	78.8	43.5
西 部	126.9	148.2	0.0	25.9	380.6	210.6
計	192.6	471.5	16.6	85.5	749.5	385.5

栽培面積 東部 441ha 中央部 1,354ha 中西部 2,520ha 西部 1,015ha 合計 5,330ha

2. カンキツ(温州ミカン,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

	そうか病		黒点病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部(温州)	0.0	43.2	231.0	153.4	0.0	25.7	92.4	148.2	0.0	32.3
東 部(中晩柑類)	50.4	122.4	251.9	218.2	80.6	38.8	50.4	115.1	75.6	55.5
中央部(中晩柑類)	43.8	18.7	350.2	335.8	87.6	29.4	175.1	232.8	0.0	30.7
中西部(中晩柑類)	88.5	24.3	354.0	269.9	132.8	82.6	265.5	171.0	0.0	4.4
西 部(中晩柑類)	10.5	0.1	213.0	199.3	99.4	23.6	106.5	210.1	0.0	0.4
中晩柑類計	193.2	165.5	1,169.1	1,023.2	400.4	174.4	597.5	729.0	75.6	91.0
カンキツ計	193.2	208.7	1,400.1	1,176.6	400.4	200.1	689.9	877.2	75.6	123.3

	ミカンハモグリガ		ミカンサビダニ		コナジラミ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部(温州)	0.0	36.3	0.0	2.1	0.0	0.6
東 部(中晩柑類)	0.0	131.4	2.0	0.2	0.0	0.0
中央部(中晩柑類)	0.0	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0
中西部(中晩柑類)	88.5	82.6	0.0	0.0	0.0	5.9
西 部(中晩柑類)	71.1	57.2	1.0	0.0	0.0	0.0
中晩柑類計	159.6	292.7	3.0	0.2	0.0	5.9
カンキツ計	159.6	329.0	3.0	2.3	0.0	6.5

温州ミカン:栽培面積 中央部 231ha

中晩柑類:栽培面積 東部 403ha 中央部 394ha 中西部 354ha 西部 284ha 合計 1,435ha

3. ナシ 主要病害虫の発生面積(ha)

	炭疽病	
	本 年	平 年
中央部	25.7	31.1

栽培面積 77ha

4. 青ネギ






主要病害虫の発生面積(ha)

	さび病		べと病		ネギアザミウマ		シロイチモジヨトウ		ハスモンヨトウ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部	0.0	2.9	43.4	2.9	52.0	49.1	8.7	23.1	34.7	28.8

栽培面積 52ha

V. トラップ調査

1. ハスモンヨトウ



2. 果樹カメムシ

