

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について

平成28年度病虫害発生予察8月月報及び平成28年度予報6号(9月)を送付します。

平成28年度病虫害発生予察8月月報

I. 気象概況 (8月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	28.3	27.8	33.4	32.1	24.7	24.3	8	47	40	35
2	29.4	27.7	34.1	32.1	25.4	24.3	0	48	53	34
3	29.4	27.7	34.3	32.0	25.7	24.2	0	54	51	32
4	29.4	27.6	35.0	31.8	25.7	24.1	17	51	46	32
5	29.5	27.3	34.3	31.7	25.7	23.8	5	43	42	33
6	26.7	27.0	31.8	31.5	22.2	23.4	80	52	45	39
合計及び平均	28.8	27.5	33.8	31.9	24.9	24.0	110	295	276	204

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	高い	少ない	多い
中旬	かなり高い	少ない	かなり多い
下旬	高い	平年並	多い
月平均	かなり高い	かなり少ない	かなり多い

高知県農業気象速報から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稻

普通期稲 出穂始め～糊熟期 時期:やや早 生育:並

出穂は8月上旬頃から始まり、ピークは中旬～下旬であった。梅雨明け後、好天が続いたこともあり、出穂は平年に比べてやや早くなっている。高温が続いているため、高温障害による未熟粒の発生が懸念される。

2. カンキツ類

温州ミカン 果実肥大期 時期:並 生育:やや不良

晴天が続き、県中央部では果実肥大が遅れている。また、一部ほ場においては、8月中旬からの降雨の影響で裂果が発生し始めている。

中晩柑 果実肥大期 時期:並 生育:並

晴天続きによって、県東部のユズや西部のブンタンの一部ほ場では果実肥大が遅れている。また、県西部では日焼け果の発生が平年に比べて多くなっている。

3. 新高ナシ 果実肥大期 時期:並 生育:並

全般的に生育は順調である。

4. 青ネギ 生育期 時期:並 生育:やや不良

高温により、全般的に株が弱っているが、中旬からの降雨によって回復傾向にある。

Ⅲ. 病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般 (面積)	東 部		中央部		中西部		西 部	
			面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜普通期稲＞	葉いもち	少	やや多	平年並	少	低	少	低	少	低
	穂いもち	多	少	低	少	低	多	平年並	少	低
	紋枯病	少	少	低	少	低	少	低	少	低
	ごま葉枯病	多	多	平年並	多	高	多	高	多	平年並
	ツマグロヨコバイ	少	少	低	少	低	平年並	平年並	少	低
	ヒメトビウンカ	少	やや多	平年並	平年並	平年並	少	低	少	低
	セジロウンカ	やや少	少	低	少	低	平年並	平年並	少	低
	トビイロウンカ	少	少	低	少	低	少	低	少	低
	斑点米カメムシ類	平年並	平年並	平年並	平年並	やや低	平年並	低	少	やや低
	コブノメイガ	少	平年並	平年並	少	低	少	低	平年並	平年並
	フタオビコヤガ	少	少	低	少	低	少	低	少	低
カンキツ ＜温州ミカン＞	そうか病	少			少	やや低				
	黒点病	多			多	平年並				
	かいよう病	少			少	低				
	ミカンハダニ	平年並			平年並	平年並				
	アブラムシ類	少			少	低				
	ミカンハモグリガ	少			少	低				
カンキツ ＜中晩柑類＞	そうか病	やや少	少	低	少	低	多	平年並	多	平年並
	黒点病	やや多	やや多	平年並	多	やや低	多	低	やや少	平年並
	かいよう病	少	少	低	平年並	平年並	少	低	平年並	平年並
	ミカンハダニ	平年並	少	やや低	やや多	低	平年並	やや低	少	低
	アブラムシ類	やや少	少	低	少	低	少	低	多	高
	ミカンハモグリガ	平年並	平年並	やや低	少	低	やや多	やや低	平年並	やや低
青ネギ	べと病	少			少	低				
	ネギアザミウマ	多			多	やや高				
	シロイチモジヨトウ	少			少	低				
	ハスモンヨトウ	少			少	低				

トラップ調査※	害虫名	東 部	中央部 (香美)	中央部 (香南)	中央部 (南国)	中西部	西 部
	ハスモンヨトウ	やや多		平年並	多	平年並	少
	アブラムシ	少		少	少	平年並	平年並
	オオタバコガ	平年並		やや少	平年並		多
	タバコガ	平年並		少	少		やや少
	果樹カメムシ類	少	少			少	少

※各害虫の詳細な発生推移については、病虫害防除所のホームページに掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

	葉いもち		穂いもち		紋枯病		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	26.5	16.6	0.0	0.0	0.0	24.7	5.9	2.3	30.0	80.5
中央部	78.1	196.2	0.0	0.9	5.7	12.2	420.9	133.7	24.8	80.2
中西部	120.1	511.0	15.8	2.2	15.8	77.0	1,643.9	436.4	142.3	153.5
西 部	25.0	120.3	0.0	0.9	30.5	81.6	709.3	370.3	50.0	130.0
計	249.7	844.1	15.8	4.0	52.0	195.5	2,780.0	942.7	247.1	444.2

	ヒメビウンカ		セジロウンカ		トビイロウンカ		斑点米カメムシ類		コブノメイガ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	7.4	4.3	30.9	127.2	0.0	15.4	367.6	366.2	16.2	14.2
中央部	51.4	38.5	57.1	148.3	1.9	11.8	1,047.4	1,175.9	64.7	118.3
中西部	15.8	84.6	591.2	497.5	0.0	21.4	1,896.8	1,859.9	22.1	182.0
西 部	0.0	18.3	109.9	280.1	0.0	23.1	499.5	863.9	139.9	157.2
計	74.6	145.7	789.1	1,053.1	1.9	71.7	3,811.3	4,265.9	242.9	471.7

	フタオビコヤガ	
	本 年	平 年
東 部	2.0	6.2
中央部	0.0	19.3
中西部	6.3	28.4
西 部	0.0	25.5
計	8.3	79.4

栽培面積 東部 429ha 中央部 1,333ha 中西部 2,529ha 西部 999ha 合計 5,290ha

2. カンキツ(温州ミカン,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

	そうか病		黒点病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部(温州)	26.5	44.2	265.0	189.3	0.0	24.2	159.0	167.4	0.0	36.9
東 部(中晩柑類)	0.0	114.6	358.8	225.1	0.0	36.5	51.3	114.9	20.0	64.2
中央部(中晩柑類)	0.0	22.3	380.0	319.6	42.2	33.0	337.8	226.3	0.0	29.6
中西部(中晩柑類)	89.0	15.6	356.0	277.3	0.0	72.7	178.0	181.0	0.0	4.5
西 部(中晩柑類)	7.2	1.2	144.0	218.4	36.0	29.3	108.0	212.5	54.0	0.4
中晩柑類計	96.2	153.7	1,238.8	1,040.4	78.2	171.5	675.1	734.7	74.0	98.7
カンキツ計	122.7	197.9	1,503.8	1,229.7	78.2	195.7	834.1	902.1	74.0	135.6

	ミカンハモグリガ	
	本 年	平 年
中央部(温州)	0.0	36.3
東 部(中晩柑類)	102.5	104.1
中央部(中晩柑類)	0.0	20.7
中西部(中晩柑類)	133.5	86.0
西 部(中晩柑類)	72.0	64.7
中晩柑類計	308.0	275.5
カンキツ計	308.0	311.8

温州ミカン:栽培面積 中央部 265ha

中晩柑類:栽培面積 東部 410ha 中央部 380ha 中西部 356ha 西部 288ha 合計 1,434ha

3. ナシ 主要病害虫の発生面積(ha)

	炭疽病	
	本 年	平 年
中央部	15.0	16.7

栽培面積 45ha

4. 青ネギ






主要病害虫の発生面積(ha)

	さび病		べと病		ネギアザミウマ		シロイチモジヨトウ		ハスモンヨトウ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部	0.0	2.9	0.0	17.3	69.0	66.1	13.8	25.9	13.8	40.3

栽培面積 69ha

V. トラップ調査

1. ハスモンヨトウ



2. 果樹カメムシ

