

平成26年度二番茶実収報告

高知県農業技術センター茶業試験場

1. 摘採日

本 年	前 年	平 年
6月19日	6月17日	6月22日

1) 平年値は2009～2013年の平均値。以下同じ。

2. 生葉収量 (kg/10a)

本 年		前 年		平 年	
収 量	指数	収 量	指数	収 量	指数
316±72	69	369±60	80	459±85	100

1) 可搬型摘採機による5カ所の平均値。

3. 百芽重 (g)

本 年		前 年		平 年	
重 量	指数	重 量	指数	重 量	指数
33.3±1.7	78	32.4±3.6	76	42.9±6.8	100

1) うね長0.2mの帯摘み5カ所の平均値。以下同じ。

4. 新芽数 (本/m²)

本 年		前 年		平 年	
本 数	指数	本 数	指数	本 数	指数
615±158	67	715±83	78	915±184	100

5. 出開度 (%)

本 年	前 年	平 年
55.9±11.9	83.6±6.5	78.1±8.4

6. 概況

(1) 気象

気 温：平均気温では5月第2半旬で平年よりも低く、6月第4半旬で平年よりも低かった以外はほぼ平年並みに推移した。

降水量：5月第1半旬から6月第4半旬までの降水量は405.5mmで、ほぼ平年並みであった。

(2) 茶芽の生育

本年二番茶は平年と比較して、百芽重で78%、新芽数で67%と生育がかなり劣った。収量においても平年の69%と著しく少なかった。

一番茶の収穫量が少なかったことと生育が不揃いであったことが収量の減少に影響したと考えられる。

場内では、カンザワハダニ、チャノナガサビダニの発生が見られた。

気象表

月	半旬	平均気温 (°C)			最高気温 (°C)			最低気温 (°C)		
		本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
5	第1	15.4	12.9	15.7	23.8	21.8	23.2	8.5	5.4	9.6
	第2	14.7	16.2	17.5	23.4	25.2	24.9	7.0	8.0	11.1
	第3	16.6	17.7	17.2	22.3	26.9	24.5	9.2	9.5	10.6
	第4	17.2	18.6	18.0	25.0	25.2	25.0	11.1	13.0	12.0
	第5	19.5	20.8	19.0	27.1	30.5	26.0	13.1	13.2	13.6
	第6	20.1	20.4	18.8	28.0	24.2	24.1	13.2	17.3	14.4
6	第1	20.4	18.9	19.0	25.2	23.3	24.2	17.0	15.5	14.7
	第2	21.3	20.0	20.3	26.1	25.1	25.5	18.5	16.1	16.1
	第3	20.9	23.8	21.6	26.6	29.8	27.0	16.5	21.8	18.0
	第4	20.1	24.5	22.6	25.0	30.0	27.1	16.4	19.9	19.1

月	半旬	降水量 (mm)			降水日数		
		本 年	前 年	平 年	本 年	前 年	平 年
5	第1	5.0	42.5	32.8	1.0	1.0	1.4
	第2	0.0	37.5	14.7	0.0	1.0	1.8
	第3	67.5	52.4	16.5	3.0	1.0	1.2
	第4	54.5	42.7	15.1	1.0	1.0	1.6
	第5	0.5	28.8	43.7	1.0	0.0	2.4
	第6	16.5	47.9	63.9	2.0	6.0	3.2
6	第1	165.5	35.6	27.0	2.0	3.0	2.6
	第2	50.5	37.6	27.2	4.0	2.0	2.6
	第3	5.5	49.3	59.7	1.0	3.0	2.4
	第4	40.0	53.5	117.4	2.0	2.0	3.0

1) 平年の値は2009～2013年の平均値