

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について

平成29年度病虫害発生予察9月月報及び平成29年度予報7号(10月)を送付します。

平成29年度病虫害発生予察9月月報

I. 気象概況 (9月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	25.5	26.5	30.0	31.0	22.1	22.9	10	49	28	31
2	26.2	25.9	31.4	30.4	21.9	22.3	21	51	38	29
3	25.0	25.2	28.9	29.7	22.2	21.6	25	53	13	27
4	23.3	24.4	27.3	28.9	20.0	20.7	73	59	18	26
5	22.5	23.5	26.7	28.1	19.0	19.7	22	63	18	26
6	22.6	22.6	28.6	27.4	17.5	18.7	58	58	33	26
合計及び平均	24.2	24.7	28.8	29.3	20.5	21.0	208	333	147	164

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	低い	少ない	平年並
中旬	低い	平年並	かなり少ない
下旬	低い	平年並	平年並
月平均	低い	少ない	平年並

高知県農業気象速報から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稲

普通期稲 糊熟期～収穫期 時期:並 生育:並
9月下旬より収穫が始まっているが、県東部では収穫時期が若干遅れている。

2. かんきつ類

</

Ⅲ. 病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般 (面積)	東 部		中央部		中西部		西 部	
			面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜普通期稲＞	葉いもち	少	少	低	少	やや低	少	低	少	低
	穂いもち	少	少	低	少	低	少	低	平年並	やや低
	紋枯病	平年並	多	平年並	少	低	少	低	やや多	やや低
	ごま葉枯病	やや多	平年並	平年並	多	やや低	やや多	平年並	やや多	高
	稲こうじ病	少	少	低	少	低	やや少	高	多	平年並
	ツマグロヨコバイ	平年並	少	やや低	やや多	平年並	少	平年並	多	平年並
	ヒメトビウンカ	多	少	低	やや多	低	少	やや低	多	やや高
	トビイロウンカ	少	平年並	やや低	少	低	少	低	少	低
	コブノメイガ	少	少	低	少	低	少	平年並	少	低
	フタオビコヤガ	平年並	少	低	少	低	多	平年並	少	低
かんきつ類 ＜温州ミカン＞	そうか病	やや少			やや少	平年並				
	黒点病	平年並			平年並	低				
	かいよう病	少			少	低				
	ミカンハダニ	少			少	低				
	アブラムシ類	やや多			やや多	やや低				
	ミカンハモグリガ	やや少			やや少	やや低				
かんきつ類 ＜中晩柑類＞	そうか病	平年並	少	低	少	低	多	やや低	多	平年並
	黒点病	平年並	平年並	平年並						

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

	葉いもち		穂いもち		紋枯病		ごま葉枯病		稲こうじ病	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	0.0	21.4	0.0	24.6	201.5	47.7	43.2	38.0	0.0	0.0
中央部	27.9	57.2	3.5	156.3	0.0	43.0	1,210.3	413.0	87.2	409.6
中西部	41.0	138.6	64.9	341.0	71.7	131.1	2,048.3	1,333.9	256.0	331.2
西 部	0.0	2.0	63.5	78.3	141.7	82.8	967.2	623.3	29.3	12.9
計	68.9	219.2	131.9	600.2	414.9	304.6	4,269.0	2,408.2	372.5	753.7

	ツマグロヨコバイ		ヒメトビウンカ		トビイロウンカ		コブノメイガ		フタオビコヤガ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	12.5	71.1	0.0	9.1	34.8	34.6	0.0	7.9	0.0	0.0
中央部	69.8	47.5	163.9	103.6	0.0	26.1	14.0	73.1	0.0	1.8
中西部	71.7	127.9	17.1	65.0	10.2	60.2	10.2	82.3	3.4	0.7
西 部	171.0	69.4	361.5	22.3	14.7	87.9	0.0	156.4	0.0	1.0
計	325.0	315.9	542.5	200.0	59.7	208.8	24.2	319.7	3.4	3.5

栽培面積 東部 418ha 中央部 1,308ha 中西部 2,475ha 西部 977ha 合計 5,178ha

3. 促成ナス

主要病害虫の発生面積(ha)

		青枯病		うどんこ病		アブラムシ類		ハスモンヨトウ		ミナミキイロアザミウマ	
		発生面積(ha)	発病株率(%)	発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)	発生面積(ha)	寄生葉率(%)
東 部	本年	0.3	0.1	5.0	0.1	19.1	0.2	90.0	2.8	200.0	13.6
	平年	0.5	0.1	8.0	0.1	12.5	0.2	79.3	2.5	140.9	10.7
中央部	本年	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	8.1
	平年	0.1	0.0	0.9	0.0	4.7	2.2	10.2	5.3	14.3	9.0
西 部	本年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	平年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	本年	0.4	0.1	5.0	0.1	19.1	0.1	90.0	1.4	218.9	10.9
	平年	0.6	0.1	8.9	0.1	17.2	1.2	89.5	3.9	155.2	9.9

		ヒラズハナアザミウマ		タバココナジラミ		ホコリダニ類		ハダニ類		ハモグリバエ類	
		発生面積(ha)	寄生花率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害葉率(%)
東 部	本年	57.3	0.5	209.9	18.7	19.1	0.2	57.3	1.2	10.0	0.1
	平年	71.7	5.7	198.1	29.4	17.7	0.3	40.4	1.0	48.4	3.2
中央部	本年	12.6	2.6	22.0	48.0	3.1	0.1	3.1	4.0	9.4	

V. トラップ調査

1. ハスモンヨトウ

