

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について

平成29年度病虫害発生予察8月月報及び平成29年度予報6号(9月)を送付します。

平成29年度病虫害発生予察8月月報

I. 気象概況 (8月) ※9月5日現在、8月下旬の農業気象速報が未発表のため、5、6半旬のデータはありません

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	29.5	27.8	33.9	32.1	26.1	24.3	8	47	36	35
2	28.8	27.7	33.8	32.1	24.5	24.3	112	48	30	34
3	28.7	27.7	32.9	32.0	25.6	24.2	6	54	29	32
4	28.5	27.6	33.0	31.8	25.0	24.1	65	51	42	32
5		27.3		31.7		23.8		43		33
6		27.0		31.5		23.4		52		39
合計及び平均	28.9	27.5	33.4	31.9	25.3	24.0	190	295	137	204

アメダスデータ(高知市)

平年比 ※9月5日現在、8月下旬の農業気象速報が未発表のため、下旬のデータはありません

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	かなり高い	多い	平年並
中旬	高い	平年並	平年並
下旬			
月平均			

高知県農業気象速報から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稻

普通期稲 穂ばらみ期～糊熟期 時期:並～やや早 生育:並
全般的に生育は順調である。県中央部から西部にかけての出穂は平年に比べてやや早い傾向が見られる。

2. カンキツ類

温州ミカン 果実肥大期 時期:並～やや遅 生育:並
果実肥大は平年並となっているが、極早生品種では平年より熟期がやや遅れている傾向が見られる。また、一部ほ場においては、降雨の影響で裂果が発生している。

中晩柑 果実肥大期 時期:並 生育:並
果実肥大は県東部、中央部で平年並、中西部、西部で平年並～やや小さめの傾向である。一部のほ場で日焼け果の発生が見られる。

3. 新高ナシ 果実肥大期 時期:並～やや遅 生育:並

果実肥大は平年並となっているが、中西部で熟期がやや遅れている傾向が見られる。

4. 青ネギ 生育期 時期:並 生育:やや不良

高温により、全般的に株が弱っている。葉先枯れ等も発生しており、出荷量は平年よりやや少なめで推移している。

Ⅲ. 病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般 (面積)	東 部		中央部		中西部		西 部	
			面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜普通期稲＞	葉いもち	少	少	低	少	低	少	やや低	少	低
	穂いもち	少	少	低	少	平年並	少	平年並	少	低
	紋枯病	少	やや多	平年並	少	平年並	少	低	やや少	やや低
	ごま葉枯病	多	平年並	平年並	多	平年並	多	やや高	多	高
	ツマグロヨコバイ	少	やや少	低	少	やや低	少	平年並	平年並	平年並
	ヒメトビウンカ	多	少	低	多	やや高	多	平年並	多	やや高
	セジロウンカ	やや少	平年並	平年並	少	やや低	少	平年並	平年並	やや高
	トビイロウンカ	少	少	低	少	低	少	平年並	少	低
	斑点米カメムシ類	平年並	平年並	高	平年並	やや高	平年並	高	平年並	やや高
	コブノメイガ	少	少	低	少	やや低	少	低	少	低
	フタオビコヤガ	少	少	低	少	低	少	低	少	低
カンキツ ＜温州ミカン＞	そうか病	少			少	低				
	黒点病	少			少	低				
	かいよう病	少			少	低				
	ミカンハダニ	平年並			平年並	やや高				
	アブラムシ類	平年並			平年並	低				
	ミカンハモグリガ	多			多	やや低				
カンキツ ＜中晩柑類＞	そうか病	やや少	少	低	少	低	多	平年並	多	平年並
	黒点病	平年並	やや少	平年並	多	やや高	平年並	低	少	やや低
	かいよう病	やや少	少	低	少	低	多	平年並	少	低
	ミカンハダニ	平年並	やや多	やや低	平年並	低	やや多	高	少	低
	アブラムシ類	少	少	低	少	低	少	低	少	低
	ミカンハモグリガ	少	少	低	少	低	平年並	やや低	少	低
青ネギ	べと病	少			少	低				
	ネギアザミウマ	多			多	高				
	シロイチモジヨトウ	少			少	低				
	ハスモンヨトウ	やや少			やや少	低				

トラップ調査※	害虫名	東 部	中央部 (香美)	中央部 (香南)	中央部 (南国)	中西部	西 部
	ハスモンヨトウ	やや少		平年並	多	多	多
	アブラムシ	やや少		やや少	平年並	やや少	少
	オオタバコガ	少		やや多	やや多		多
	タバコガ	やや少		やや少	平年並		平年並
	果樹カメムシ類	少	少			少	少

※各害虫の詳細な発生推移については、病虫害防除所のホームページに掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

	葉いもち		穂いもち		紋枯病		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	5.0	13.8	0.0	0.0	35.0	20.9	2.0	1.9	51.6	80.0
中央部	52.3	193.1	0.5	0.9	2.2	12.5	806.6	152.1	19.6	74.8
中西部	3.4	466.6	0.1	3.7	13.5	69.9	1,618.6	545.5	37.1	142.0
西 部	10.0	117.7	0.0	0.8	53.7	80.1	830.4	396.3	127.0	125.0
計	70.7	791.2	0.6	5.4	104.4	183.4	3,257.6	1,095.8	235.3	421.8

	ヒメビウンカ		セジロウンカ		トビイロウンカ		斑点米カメムシ類		コブノメイガ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	0.0	4.2	122.8	118.5	0.0	15.0	382.8	350.9	0.0	11.9
中央部	189.7	41.5	78.5	136.9	0.0	10.4	1,199.0	1,130.6	15.3	85.0
中西部	155.1	76.4	205.7	501.8	0.0	19.5	2,023.2	1,840.9	0.0	133.3
西 部	366.4	17.9	298.0	281.6	0.0	21.4	977.0	805.8	0.0	166.9
計	711.2	140.0	705.0	1,038.8	0.0	66.3	4,582.0	4,128.2	15.3	397.1

	フタオビコヤガ	
	本 年	平 年
東 部	0.0	3.1
中央部	0.0	16.6
中西部	0.0	28.4
西 部	0.0	23.8
計	0.0	71.9

栽培面積 東部 418ha 中央部 1,308ha 中西部 2,475ha 西部 977ha 合計 5,178ha

2. カンキツ(温州ミカン,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

	そうか病		黒点病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部(温州)	0.0	39.2	58.8	170.2	0.0	16.7	176.3	150.7	29.4	28.1
東 部(中晩柑類)	0.0	114.3	163.1	237.4	0.0	31.9	170.0	115.3	20.0	66.2
中央部(中晩柑類)	0.0	22.2	378.0	321.8	0.0	25.7	270.0	236.1	0.0	25.7
中西部(中晩柑類)	90.5	24.9	271.5	288.0	90.5	49.8	271.5	178.1	0.0	4.5
西 部(中晩柑類)	10.2	1.9	44.2	219.9	0.0	25.9	1.0	203.2	0.0	5.8
中晩柑類計	100.7	163.3	856.8	1,067.1	90.5	133.3	712.5	732.7	20.0	102.2
カンキツ計	100.7	202.5	915.6	1,237.3	90.5	150.0	888.8	883.4	49.4	130.3

	ミカンハモグリガ	
	本 年	平 年
中央部(温州)	58.8	25.2
東 部(中晩柑類)	10.0	113.3
中央部(中晩柑類)	0.0	16.9
中西部(中晩柑類)	90.5	76.9
西 部(中晩柑類)	18.1	68.7
中晩柑類計	118.6	275.8
カンキツ計	177.4	301.0

温州ミカン:栽培面積 中央部 235ha

中晩柑類:栽培面積 東部 435ha 中央部 378ha 中西部 362ha 西部 290ha 合計 1,465ha

3. ナシ

主要病害虫の発生面積(ha)

	炭疽病	
	本 年	平 年
中央部	7.0	28.3

栽培面積 70ha

4. 青ネギ






主要病害虫の発生面積(ha)

	さび病		べと病		ネギアザミウマ		シロイチモジヨトウ		ハスモンヨトウ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部	0.0	2.3	0.0	13.8	69.0	66.6	0.0	23.5	23.0	35.0

栽培面積 69ha

V. トラップ調査

1. ハスモンヨトウ



2. 果樹カメムシ

