

令和3年度

農作物有害動植物
発生予察事業年報

令和4年3月

高知県病害虫防除所


目 次

I	各地区の区分	1
II	事業の目的	2
III	事業実施方針と重点取組	2
IV	組織体制	2
V	対象病害虫の種類	3
VI	巡回調査及び定点調査一覧	4
VII	事業内容	
水	稲	5
1	栽培面積	
2	生育概況	
3	病害虫発生概況	
(1)	病 害	
(2)	虫 害	
	巡回調査結果	14
	BLASTAM	24
	ニカメイガの半旬別誘殺数	25
	ツマグロヨコバイの半旬別誘殺数	25
	ヒメトビウンカの半旬別誘殺数	26
	セジロウンカの半旬別誘殺数	26
	トビイロウンカの半旬別誘殺数	27
	早期稲におけるアザミウマ類すくい取り調査結果	28
	斑点米カメムシ類すくい取り調査結果	30
	予察ほ（防除適期決定ほ）	34
かんきつ		39
1	栽培面積	
2	生育概況	
3	病害虫発生概況	
(1)	病 害	
(2)	虫 害	
(3)	最高発生面積・率	
	巡回調査結果	47
	予察ほ（防除適期決定ほ）	53
ナ	シ	57
1	栽培面積	
2	生育概況	
3	病害虫発生概況（新高）	
(1)	病 害	
(2)	虫 害	

(3) 最高発生面積・率 巡回調査結果	59
野菜	60
1 栽培面積	
2 生育概況	
3 病虫害発生概況	
冬春キュウリ（ハウス抑制裁培・促成栽培）	62
(1) 病 害	
(2) 虫 害	
(3) 最高発生面積・率	
巡回調査結果	69
冬春ナス（促成栽培）	77
(1) 病 害	
(2) 虫 害	
(3) 最高発生面積・率	
夏秋ナス（雨よけ・露地栽培）	83
(1) 最高発生面積・率	
巡回調査結果	84
冬春ピーマン・シシトウ（促成栽培）	92
(1) 病 害	
(2) 虫 害	
(3) 最高発生面積・率	
夏秋ピーマン・シシトウ（雨よけ・露地栽培）	98
(1) 最高発生面積・率	
巡回調査結果	99
冬春トマト（促成栽培）	107
(1) 病 害	
(2) 虫 害	
(3) 最高発生面積・率	
夏秋トマト（雨よけ・露地栽培）	111
(1) 最高発生面積・率	
巡回調査結果	112
ネギ	114
(1) 最高発生面積・率	
巡回調査結果	115
スイカ	116
(1) 最高発生面積・率	
イチゴ	118
(1) 最高発生面積・率	
メロン	118
(1) 最高発生面積・率	
オクラ	120
(1) 最高発生面積・率	

ニ ラ	121
(1) 最高発生面積・率	
ショウガ	122
(1) 最高発生面積・率	
ミョウガ	123
(1) 最高発生面積・率	
カンショ	123
(1) 最高発生面積・率	
特定点における調査	
1 黄色水盤におけるアブラムシ類有翅虫の半旬別誘殺数調査	124
2 フェロモントラップによるハスモンヨトウ雄成虫の半旬別誘殺数調査	127
3 フェロモントラップによるオオタバコガ雄成虫の半旬別誘殺数調査	130
4 フェロモントラップによるタバコガ雄成虫の半旬別誘殺数調査	131
5 サトイモにおけるハスモンヨトウの産卵数調査	
(1) 巡回調査	132
(2) 定期調査	133
6 フェロモントラップによる果樹カメムシ類の半旬別誘殺数調査	134
特殊病虫害等侵入警戒調査結果	
1 アリモドキゾウムシ	137
2 ミバエ類	138
3 プラムポックスウイルス (PPV)	140
VIII 各種情報の提供状況	141
病虫害発生予察情報	
発生予察注意報第1号 (イネいもち病)	142
発生予察特殊報第1号 (フタテンミドリヒメヨコバイ)	144
ホームページにおける情報発信 (令和3年1月～令和3年12月)	146
IX 病虫害診断実施状況	147
X 令和3年の気象	
気象概況 (令和3年1月～令和3年12月)	148
半旬別気象表 (高知、安芸、後免、須崎、中村)	151
XI 試験調査成績の概要	
露地ねぎのシロイチモジヨトウに対する薬剤防除試験	161
かんきつのミカンハダニに対する薬剤防除試験	163
トマト葉かび病菌の薬剤感受性検定	164

I 各地区の区分



東 部	安芸農業振興センター管内
中央部	中央東農業振興センター管内 中央東農業振興センター嶺北農業改良普及所管内 中央西農業振興センター管内(いの町) 中央西農業振興センター高知農業改良普及所管内 中央西農業振興センター高吾農業改良普及所管内(日高村)
中西部	中央西農業振興センター管内(いの町を除く) 中央西農業振興センター高吾農業改良普及所管内(日高村を除く) 須崎農業振興センター管内 須崎農業振興センター高南農業改良普及所管内
西 部	幡多農業振興センター管内

東西に長い地形の高知県では、県内を東部・中央部・中西部・西部の4地域に区分し、水稻・果樹・野菜について病害虫の発生予察調査を行っている。

なお、野菜は「土佐市」を中央部として区分している。

II 事業の目的

農作物に発生する病虫害への合理的な防除を効率的に行うため、気象や農作物の生育、過去の病虫害の発生状況に基づき、病虫害の発生時期や発生量及び発生程度を調査し、発生場所及び範囲、農作物が受ける損害の程度を予察し、これらの情報を迅速に関係者に提供することを目的とする。

III 事業実施方針と重点取組

本県における重要病虫害として位置付けている調査対象病虫害について、定点調査や巡回調査による早期発見とその発消長の調査観察及び気象データ等を加えた各種分析結果に基づき、精度の高い予察情報の作成と情報の迅速な提供に努めた。

また、ウイルス病やショウガ、ミョウガの根茎腐敗病などについて簡易診断キットの普及に取り組み、迅速な診断が行える体制を構築した。

さらに、トマト葉かび病など薬剤耐性による防除効果の低下が懸念されている病虫害について感受性検定を行い、防除指導を行った。

IV 組織体制

a 病虫害防除所職員

氏名（職名）	松村 和彦（所長）
	下元 満喜（チーフ・発生予察）、宗石 佳奈（研究員）、 矢野 和孝（専門員）、北村 千草（会計年度任用職員）、 森田 泰彰（生産環境課長）、下元 祥史（チーフ・病理）、 岡 美佐子（主任研究員）、沖 友香（研究員）、山崎 淳紀（研究員）、 林 一沙（研究員）、森實 祐香（研究員） 下八川 裕司（チーフ・昆虫）、下村 文那（主任研究員）、 米津 聡浩（研究員）、山脇 美樹（研究員）、井原 章吾（研究員）

※全職員は農業技術センター兼務

b 各農業振興センターにおける担当職員

氏名（職名）	山田 美保江（安芸農業振興センター農業改良普及課普及指導員）
	鈴木 健太郎（須崎農業振興センター農業改良普及課普及指導員）
	岩橋 理紗（幡多農業振興センター農業改良普及課普及指導員）

V 対象病害虫の種類

＊上段：指定有害動植物（病害虫）

対象作物	有 害 動 植 物 名
水稲	いもち病、紋枯病、ばか苗病、もみ枯細菌病、稲こうじ病、縞葉枯病、セジロウンカ、トビイロウンカ、ヒメトビウンカ、ツマグロヨコバイ、ニカメイガ、コブノメイガ、イネミズゾウムシ、斑点米カメムシ類、フタオビコヤガ
	白葉枯病、萎縮病、黄化萎縮病、ごま葉枯病、苗立枯病、イネゾウムシ、イネシガラレセンチュウ、アザミウマ類、イネクロカメムシ、スクミリンゴガイ、イチモンジセセリ等
かんきつ	かいよう病、そうか病、黒点病、ミカンハダニ、アブラムシ類、カメムシ類
	黄斑病、ミカンハモグリガ、ミカンサビダニ、カイガラムシ類、ヤガ類、アザミウマ類、ゴマダラカミキリ、ハマキムシ類等
なし	黒星病、黒斑病、ハダニ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類
	炭疽病、コナカイガラムシ類、カイガラムシ類
冬春 キュウリ	べと病、うどんこ病、灰色かび病、褐斑病、アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ヨトウガ
	斑点細菌病、菌核病、つる枯病、苗立枯病、白絹病、緑枯細菌病、つる割病、モザイク病、黄化えそ病、退緑黄化病、緑斑モザイク病、ハダニ類、ホコリダニ類、ハモグリバエ類、チビクロバネキノコバエ、ワタヘリクロノメイガ等
冬春 ナス	うどんこ病、灰色かび病、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、ハダニ類、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ヨトウガ、オオタバコガ
	青枯病、黒枯病、菌核病、すすかび病、白絹病、半身萎凋病、半枯病、褐色腐敗病、疫病、黄化えそ病、コナジラミ類、ホコリダニ類、ハモグリバエ類、コナカイガラムシ類等
冬春 ピーマン・ シシトウ	うどんこ病、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、ヨトウガ、オオタバコガ
	青枯病、斑点病、疫病、灰色かび病、菌核病、白絹病、黒枯病、モザイク病、黄化えそ病、ハダニ類、ホコリダニ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、コナカイガラムシ類等
冬春 トマト	疫病、灰色かび病、葉かび病、アブラムシ類、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、ヨトウガ
	萎凋病、斑点病、青枯病、根腐萎凋病、褐色輪紋病、かいよう病、半身萎凋病、軟腐病、うどんこ病、すすかび病、モザイク病、黄化えそ病、黄化葉巻病、黄斑モザイク病、タバコガ、ハモグリバエ類、アザミウマ類、トマトサビダニ等
ネギ	さび病、黒斑病、べと病、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ヨトウガ
	えそ条斑病、ハモグリバエ類等

VI 巡回調査及び定点調査一覧

調査機関	市町村名	水 稲				野 菜						果 樹							
		巡回調査地点			水稻予察ほ調査	巡回調査ほ場数						巡回調査ほ場							予察園調査
		早期稲	普通期稲	計		冬春ナス	冬春キュウリ	冬春ピーマン・シシトフ	冬春トマト	青ネギ	計	温州	ユズ	ポンカン	ブントン	ヒュウガナツ	ナシ	計	
安芸農業振興センター	室戸市	2		2		2		1			3			3				3	
	安芸市	3	2	5	1(普)	6		2			8		2					2	
	東洋町													2				2	
	奈半利町		1	1															
	田野町		1	1		1					1								
	安田町		1	1		1		1			2								
	北川村												1					1	1(ユズ)
	馬路村																		
	芸西村	1	1	2		2		4			6								
病害虫防除所	南国市	6	1	7	1(早)	2		4	1	1	8								
	香南市	4		4		6		4	1		11	8			7			15	
	香美市	1	2	3	1(普)					3	3								1(温州)
	本山市		1	1															
	大豊町		1	1															
	高知市	7		7			6		4		10						2	2	
	土佐町		2	2															
	大川村																		
	いの町	1	1	2													1	1	
	日高村	1	1	2					3		3								
	土佐市	3		3			3	3			6				4			4	
	仁淀川町																		
	佐川町		4	4															
	越知町		1	1															
須崎農業振興センター	須崎市	3	2	5			7	3			10			1	2	1		4	1(ポンカン)
	中土佐町	1	2	3	1(普)														
	四万十町		5	5				3			3								
	構原町																		
	津野町		1	1															
幡多農業振興センター	四万十市	2	2	4	1(早)		2				2		1		3			4	1(ブントン)
	宿毛市	2	2	4				1			1								
	土佐清水市	1		1			2				2								
	黒潮町	2		2			5				5								
	大月町					4					4								
	三原村	1		1															
	合計	41	34	75	2(早)3(普)	24	26	25	9	4	88	8	4	6	16	1	3	38	1(ユズ) 1(温州) 1(ポンカン) 1(ブントン)

VII 事業内容

水 稲

1 栽培面積 (ha)

地区名 \ 作物名	早 期 稲	普通期稲	合 計
東 部	670	395	1,065
中央部	3,551	1,247	4,798
中西部	691	2,381	3,072
西 部	1,448	917	2,365
計	6,360	4,940	11,300

2 生育概況

早期稲

全体の移植始期は3月5半旬、移植盛期は4月第2半旬で、平年よりやや早かった。移植後の4月中旬には低温による植え傷みや葉先枯が見られたが、その後回復して順調に生育した。しかし、梅雨入りが5月15日で、平年よりも21日、昨年よりも26日早く、分けつが少なかった。出穂時期は平年並～やや遅く、出穂後の7月中旬に天候不良により生育が遅れたことから、収穫時期は平年よりも遅く、また長雨と重なったために倒伏や穂発芽による品質低下が見られた。10a当たり収量は475kg、作況指数98と平年に比べやや不良となった。

普通期稲

移植の開始時期は平年並の5月第3半旬で、ピークは5月下旬であったが、例年よりも早い梅雨入りの影響で、移植時期の遅れが見られた。移植後の生育は順調であったが、7月中旬と8月中旬～下旬の天候不良により生育が遅れ、出穂時期が平年よりも遅く、収穫時期も平年よりも遅かった。10a当たり収量は420kg、作況指数98と平年に比べやや不良となった。

3 病害虫発生概況

(1) 病 害

① 葉いもち

ア 発生概況


- (ア) 早期稲 面積：多 程度：並

例年よりもかなり早い梅雨入りのため、BLASTAM（葉いもち発生予測システム）では5月中旬から感染好適日が見られた。このため初発生時期が平年よりも早く、5月下旬に発病が見られるほ場があった（技術情報第2号参照）。6月に入ると広範囲で発生が確認されるようになり、発病程度の高いほ場も見られた。7月中旬には降雨が続き、7月19日に梅雨明けとなったが、例年よりも長い梅雨期間のため、発生面積は平年よりも多くなった。

- (イ) 普通期稲 面積：多 程度：並

例年より長い梅雨期間のため、7月の発生面積は平年よりかなり多かった。梅雨明け以降は好天に恵まれていたが、8月中旬～下旬の天候不良のため、8～9月の発生面積も平年よりかなり多かった。

イ 発生経過



② 穂いもち

ア 発生概況


- (ア) 早期稲 面積：多 程度：やや高

葉いもちの発生が平年よりも多かったことに加え、出穂時期が平年よりも遅く、7月中旬の連続した降雨とも重なったことから、発生面積は平年よりも多く、発病程度もやや高かった。

- (イ) 普通期稲 面積：やや多 程度：やや低

葉いもちの発生が平年よりもかなり多かったが、出穂時期が平年よりも遅く、出穂後に比較的好天に恵まれ、また防除の徹底により、発生面積はやや多に留まった。

イ 発生経過



③ 紋枯病

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：少 程度：やや低

出穂後の7月に発生が見られたが、分けつ数が少なく、発病に好適な株内湿度になりにくかったために、発生面積は平年よりも少なかった。

(イ) 普通期稲 面積：並 程度：並

7月には中西部および西部で発生が見られた。8～9月には発生が増加し、ほぼ全域で発生が見られたが、発生面積は平年並であった。

イ 発生経過



水稻における紋枯病の発生推移

④ ごま葉枯病

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：並 程度：やや高

7月に発生が見られた。発生面積は平年並であったが、県中央部では発病程度の高いほ場も見られた。

(イ) 普通期稲 面積：やや多 程度：やや低

出穂前の7月には県中央部と中西部で発病が見られた。8月以降、県下全域で発病が見られ、平年よりも発生面積がやや多かった。上位葉が枯死するような発病程度の高いほ場も見られたが、全般的には、発病程度は平年よりもやや低かった。

イ 発生経過



水稻におけるごま葉枯病の発生推移

⑤ 稲こうじ病

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：少 程度：低

巡回調査での発生は見られなかった。

(イ) 普通期稲 面積：多 程度：高

8月には発生が見られなかったが、9月に中山間地を中心に多発し、発生面積は平年の3倍に達した。発病程度の高いほ場も多かった。穂ばらみ期～出穂期と天候不良が重なったため、発生が助長されたと考えられる。

イ 発生経過



(2) 虫 害

① ニカメイガ

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：多 程度：並

6～7月に発生が見られ、6月の発生面積は中央部を中心に平年より多かったが、発生程度は平年並であった。

(イ) 普通期稲 面積：少 程度：低

巡回調査での発生は見られなかった。

イ 発生経過



② ツマグロヨコバイ

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：多 程度：やや高

6～7月に発生が見られ、6月の発生面積は平年よりも多く、県東部を中心に発生程度の高いほ場も見られた。

(イ) 普通期稲 面積：少 程度：並

県下全体で平年より少なく、発生程度の高いほ場も見られなかった。

イ 発生経過



③ ヒメトビウンカ

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：多 程度：並

6～7月に発生が見られ、県東部と中央部を中心に、発生面積は平年に比べ多かったが、発生程度の高いほ場は見られなかった。

(イ) 普通期稲 面積：並 程度：やや低

県中央部と中西部を中心に発生が見られたが、平年並の発生であった。

イ 発生経過



④ セジロウンカ

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：やや多 程度：やや低

6～7月に発生が見られ、発生面積は平年よりもやや多かったが、発生程度の高いほ場は見られなかった。

(イ) 普通期稲 面積：並 程度：並

7～8月にかけて発生が増加したが、発生面積は平年並であった。

イ 発生経過



⑤ トビイロウンカ

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：多 程度：並

7月に発生が見られ、発生面積は平年よりも多かった（技術情報第6号参照）が、発生程度は平年並で、実害はなかった。梅雨入りが例年よりも早かったため早期に飛来していたと推測される。

(イ) 普通期稲 面積：やや少 程度：低

8月の発生面積は平年よりも多かった（技術情報第7号参照）が、9月には平年よりも少なくなった。8月中旬～下旬の天候不良と防除の徹底により、急激に密度が低下したと考えられる。

イ 発生経過



⑥ コブノメイガ

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：少 程度：低

7月に県東部と西部でわずかに見られた程度の発生であり、平年よりも少なかった。

(イ) 普通期稲 面積：少 程度：低

7月から9月にかけて県下全域でわずかに見られた程度の発生であり、平年よりも少なかった。

イ 発生経過




⑦ フタオビコヤガ

ア 発生概況

- (ア) 早期稲 面積：少 程度：低
6月に県中央部でわずかに見られた程度の発生であり、平年よりも少なかった。
- (イ) 普通期稲 面積：少 程度：やや低
7～8月にかけて県西部でわずかに見られた程度の発生であり、平年よりも少なかった。

イ 発生経過




⑧ イネミズゾウムシ

ア 発生概況

- (ア) 早期稲 面積：並 程度：並
発生面積は、県西部では平年よりもやや多かったが、全体では平年並であり、実害はなく、発生程度の高いほ場も見られなかった。
- (イ) 普通期稲 面積：少 程度：低
6月に県下全域で発生が確認されたが、発生面積は平年に比べ少なく、発生程度は低かった。

イ 発生経過



⑨ アザミウマ類

ア 発生概況

(ア) 早期稲 面積：並 程度：並

6月中・下旬に行ったすくい取り調査では、県中西部で発生面積が平年よりも多かったが、全体では平年並の発生であった（アザミウマ類すくい取り調査結果および技術情報第3号参照）。

⑩ 斑点米カメムシ類

ア 発生概況

(ア) 早期稲 面積：並 程度：並

出穂期のすくい取り調査では、調査ほ場の74%で斑点米カメムシ類の発生が見られた。発生面積は、県東部で平年よりも多かったが、全体では平年並であった（斑点米カメムシ類すくい取り調査結果および技術情報第5号参照）。主な発生種は、クモヘリカメムシ、アカスジカスミカメ、イネカメムシであった。

(イ) 普通期稲 面積：並 程度：並

出穂期のすくい取り調査では、調査ほ場の84%で斑点米カメムシ類の発生が見られたが、発生面積は平年並であった。（斑点米カメムシ類すくい取り調査結果および技術情報第8号参照）。主な発生種は、クモヘリカメムシ、イネカメムシであった。

⑪ スクミリンゴガイ

ア 発生概況


(ア) 早期稲 面積：やや多 程度：やや高

冬期が低温だったために、一部を除いて越冬個体は平年よりも少なめであったが、5月の発生面積は平年よりも多かった（技術情報第1号参照）。全般的には、県東部と中西部で発生面積が平年よりも多く、県全体では平年よりもやや多かった。

(イ) 普通期稲 面積：多 程度：やや高

いずれの地域も発生が多く、県全体では平年の2倍程度の発生面積となった。発生程度の高いほ場では、欠株が目立った。

イ 発生経過



イ 早期稲（東部）

東部		2021年										栽培面積										670 ha				
病害虫名	年別	5月					6月					7月					8月					最高発生面積				
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計
苗いもち	本年																									
	平年																									
葉いもち	本年										15.0	15.0			185.4		185.4							185.4		185.4
	平年										10.8	10.8			0.2	31.0	31.3							0.2	31.0	31.3
穂いもち	本年																									
	平年														0.9	2.5	3.4							0.9	2.5	3.4
紋枯病	本年																									
	平年										0.5	0.5			4.6	34.3	38.9							4.6	34.3	38.9
ばか苗病	本年																									
	平年																									
もみ枯細菌病	本年																									
	平年																									
白葉枯病	本年																									
	平年																									
疑似紋枯病	本年																									
	平年																									
黄化萎縮病	本年																									
	平年																									
ごま葉枯病	本年																									
	平年													1.1	1.8	6.0	8.9							1.1	1.8	6.0
稲こうじ病	本年																									
	平年																									
萎縮病	本年																									
	平年																									
縞葉枯病	本年																									
	平年																									
黒しゅ病	本年																									
	平年																									
ツマグロヨコバイ	本年							11.2	33.5	11.2	55.9				11.2	11.2							11.2	33.5	11.2	55.9
	平年				0.7	0.7				20.3	20.3			2.0	27.2	29.3								2.0	27.2	29.3
ヒメトビウンカ	本年							11.2		44.7	55.9			98.3	6.7	105.0								98.3	6.7	105.0
	平年									0.5	0.5			0.2	1.5	1.7								0.2	1.5	1.7
セジロウンカ	本年														17.9	17.9									17.9	17.9
	平年				2.0	2.0			0.4	27.5	27.9			4.5	52.1	56.6								4.5	52.1	56.6
トビイロウンカ	本年														6.7	6.7									6.7	6.7
	平年														1.8	1.8									1.8	1.8
ニカメイガ	本年														2.2	2.2									2.2	2.2
	平年																									
コブノメイガ	本年														2.2	2.2									2.2	2.2
	平年													0.7	2.9	3.6								0.7	2.9	3.6
イネミズゾウムシ	本年				55.8	55.8																			55.8	55.8
	平年				56.3	56.3																			56.3	56.3
斑点米カメムシ類	本年									11.2	11.2	55.9	167.5	223.3	223.3	670.0							55.9	167.5	223.3	670.0
	平年									8.4	8.4	28.5	62.8	154.7	204.5	450.6							28.5	62.8	154.7	204.5
イネヨトウ	本年																									
	平年																									
アワヨトウ	本年																									
	平年																									
フタオビコヤガ	本年																									
	平年									0.0	0.0				2.2	2.2									2.2	2.2
イチモンジセセリ	本年																									
	平年																									
イネキンウワバ	本年																									
	平年									0.1	0.1														0.1	0.1
イネゾウムシ	本年																									
	平年																									
イネカラバエ	本年																									
	平年																									
イネヒメハモグリハエ	本年																									
	平年																									
アザミウマ類	本年							279.2	279.2	558.4														279.2	279.2	558.4
	平年							5.6	5.6	111.7	312.7	435.5											5.6	5.6	111.7	312.7
イネクロカメムシ	本年																									
	平年																									
スクミリンゴガイ	本年			223.3		223.3				11.2	33.5	44.7			112.0		112.0							223.3		223.3
	平年			20.5	77.9	98.3				4.9	149.9	154.8			2.8	152.3	155.1							2.8	152.3	155.1
イネシガレセンチュウ	本年																									
	平年																									

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

エ 早期稲（中西部）

中西部		作期：早期稲		2021年																栽培面積		691 ha					
病害虫名	年別	甚	多	5月 中	少	計	甚	多	6月 中	少	計	甚	多	7月 中	少	計	甚	多	8月 中	少	計	甚	多	最高発生面積	中	少	計
苗いもち	本年																										
	平年																										
葉いもち	本年									43.4	43.4				51.3	51.3									51.3	51.3	
	平年								0.5	73.1	73.6			0.4	51.9	52.3								0.5	73.1	73.6	
穂いもち	本年														9.9	9.9									9.9	9.9	
	平年													0.6	12.2	12.7								0.6	12.2	12.7	
紋枯病	本年														4.9	4.9									4.9	4.9	
	平年																										
ばか苗病	本年																										
	平年																										
もみ枯細菌病	本年																										
	平年																										
白葉枯病	本年																										
	平年																										
疑似紋枯病	本年																										
	平年																										
黄化萎縮病	本年																										
	平年																										
ごま葉枯病	本年														79.0	79.0									79.0	79.0	
	平年									5.5	5.5			2.2	43.5	45.7								2.2	43.5	45.7	
稲こうじ病	本年																										
	平年																										
萎縮病	本年																										
	平年																										
縞葉枯病	本年																										
	平年																										
黒しゅ病	本年																										
	平年																										
ツマグロヨコバイ	本年									9.9	9.9				9.9	9.9									9.9	9.9	
	平年									16.7	16.7			0.5	12.4	12.9									16.7	16.7	
ヒメトビウンカ	本年									7.9	7.9				33.6	33.6									33.6	33.6	
	平年				0.2	0.2			0.1	11.1	11.2			1.7	42.1	43.8								1.7	42.1	43.8	
セジロウンカ	本年									17.8	17.8				73.0	73.0									73.0	73.0	
	平年								0.1	31.4	31.6				54.5	54.5									54.5	54.5	
トビイロウンカ	本年														2.0	2.0									2.0	2.0	
	平年																										
ニカメイガ	本年									0.3	0.3				24.5	24.5									24.5	24.5	
	平年																										
コブノメイガ	本年																										
	平年														2.2	2.2									2.2	2.2	
イネミズゾウムシ	本年				76.0	76.0																			76.0	76.0	
	平年			6.3	193.0	199.3			1.6	21.0	22.6													6.3	193.0	199.3	
斑点米カメムシ類	本年												49.4	148.1	345.5	542.9							49.4	148.1	345.5	542.9	
	平年											14.8	47.7	159.5	227.8	449.9			14.8	47.7	159.5		49.4	148.1	345.5	542.9	
イネヨトウ	本年																										
	平年									3.5	3.5				3.5	3.5									3.5	3.5	
アワヨトウ	本年																										
	平年																										
フタオビコヤガ	本年																										
	平年				0.2	0.2				0.4	0.4				0.3	0.3									0.4	0.4	
イチモンジセセリ	本年				2.0	2.0																			2.0	2.0	
	平年									0.3	0.3				3.1	3.1									3.1	3.1	
イネキンウワバ	本年																										
	平年																										
イネゾウムシ	本年				11.1	11.1																			11.1	11.1	
	平年			3.5	70.7	74.1				15.7	15.7													3.5	70.7	74.1	
イネカラバエ	本年																										
	平年																										
イネヒメハメグサハエ	本年																										
	平年				0.0	0.0																			0.0	0.0	
アザミウマ類	本年									197.4	197.4														197.4	197.4	
	平年								20.1	67.1	87.3													20.1	67.1	87.3	
イネクロカメムシ	本年									7.1	7.1														7.1	7.1	
	平年																										
スクミリンゴガイ	本年			148.1	345.5	493.6			148.1	197.4	345.5		49.4	98.7	296.1	444.2								148.1	345.5	493.6	
	平年			17.0	76.4	128.5			1.5	51.9	163.3		5.0	53.2	135.3	193.4							17.0	76.4	128.5	221.8	
イネシガレセンチュウ	本年																										
	平年																										

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

オ 早期稲（西部）

西部		2021年																				栽培面積 1,448 ha				
病害虫名		作期：早期稲				5月				6月				7月				8月				最高発生面積				
		基	多	中	少	計	基	多	中	少	計	基	多	中	少	計	基	多	中	少	計	基	多	中	少	計
苗いもち	本年																									
	平均																									
葉いもち	本年				0.6	0.6				10.9	401.8	412.7		47.1	112.2	550.2	709.5						47.1	112.2	550.2	709.5
	平均				0.4	0.4				0.5	6.6	267.8	274.9		0.4	8.9	123.9	133.2					0.5	6.6	267.8	274.9
穂いもち	本年																									
	平均																									
紋枯病	本年																									
	平均																									
ばか苗病	本年																									
	平均																									
もみ枯細菌病	本年																									
	平均																									
白葉枯病	本年																									
	平均																									
疑似紋枯病	本年																									
	平均																									
黄化萎縮病	本年																									
	平均																									
ごま葉枯病	本年																									
	平均																									
稲こうじ病	本年																									
	平均																									
萎縮病	本年																									
	平均																									
縞葉枯病	本年																									
	平均																									
黒しゅ病	本年																									
	平均																									
ツマグロヨコバイ	本年										54.3	54.3				10.9	10.9								54.3	54.3
	平均										6.5	161.6	168.2				11.6	172.3						11.6	172.3	183.9
ヒメトビウンカ	本年																									
	平均																									
セジロウンカ	本年																									
	平均																									
トビイロウンカ	本年																									
	平均																									
ニカメイガ	本年																									
	平均																									
コブノメイガ	本年																									
	平均																									
イネミズゾウムシ	本年																									
	平均																									
斑点米カメムシ類	本年																									
	平均																									
イネヨトウ	本年																									
	平均																									
アワヨトウ	本年																									
	平均																									
フタオビコヤガ	本年																									
	平均																									
イチモンジセセリ	本年																									
	平均																									
イネキンウワバ	本年																									
	平均																									
イネゾウムシ	本年																									
	平均																									
イネカラバエ	本年																									
	平均																									
イネヒメハダグサハエ	本年																									
	平均																									
アザミウマ類	本年																									
	平均																									
イネクロカメムシ	本年																									
	平均																									
スクミリンゴガイ	本年																									
	平均																									
イネシガレセンチュウ	本年																									
	平均																									

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

キ 普通期稲（東部）

東部		作期:普通期稲 2021年															栽培面積 395 ha					
病害虫名	年別	6月				7月				8月				9月				最高発生面積				
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	
苗いもち	本年				0.1	0.1														0.1	0.1	
	平年																					
葉いもち	本年				13.2	13.2			13.2	76.4	89.6		26.3	105.3	2.6	134.2			26.3	105.3	2.6	134.2
	平年				2.2	2.2		0.3	1.6	2.7	4.7			1.8	10.4	12.3		0.1	0.7	16.1	16.9	
穂いもち	本年																					
	平年														0.3	0.7	1.0		7.9	18.4	26.3	
紋枯病	本年																					
	平年																					
ばか苗病	本年																					
	平年																					
もみ枯細菌病	本年																					
	平年																					
白葉枯病	本年																					
	平年																					
疑似紋枯病	本年																					
	平年																					
黄化萎縮病	本年																					
	平年																					
ごま葉枯病	本年																					
	平年																					
稲こうじ病	本年																					
	平年																					
萎縮病	本年																					
	平年																					
縞葉枯病	本年																					
	平年																					
黒しゅ病	本年																					
	平年																					
ツマグロヨコバイ	本年																					
	平年																					
ヒメトビウンカ	本年																					
	平年																					
セジロウンカ	本年																					
	平年																					
トビイロウンカ	本年																					
	平年																					
ニカメイガ	本年																					
	平年																					
コブノメイガ	本年																					
	平年																					
イネミズゾウムシ	本年																					
	平年																					
斑点米カメムシ類	本年																					
	平年																					
イネヨトウ	本年																					
	平年																					
アワヨトウ	本年																					
	平年																					
フタオビコヤガ	本年																					
	平年																					
イチモンジセセリ	本年																					
	平年																					
イネキンウワバ	本年																					
	平年																					
イネゾウムシ	本年																					
	平年																					
イネカラバエ	本年																					
	平年																					
イネヒメハモグリハエ	本年																					
	平年																					
アザミウマ類	本年																					
	平年																					
イネクロカメムシ	本年																					
	平年																					
スクミリンゴガイ	本年																					
	平年																					
イネシガレセンチュウ	本年																					
	平年																					

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

ク 普通期稲（中央部）

中央部		2021年															栽培面積				
病害虫名		年別		6月		7月		8月		9月		最高発生面積		1,247 ha							
		本年	多	中	少	計	本年	多	中	少	計	本年	多	中	少	計	本年	多	中	少	計
苗いもち		本年																			
		本年																			
葉いもち		本年			2.8	2.8	74.8	160.7	429.5	665.1	11.1	152.4	279.9	443.4	84.2	84.2	74.8	160.7	429.5	665.1	
		本年			45.4	45.4	6.0	62.0	278.5	346.6	0.5	2.8	9.1	170.4	182.8		6.0	62.0	278.5	346.6	
穂いもち		本年																			
		本年																			
紋枯病		本年																			
		本年																			
ばか苗病		本年																			
		本年																			
もみ枯細菌病		本年																			
		本年																			
白葉枯病		本年																			
		本年																			
疑似紋枯病		本年																			
		本年																			
黄化萎縮病		本年																			
		本年																			
ごま葉枯病		本年																			
		本年																			
稲こうじ病		本年																			
		本年																			
萎縮病		本年																			
		本年																			
縞葉枯病		本年																			
		本年																			
黒しゅ病		本年																			
		本年																			
ツマグロヨコバイ		本年			19.4	19.4			58.2	58.2											
		本年			23.0	24.1			80.9	85.8											
ヒメトビウンカ		本年			16.6	16.6			24.9	24.9											
		本年			3.9	3.9			36.9	36.9											
セジロウンカ		本年			13.9	13.9			36.0	36.0											
		本年			14.8	14.8			167.2	175.2											
トビイロウンカ		本年																			
		本年																			
ニカメイガ		本年																			
		本年																			
コブノメイガ		本年																			
		本年																			
イネミズゾウムシ		本年			173.2	173.2															
		本年			5.2	415.7			24.5	24.5											
斑点米カメムシ類		本年																			
		本年																			
イネヨトウ		本年																			
		本年																			
アワヨトウ		本年																			
		本年																			
フタオビコヤガ		本年																			
		本年																			
イチモンジセセリ		本年																			
		本年																			
イネキンウワバ		本年																			
		本年																			
イネゾウムシ		本年			69.3	69.3															
		本年			103.4	103.4			19.1	19.1											
イネカラバエ		本年																			
		本年																			
イネヒメハモグリハエ		本年																			
		本年			2.0	11.7															
アザミウマ類		本年																			
		本年																			
イネクロカメムシ		本年																			
		本年																			
スクミリンゴガイ		本年			69.3	69.3															
		本年			10.8	36.3			77.9	125.0											
イネシガレセンチュウ		本年																			
		本年																			

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

ケ 普通期稲（中西部）

中西部		2021年																		栽培面積 2,381 ha									
病害虫名		年別		作期:普通期		6月		7月		8月		9月		最高発生面積		2,381 ha													
		本年	多	中	少	計	本年	多	中	少	計	本年	多	中	少	計	本年	多	中	少	計	本年	多	中	少	計			
苗いもち		本年																											
		本年																											
葉いもち		本年			50.8	50.8	41.3	85.7	193.7	1,165.1	1,485.7		92.1	590.5	682.6		32.8	3.3	131.4	167.5	41.3	85.7	193.7	1,165.1	1,485.7				
		本年	12.4	121.6	133.9	7.4	33.3	167.0	647.8	855.6		20.6	367.1	387.7			0.3	40.7	41.0	7.4	33.3	167.0	647.8	855.6					
穂いもち		本年															9.9	95.2	410.5	515.6	9.9	95.2	410.5	515.6					
		本年															7.1	73.8	399.3	482.3	2.1	7.1	73.8	399.3	482.3				
紋枯病		本年								3.2	3.2						16.4	29.6	39.4	85.4	16.4	29.6	39.4	85.4					
		本年								2.1	2.1						2.4	15.4	17.8	0.6	3.5	11.8	74.0	89.9					
ばか苗病		本年																											
		本年																											
もみ枯細菌病		本年																											
		本年																											
白葉枯病		本年																											
		本年																											
疑似紋枯病		本年																											
		本年																											
黄化萎縮病		本年																											
		本年																											
ごま葉枯病		本年								25.4	25.4		88.9	298.4	1,041.3	1,428.6		180.6	679.8	1,241.4	2,101.8		180.6	679.8	1,241.4	2,101.8			
		本年								7.0	58.6	65.6		53.3	192.9	729.4	975.6		0.9	161.0	409.4	1,020.5	1,591.7	0.9	161.0	409.4	1,020.5	1,591.7	
稲こうじ病		本年															821.0	656.8	1,560.0	821.0	82.1	656.8	1,560.0	821.0	82.1	656.8	1,560.0		
		本年															7.9	15.4	23.3	79.6	31.1	85.1	332.6	528.4	79.6	31.1	85.1	332.6	528.4
萎縮病		本年																											
		本年																											
縞葉枯病		本年																											
		本年																											
黒しゅ病		本年																											
		本年																											
ツマグロヨコバイ		本年			9.5	9.5				34.9	34.9				38.1	38.1				3.3	3.3				38.1	38.1			
		本年	0.3	1.3	17.1	18.6			0.6	104.1	104.7				92.3	92.3				54.7	54.7			0.6	104.1	104.7			
ヒメトビウンカ		本年								28.6	28.6		6.3	114.3	120.6				3.3	177.3	180.6			3.3	177.3	180.6			
		本年			4.3	4.3			0.9	35.7	36.6				95.4				1.8	54.4	56.2			3.7	91.8	95.4			
セジロウンカ		本年								273.0	273.0		38.1	615.9	654.0				170.8	170.8			38.1	615.9	654.0				
		本年			43.8	43.8			8.3	469.2	477.5				392.7				3.8	166.0	169.8			8.3	469.2	477.5			
トビイロウンカ		本年																											
		本年								0.6	0.6				184.1	184.1				42.7	42.7				184.1	184.1			
ニカメイガ		本年															9.5	12.3	33.9	101.1	156.8		9.5	12.3	33.9	101.1	156.8		
		本年																											
コブノメイガ		本年																											
		本年																											
イネミズゾウムシ		本年																											
		本年			158.9	158.9																							
斑点米カメムシ類		本年			416.7	416.7																							
		本年																											
イネヨトウ		本年																											
		本年																											
アワヨトウ		本年																											
		本年																											
フタオビコヤガ		本年																											
		本年																											
イチモンジセセリ		本年																											
		本年																											
イネキンウワバ		本年																											
		本年																											
イネゾウムシ		本年																											
		本年																											
イネカラバエ		本年																											
		本年																											
イネヒメハモグリハエ		本年																											
		本年			2.4	1.6	4.0																	2.4	1.6	4.0			
アザミウマ類		本年																											
		本年																											
イネクロカメムシ		本年																											
		本年																											
スクミリンゴガイ		本年	79.4	238.1	158.7	476.2			396.8	158.7	555.6		79.4	396.8	79.4	555.6		164.2	574.7	164.2	903.1		164.2	574.7	164.2	903.1			
		本年		54.1	88.2	142.2			38.2	114.9	157.0			43.3	97.0	140.4			17.5	17.5	34.9		4.0	38.2	114.9	157.0			
イネシガレセンチュウ		本年																											
		本年																											

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

BLASTAM

BLASTAMによる葉いもち感染好適条件の判定結果(2021年)

日付	本川	本山	大栃	高知	後免	日章	安芸	橋原	須崎	窪川	室戸岬	江川崎	佐賀	宿毛	中村	清水
5/1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
5/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/7	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—
5/8	—	3	—	4	4	1	4	3	3	3	—	3	4	—	1	—
5/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/10	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/12	—	—	3	—	—	—	—	3	1	—	—	4	—	—	4	—
5/13	3	1	1	1	1	1	—	4	—	?	—	4	—	—	—	—
5/14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/16	1	1	1	—	—	—	●	4	—	—	—	1	—	—	1	—
5/17	—	—	1	●	—	—	●	—	1	—	—	—	1	—	—	—
5/18	4	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
5/19	1	●	4	●	●	●	●	4	4	●	—	●	●	4	●	●
5/20	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	●	—
5/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/22	3	—	●	●	●	●	●	3	●	●	—	●	●	●	●	—
5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/24	3	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/25	3	1	1	●	1	1	●	3	4	3	—	1	1	●	1	—
5/26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
5/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—
5/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日付	本川	本山	大栃	高知	後免	日章	安芸	橋原	須崎	窪川	室戸岬	江川崎	佐賀	宿毛	中村	清水
6/1	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/2	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/4	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
6/5	3	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●
6/6	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	4	—	4	—
6/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/11	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
6/12	1	●	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	—
6/13	1	●	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	—
6/14	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	—	—
6/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
6/16	4	4	—	—	—	●	—	4	—	4	—	—	4	●	—	—
6/17	—	—	—	—	?	—	—	—	●	●	—	—	—	—	4	—
6/18	4	3	—	—	3	—	—	3	3	—	—	—	—	●	—	—
6/19	4	●	●	—	●	●	●	4	●	4	—	4	—	—	—	—
6/20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	●	—	—
6/25	1	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/26	1	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6/27	—	●	—	—	●	—	—	4	—	—	—	—	—	●	—	●
6/28	—	—	—	—	—	—	—	1	●	3	—	—	3	—	—	—
6/29	4	●	—	●	●	●	—	1	—	●	—	—	—	—	●	—
6/30	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

日付	本川	本山	大栃	高知	後免	日章	安芸	橋原	須崎	窪川	室戸岬	江川崎	佐賀	宿毛	中村	清水
7/1	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—
7/2	1	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	—
7/3	—	●	—	3	—	3	—	●	—	●	—	—	—	●	3	—
7/4	●	●	—	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
7/5	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/8	—	—	2	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—
7/10	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
7/11	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
7/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/13	—	●	—	—	—	—	—	●	2	—	—	—	—	—	—	—
7/14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
7/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—
7/16	●	●	●	2	2	—	2	●	●	●	—	2	—	2	2	—
7/17	●	4	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—
7/18	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/19	4	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	3	—	●	—
7/20	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表の見方

●:感染好適条件

葉面湿潤時間がいもち病菌の感染に十分な10時間以上を満たしており、湿潤時間中の平均気温が15～25度、かつ前5日間の平均気温が20～25度で、葉いもちの大量感染に好適な条件が出現した場合。

1～4:準感染好適条件

葉面湿潤時間、温度等の条件の一部がいもち病の感染に不足している場合。これが続いても発病が始まるので、注意が必要である。

- 1:前5日間の平均気温は20度未満だが、湿潤時間は条件を満たす。
- 2:前5日間の平均気温は25度を超えているが、湿潤時間は条件を満たす。
- 3:湿潤時間中の平均気温は15～25度でないが、湿潤時間は条件を満たす。
- 4:湿潤時間中の平均気温は15～25度で、湿潤時間がやや不足。

—:感染好適条件なし

左記の好適条件、準好適条件に当てはまらない場合。

? :欠測値があったため、判定できなかった場合。

ニカメイガの半旬別誘殺数（予察灯）

4月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	1.0	0.0
	平年	0.0	0.0

5月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.7
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.4
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.9
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.0
計	本年	1.0	0.0
	平年	0.0	3.0

6月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.6
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.3
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.6
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	3.2
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.4
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	5.7
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	12.8

7月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	5.2
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.8
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	3.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.1
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.8
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.1
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	15.0

8月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1
2	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	0.1
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.6
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.7
計	本年	2.0	0.0
	平年	0.0	2.5

9月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.8
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.1
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.7
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.6
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	7.3

10月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

ツマグロヨコバイの半旬別誘殺数（予察灯）

4月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

5月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.2	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.2	0.0

6月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	2.0	0.0
	平年	1.1	0.0
2	合計	2.0	0.0
	平年	1.5	0.3
3	合計	3.0	0.0
	平年	3.0	0.1
4	合計	4.0	0.0
	平年	1.9	1.7
5	合計	1.0	0.0
	平年	1.1	0.7
6	合計	7.0	0.0
	平年	1.8	1.5
計	本年	19.0	0.0
	平年	10.4	4.3

7月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	32.0	0.0
	平年	14.9	1.1
2	合計	49.0	0.0
	平年	22.1	3.3
3	合計	33.0	1.0
	平年	33.0	1.5
4	合計	10.0	0.0
	平年	46.4	2.7
5	合計	8.0	0.0
	平年	71.8	3.4
6	合計	68.0	1.0
	平年	96.9	32.9
計	本年	200.0	2.0
	平年	285.1	44.9

8月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	27.0	2.0
	平年	233.9	7.8
2	合計	34.0	0.0
	平年	211.7	7.6
3	合計	41.0	0.0
	平年	290.6	3.9
4	合計	105.0	3.0
	平年	169.1	1.0
5	合計	44.0	0.0
	平年	51.7	0.6
6	合計	6.0	0.0
	平年	27.9	0.2
計	本年	257.0	5.0
	平年	984.9	21.1

9月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	17.0	0.0
	平年	15.3	0.4
2	合計	16.0	0.0
	平年	17.2	0.1
3	合計	22.0	0.0
	平年	0.8	0.2
4	合計	44.0	0.0
	平年	0.3	0.2
5	合計	29.0	0.0
	平年	0.7	0.1
6	合計	26.0	0.0
	平年	0.8	0.0
計	本年	154.0	0.0
	平年	35.1	1.0

10月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	2.0	0.0
	平年	0.6	0.0
2	合計	2.0	0.0
	平年	0.2	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.1	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	4.0	0.0
	平年	0.9	0.0

ヒメトビウンカの半旬別誘殺数（予察灯）

4月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

5月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.6
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.6
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.6
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.3
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	2.1

6月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1

7月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	1.0	0.0
	平年	0.2	0.1
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.2
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.3	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.6
計	本年	1.0	0.0
	平年	0.5	1.0

8月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	0.1
2	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.5
4	合計	2.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	1.0	0.0
	平年	0.1	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	5.0	0.0
	平年	0.1	0.6

9月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1
5	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	0.6
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.4
計	本年	1.0	0.0
	平年	0.0	1.1

10月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

セジロウンカの半旬別誘殺数（予察灯）

4月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

5月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

6月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.6
3	合計	1.0	0.0
	平年	0.2	11.3
4	合計	0.0	0.0
	平年	1.1	11.4
5	合計	0.0	0.0
	平年	1.2	5.8
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	5.5
計	本年	1.0	0.0
	平年	2.5	37.6

7月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.4	9.5
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.1
3	合計	2.0	0.0
	平年	0.0	2.8
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.1	3.6
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	3.4
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.1	3.1
計	本年	2.0	0.0
	平年	0.6	24.5

8月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	4.6
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.2
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	6.4
4	合計	16.0	0.0
	平年	0.0	2.8
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.5
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	3.7
計	本年	17.0	0.0
	平年	0.0	19.2

9月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	5.9
2	合計	1.0	0.0
	平年	0.0	6.6
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.1
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.3
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.1
計	本年	1.0	0.0
	平年	0.0	20.0

10月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.7
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	4.4
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.3
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	7.5

トビイロウンカの半旬別誘殺数（予察灯）

4月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

5月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

6月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	3.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.2
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	2.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	3.7
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	9.9

7月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.6
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.1
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.2
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	120.2
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	123.2

8月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.2	10.1
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.2
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.2
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.6	0.1
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.1	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.1	0.3
計	本年	0.0	0.0
	平年	1.0	10.9

9月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.2	0.4
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.1	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.5	0.4
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.3	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	1.3
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.2
計	本年	0.0	0.0
	平年	1.1	2.3

10月		南国市 廿枝	四万十市 竹島
半旬			
1	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
2	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
3	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
4	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
5	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
6	合計	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0
計	本年	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0

早期稲におけるアザミウマ類すくい取り調査結果（捕虫網10回振り）（6月中旬）

地域	調査場所		令和3年度				令和2年度				令和元年度				平成30年度			
			調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計
東部	室戸市	元	1	14	1	15	6/15	6	0	6	6/19	27	3	30	6/25	101	10	111
		2	6/15	11	3	14		7	1	8		6	0	6		121	15	136
	室戸市	領家	1	1	0	1	6/15	0	0	0	6/19	18	0	18	6/25	10	0	10
		2	6/15	5	0	5		0	0	0		5	0	5		13	0	13
	安芸市	川北	1	20	0	20	6/17	90	0	90	6/20	44	0	44	6/19	184	5	189
		2	6/17	55	11	66		58	0	58		26	0	26		136	1	137
	安芸市	井ノ口	1	123	0	123	6/17	110	0	110	6/20	38	0	38	6/19	74	0	74
		2	6/17	68	1	69		69	0	69		25	0	25		34	0	34
安芸市	黒鳥	1	87	1	88	6/17	32	0	32	6/20	43	0	43	6/19	85	0	85	
	2	6/17	47	0	47		22	0	22		48	0	48		37	0	37	
芸西村	芸西	1	151	0	151	6/17	28	0	28	6/20	5	0	5	6/19	15	0	15	
	2	6/17	43	0	43		21	0	21		18	0	18		39	0	39	
ほ場平均(東部)				52.1	1.4	53.5		36.9	0.1	37.0		25.3	0.3	25.5		70.8	2.6	73.3
中央部	香南市	香我美町	1	3	1	4	6/16	14	2	16	6/17	6	2	8	6/15	6	0	6
		徳王子	2	6/14	43	16		59	43	38		81	2	0		2	75	35
	香南市	吉川町	1	5	0	5	6/16	28	9	37	6/17	8	2	10	6/15	25	3	28
		吉原	2	6/14	3	0		3	12	1		13	31	10		41	8	1
	香南市	野市町	1	132	17	149	6/16	36	21	57	6/17	55	6	61	6/15	137	60	197
		富家	2	6/14	233	68		301	87	20		107	29	9		38	68	20
	香南市	野市町	1	2	0	2	6/16	18	0	18	6/17	25	6	31	6/15	20	5	25
		父養寺	2	6/14	3	1		4	64	1		65	9	2		11	14	2
	香美市	土佐山田町	1	10	1	11	6/16	106	42	148	6/17	14	2	16	6/15	72	7	79
		中野	2	6/14	7	3		10	63	18		81	25	9		34	54	4
	南国市	野田・北	1	34	22	56	6/16	412	100	512	6/17	103	24	127	6/15	76	49	125
		2	6/14	12	9	21		149	78	227		612	171	783		51	10	61
	南国市	野田・南	1	0	0	0	6/16	232	57	289	6/17	501	180	681	6/15	101	10	111
		2	6/14	0	0	0		348	104	452		504	276	780		108	26	134
	南国市	前浜	1	10	1	11	6/16	97	15	112	6/17	74	33	107	6/15	56	15	71
		2	6/14	23	2	25		57	14	71		20	1	21		55	19	74
	南国市	三和	1	30	2	32	6/16	36	37	73	6/17	43	10	53	6/15	44	4	48
		2	6/14	75	5	80		76	26	102		31	1	32		12	1	13
	南国市	長岡	1	1	0	1	6/16	10	2	12	6/17	10	2	12	6/15	6	1	7
		2	6/14	3	0	3		7	1	8		16	5	21		2	0	2
	南国市	久礼田	1	5	0	5	6/16	21	11	32	6/17 ー	19	7	26	6/15	0	10	10
2		6/14	3	0	3	6		3	9	—		—	—	9		0	9	
高知市	大津	1	15	4	19	6/16	17	4	21	6/17	0	0	0	6/15	7	1	8	
	2	6/15	8	0	8		80	23	103		27	4	31		19	7	26	
高知市	布師田	1	35	10	45	6/16	20	11	31	6/17	0	0	0	6/15	3	3	6	
	2	6/15	19	0	19		22	2	24		7	6	13		12	1	13	
高知市	介良	1	10	1	11	6/16	2	0	2	6/17	12	4	16	6/18	5	0	5	
	2	6/15	17	1	18		7	2	9		15	8	23		10	0	10	
高知市	五台山	1	33	3	36	6/16	17	4	21	6/17	5	2	7	6/18	17	5	22	
	2	6/15	32	1	33		14	14	28		4	0	4		3	1	4	
高知市	春野町	1	4	0	4	6/16	40	12	52	6/19	4	2	6	6/18	1	0	1	
	弘岡上	2	6/15	15	6		21	10	5		15	5	1		6	2	1	3
高知市	春野町	1	0	0	0	6/16	4	5	9	6/19	6	0	6	6/18	2	0	2	
	西分	2	6/15	1	0		1	2	0		2	3	0		3	0	0	0
高知市	春野町	1	6	1	7	6/16	10	2	12	6/19	3	1	4	6/18	1	0	1	
	諸木	2	6/15	1	0		1	9	2		11	9	2		11	2	0	2
いの町	枝川	1	6	2	8	6/15	17	5	22	6/19	7	0	7	6/18	5	0	5	
	2	6/15	11	2	13		18	2	20		15	2	17		3	0	3	
日高村	沖名	1	17	15	32	6/15	28	19	47	6/19	39	31	70	6/18	17	2	19	
	2	6/15	7	0	7		30	32	62		22	10	32		7	7	14	
ほ場平均(中央部)				21.9	4.9	26.7		56.7	18.6	75.3		59.5	21.3	80.8		27.9	7.8	35.6

※1 調査日の「—」は未調査を示す。

※2 端数処理により、合計は一致しないことがある。

地域	調査場所		令和3年度				令和2年度				令和元年度				平成30年度			
			調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計	調査日	成虫	幼虫	計
中西部	土佐市 岩戸	1	6/15	4	2	6	6/15	6	14	20	6/19	18	3	21	6/18	0	0	0
		2		6	0	6		6	12	18		12	2	14		1	1	2
	土佐市 波介	1	6/15	19	1	20	6/15	16	7	23	6/19	44	3	47	6/18	0	0	0
		2		10	2	12		28	31	59		8	0	8		5	0	5
	土佐市 鳴川	1	6/15	12	0	12	6/15	13	31	44	6/19	22	2	24	6/18	7	0	7
		2		16	2	18		18	38	56		11	6	17		2	0	2
	須崎市 浦ノ内	1	6/18	0	0	0	6/19	0	0	0	6/18	0	0	0	6/18	0	0	0
		2		0	0	0		2	0	2		0	0	0		0	0	0
	須崎市 神田	1	6/18	0	0	0	6/19	46	0	46	6/18	0	0	0	6/18	0	0	0
		2		0	0	0		10	0	10		0	0	0		0	0	0
西部	黒潮町 (旧佐賀町) 中角	1	6/17	4	0	4	6/17	22	0	22	6/19	0	0	0	6/21	1	0	1
		2		0	0	0		20	0	20		4	0	4		2	0	2
	黒潮町 (旧大方町) 伊田	1	6/17	2	0	2	6/17	17	0	17	6/19	1	0	1	6/21	5	1	6
		2		2	0	2		10	0	10		3	0	3		20	3	23
	四万十市 (旧中村市) 安並	1	6/17	3	0	3	6/16	15	0	15	6/19	5	0	5	6/21	441	49	490
		2		13	0	13		71	0	71		9	0	9		144	5	149
	四万十市 (旧中村市) 国見	1	6/17	9	8	17	6/16	46	0	46	6/19	11	0	11	6/21	20	1	21
		2		16	9	25		21	0	21		8	0	8		51	4	55
	土佐清水市 益野	1	6/17	0	0	0	6/16	6	0	6	6/19	16	0	16	6/21	1	1	2
		2		10	0	10		8	0	8		5	2	7		5	3	8
全域	宿毛市 山奈	1	6/17	0	0	0	6/16	6	0	6	6/19	4	0	4	6/21	21	5	26
		2		0	0	0		23	0	23		3	0	3		0	5	5
	宿毛市 小筑紫	1	6/17	0	0	0	6/16	9	0	9	6/19	8	0	8	6/21	14	2	16
		2		0	0	0		12	0	12		3	0	3		19	3	22
	三原村 来栖野	1	6/17	0	0	0	6/16	18	0	18	6/19	4	0	4	6/21	1	0	1
		2		2	0	2		3	0	3		2	0	2		5	0	5
	ほ場平均(西部)			3.8	1.1	4.9		19.2	0.0	19.2		5.4	0.1	5.5		46.9	5.1	52.0
	ほ場平均(全域)			19.8	2.9	22.7		40.6	10.7	51.3		34.9	10.5	45.4		33.3	5.2	38.5

※1 調査日の「-」は未調査を示す。

※2 端数処理により、合計は一致しないことがある。

斑点米カメムシ類すくい取り調査結果（捕虫網 50 回振り）

ア 早期稲（7 月上旬～中旬）

地域	調査場所		令和3年度														令和2年度			令和元年度			平成30年度										
			※1 調査日	※2 生 育 ステージ	ミナミアオカメシ			ホソハリカメシ			クモヘリカメシ			トゲシラホシカメシ			アカスジカスミカメ			その他			合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計	
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計											成
東部	室戸市	元	1 2	7/13	揃 揃	0 0	1 7	8 1	9 8	0 3	0 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 11	7/2	揃 揃	14 1	7/2	揃 揃	8 38	7/9	揃 揃	4 5						
	室戸市	領家	1 2	7/13	揃 揃	0 0	4 3	4 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 3	7/2	揃 揃	0 0	7/2	揃 揃	0 1	7/9	揃 揃	0 0							
	安芸市	黒鳥	1 2	7/2	揃 揃	10 0	10 0	2 2	13 1	13 1	1 3	1 3	62 43	62 43	イネカメ、アカヒゲホソ イネカメ、アカヒゲホソ	20 4	20 4	108 51	7/8	揃 揃	2 10	7/8	揃 揃	4 12	7/12	乳 乳	23 76						
	安芸市	井ノ口	1 2	7/13	揃 揃	0 1	0 1	0 0	1 0	1 0	2 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ	1 0	1 0	3 1	7/8	揃 揃	30 41	7/8	揃 揃	41 47	7/12	乳 乳	31 22						
	安芸市	川北	1 2	7/13	揃 揃	2 1	1 1	3 2	2 2	5 1	7 1	12 1	1 0	1 0	22 18	22 18	イネカメ	0 1	0 23	40 23	7/8	揃 揃	1 2	7/8	揃 揃	23 39	7/12	乳 乳	22 1				
	芸西村	西分	1 2	7/13	揃 揃	0 0	0 0	0 0	12 4	12 4	1 0	1 0	12 4	12 4	イネカメ イネカメ	9 3	9 3	34 11	7/8	揃 揃	15 36	7/8	出 揃	2 10	7/12	揃 揃	13 7						
東部の1ほ場当たりの平均虫数					1.1	0.2	1.3	1.5	1.0	2.5	3.3	0.8	4.0	0.5	0.0	0.5	13.4	0.0	13.4		3.1	0.1	3.2	24.8			12.7			18.8			17.0
中央部	香南市	徳王子	1 2	7/7	揃 揃	0 1	1 1	19 4	5 9	24 13	0 0	19 19	19 19	イネカメ イネカメ	38 3	38 3	82 37	7/9	揃 揃	0 3	7/4	揃 揃	19 15	7/10	乳 乳	2 2							
	香南市	吉原	1 2	7/7	始 出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ イネカメ	3 3	3 3	3 3	7/9 7/2	出 出	1 5	7/4	揃 揃	2 1	7/2	出 乳	3 4							
	香南市	富家	1 2	7/7 —	出 —	0 0	0 0	1 1	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0	1 1	7/2	出 揃	4 68	7/4	出 出	0 12	7/10 —	乳 —	9							
	香南市	父養寺	1 2	7/7	出 始	0 0	4 1	4 1	15 3	15 3	1 0	1 0	0 0	イネカメ、イネクロ、アカヒゲホソ	41 0	41 0	61 4	7/2	揃 出	20 19	7/4	揃 出	79 63	7/10	乳 乳	68 19							
	香美市	中野	1 2	7/2	出 出	0 0	5 4	5 4	3 1	3 1	0 0	3 13	3 13	イネカメ	1 0	1 0	12 18	7/2	揃 揃	10 4	7/3	揃 揃	35 79	6/26	揃 揃	16 3							
	南国市	前浜	1 2	7/7	出 出	0 0	4 2	4 2	0 0	0 0	0 0	1 1	1 1	イネカメ	1 0	1 0	6 3	7/2	揃 出	5 7	7/4	揃 揃	4 10	7/2	出 出	3 13							
	南国市	三和	1 2	7/7	出 出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0			0 0	0 1	7/2	出 揃	1 1	7/3	出 出	0 0	7/2	揃 揃	1 1							
	南国市	野田・南	1 2	— —														7/20	揃 揃	41 30	— —			7/10	揃 揃	1 1							
	南国市	野田・北	1 2	— —														7/9	揃 揃	4 18	7/3	出 揃	25 10	7/2	揃 揃	5 8							
	南国市	長岡	1 2	7/7	出 出	0 0	6 0	6 0	2 0	2 0	0 0	0 0	0 0		0	0	8 0	7/20 7/9	揃 揃	5 8	7/3	出 出	16 9	7/9	乳 乳	10 13							
	南国市	久礼田	1 2	7/7	出 出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	1 1	その他	2 0	2 0	3 1	7/2	揃 揃	53 23	7/4 —	揃 —	46 —	7/2 —	揃 —	17							
	高知市	大津	1 2	7/7	出 出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0	0	0 0	7/8	出 出	0 0	7/8	出 出	1 0	7/10	揃 揃	2 1							
	高知市	布師田	1 2	7/2	出 出	0 0	0 0	2 0	1 0	3 0	0 0	1 0	1 0	イネカメ	1 0	1 0	5 0	7/8	揃 揃	2 2	6/28	始 出	63 4	6/26	揃 出	0 0							
	高知市	介良	1 2	7/7	出 出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0	0	0 0	7/2	揃 揃	0 1	6/28	出 出	0 1	7/2	出 出	0 2							
	高知市	五台山	1 2	7/2	揃 揃	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0	0	1 0	7/2	揃 揃	7 4	6/28	揃 出	8 1	6/26	揃 揃	0							

地域	調査場所	令和3年度															令和2年度			令和元年度			平成30年度									
		※1 調査日	生 ※2 育 ステージ	ミナミアオカメシ			ホソハリカメシ			クモヘリカメシ			トゲシラホシカメシ			アカスジカスミカメ			その他			合計	※1 調査日	生 ※2 育 ステージ	合計	※1 調査日	生 ※2 育 ステージ	合計	※1 調査日	生 ※2 育 ステージ	合計	
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計											成
中央部	高知市 （春野町）	弘岡上	1 2	7/7	出 出		0 0		0 0		0 0		0 0		1 0		1 0		0 0		0 0		1 0	7/11	揃 揃	20 31	7/4	出 出	10 26	7/2	出 出	5 7
	高知市 （春野町）	西分	1 2	7/7	揃 出		0 0		0 0		0 0		0 0				0 0		0 0		0 0		7/11	揃 乳	6 20	6/28 7/4	出 揃	0 3	7/2	揃 揃	0 1	
	高知市 （春野町）	諸木	1 2	7/2 7/7	出 始	1 0	1 0		0 1		0 1		0 0			0 1		0 0		0 0		4 2	7/11	揃 揃	22 8	6/28	揃 出	23 3	7/2	乳 乳	6 9	
	いの町	枝川	1 2	7/7	出 出		0 0		0 2		0 2		8 15		0 0		5 5		0 8		2 15		10 30	7/8	揃	100 116	7/8	出 揃	42 108	— —		
	日高村	沖名	1 2	7/7	出 出	2 1	1 1	3 1	4 1	4 1	14 11	1 1	15 11		0 1		17 20	2 20	19 20		2 2		43 36	7/8	出 揃	14 27	7/4	出 出	2 14	7/9	乳 乳	14 8
中央部の1ほ場当たりの平均虫数							0.1	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0	2.9	0.5	3.3	0.1	0.0	0.1	2.9	0.1	3.0	0.0	3.1	0.1	3.1	10.7		17.8		19.8		7.1
	土佐市	岩戸	1 2	7/12	出 出		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 1	7/8	出 出	0 1	— —			7/9	乳 乳	14 3
	土佐市	波介	1 2	7/7	出 出	1 0	1 0	1 3	1 3	0 0	0 0	1 0	1 0	4 5	4 5	カスミカメ類 イネカメ、ヒメナガカメ	1 2	1 2	8 10	1 2	8 10	7/8	揃 乳	64 360	7/4	揃 揃	8 3	7/9	乳 乳	4 3		
	土佐市	鳴川	1 2	7/12	揃 揃	13 0	13 7	4 7	4 7	3 2	1 2	4 2	0 0	6 11	6 11			0 0	27 20	0 0	27 20	7/8	揃 揃	109 78	7/4	出 出	12 4	7/9	乳 乳	27 55		
	須崎市	浦ノ内	1 2	7/7	孕 出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	0 2	0 0	0 0	0 0			0 0	0 2	0 2	0 2	7/7	揃 揃	6 4	7/10	揃 揃	1 1	7/10	乳 乳	3 12		
	須崎市	神田	1 2	7/7	出 出	0 0	0 0	0 0	0 0	1 6	1 6	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0	0 6	0 6	0 6	7/7	乳 乳	2 14	7/10	揃 揃	8 1	7/10	乳 乳	1 4		
	須崎市	安和	1 2	7/7	出 出	0 0	0 1	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7/7	始 始	0 6	7/10	揃 揃	2 0	7/10	乳 乳	12 9		
	中土佐町	笹場	1 2	7/7	出 出	0 0	0 0	0 0	0 0	3 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0	0 0	3 0	0 0	7/7	揃 揃	0 3	7/10	揃 揃	1 0	7/10	乳 乳	12 18		
	中西部の1ほ場当たりの平均虫数							0.1	0.9	1.0	1.1	0.0	1.1	0.6	0.7	1.3	0.1	0.0	0.1	1.9	0.0	1.9	0.0	0.4	0.0	0.4	5.7		46.2		3.4	
西部	四万十市 （中村市）	安並	1 2	7/8	揃 揃	27 0	0 1	27 0	2 0	2 1	0 0	1 1	1 1	2 0	2 0		0 4		0 0		4 0		4 6	7/8	揃 揃	14 9	7/11	揃 揃	37 9	7/6	乳 揃	14 5
	四万十市 （中村市）	国見	1 2	7/8	揃 揃	0 0	2 1	0 0	2 1	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0		0 0		2 0		2 1		4 1	7/8	糊 揃	30 11	7/11	揃 揃	5 6	7/6	乳 乳	9 15
	黒潮町 （佐賀町）	中角	1 2	7/2	揃 揃	1 0	0 3	1 2	5 5	6 7	0 7	2 0	2 7	0 0	1 21	0 0	1 21		0 21		0 6		10 39	7/8	揃 乳	17 44	7/11	揃 揃	23 19	7/6	乳 乳	8 5
	黒潮町 （大方町）	伊田	1 2	7/2	揃 出	0 0	3 1	4 1	2 4	1 0	3 4	0 0	0 4	0 0	2 0	0 0	2 0		0 0		1 0		1 5	7/8	乳 乳	9 21	7/11	揃 揃	14 11	7/6	揃 揃	7 3
	土佐清水市	益野	1 2	7/8	揃 揃	0 0	3 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0		0 0		0 0		2 0		2 2	7/8	揃 揃	10 4	7/11	揃 揃	6 2	7/6	乳 乳	4 9
	宿毛市	小筑紫	1 2	7/8	出 揃	0 0	2 3	2 4	2 7	0 1	0 2	0 3	0 3	0 0		0 0		0 0		1 0		3 10	7/8	揃 揃	29 26	7/11	揃 揃	0 0	7/6	揃 揃	7 1	
	宿毛市	山奈	1 2	7/8	出 出	0 0	0 0	0 0	0 5	1 1	1 6	0 0	0 0	2 0	2 0	イネクロ イネカメ	1 15	0 0	1 15	4 21	0 21	4 21	7/8	揃 出	0 12	7/11	揃 揃	3 0	7/6	乳 乳	0 0	
	三原村	来栖野	1 2	7/8	始 出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 3	7/8	出 出	0 3	7/11	揃 揃	3 2	7/6	揃 揃	0 13
	西部1ほ場当たりの平均虫数							1.8	0.0	1.8	1.6	0.6	2.1	1.2	0.6	1.8	0.1	0.0	0.1	1.9	0.0	1.9		2.0	0.1	2.1	9.8		14.9		8.8	
県下1ほ場あたりの平均虫数							0.6	0.2	0.8	1.2	0.3	1.5	2.2	0.6	2.7	0.2	0.0	0.2	4.2	0.0	4.2		2.4	0.1	2.4	11.8		14.8		14.8		9.4

※1 「—」は未調査を示す。

※2 孕：穂孕期、始：出穂始、出：出穂期、揃：穂揃期、乳：乳熟期

※3 野田南、野田北の令和元年～平成28年のデータは、立田南、立田北のデータを示す。

※4 端数処理により合計は一致しないことがある。

イ 普通期稲（8月下旬）

地域	調査場所	令和3年度													令和2年度			令和元年度			平成30年度												
		※1 調査日	※2 生 育 ステージ	ミナミアカムシ			ホソバカムシ			クモバカムシ			トゲシロホカムシ			アカシカスカムシ			その他			合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計		
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		成	幼											計	
東部	奈半利町 奈半利	1 2	8/23	出 出	0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		イネカメ幼	1 0	1 0	1 0	8/19	出 出	20 19	8/22	揃 揃	10 7	8/17	揃 揃	27 2		
	田野町 田野	1 2	8/23	出 出	6 2	6 2	4 0	1 0	5 6	7 4	7 2	0 6	0 1	6 1	6 1	0 1	イネカメ成		0 1	24 10	8/19	出 出	1 0	8/22	揃 揃	23 29	8/17	揃 揃	24 27				
	安田町 東島	1 2	8/23	出 出	0 0		0 0		2 0	2 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	イネカメ幼		0 1	3 1	8/19	出 出	0 4	8/22	揃 揃	8 3	8/17	揃 揃	29 7					
	安芸市 川北	1 2	8/24	出 出	0 0		0 0		5 0	5 0	0 0	0 0	1 0	1 0	1 0	イネカメ成、幼 イネカメ成	41 1	1 1	42 1	48 1	8/19	出 出	109 59	8/22	揃 揃	105 84	8/17	揃 揃	14 7				
	安芸市 井ノ口	1 2	8/24	出 出	8 2	8 2	4 1	4 1	8 15	8 15	0 0	0 0	17 17	17 17	0 0	イネカメ成 イネカメ成	69 8	69 8	89 43	8/19	出 出	1 46	8/22	揃 揃	13 105	8/17	揃 揃	36 89					
	芸西村 和食	1 2	8/24	出 始	0 1		0 1		3 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ成		0 5	3 6	8/19	出 出	9 42	8/22	揃 揃	18 90	8/17	揃 揃	53 47					
東部の1ほ場当たりの平均虫数					1.6	0.0	1.6	0.8	0.1	0.9	3.5	0.3	3.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2		10.4	0.3	10.7	19.2			25.8			41.3			30.2
中央部	香美市 小川	1 2	8/25	揃 出	0 1		2 1	2 1	1 2	1 8	2 8	0 1	0 1	2 4	2 4	イネカメ成 イネカメ成	5 9	5 9	11 24	8/20	揃 揃	7 4	8/20	揃 揃	6 8	8/28	揃 揃				49 40		
	香美市 吉野	1 2	8/25	出 出	0 0		0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ成、イネカメ成 イネカメ成	2 4	2 4	2 4	8/20	出 出	39 24	8/20	揃 揃	129 66	8/28	揃 揃				65 32		
	南国市 久礼田	1 2	8/25	揃 揃	8 0	8 0	3 1	1 1	4 12	18 19	36 31	0 0	0 8	6 8	6 8	イネカメ成、幼、イネカメ成 イネカメ成、幼	91 90	21 24	112 114	166 154	8/20	揃 揃	93 190	— —			— —						
	大豊町 大田口	1 2	8/25	始 始	0 0		0 0		0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0		0 0	0 0	0 1	8/20	揃 揃	35 68	8/21	揃 揃	111 44	8/27	乳 乳				39 17		
	本山町 下津野	1 2	8/25	揃 揃	0 0		0 0		3 6	4 10	7 16	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ成		0 4	7 20	8/20	揃 揃	22 17	8/21	乳 乳	27 23	8/27	乳 乳				14 22		
	土佐町 田井①	1 2	8/25	揃 揃	0 0		0 1		3 8	3 54	3 62	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ成 イネカメ成、幼	4 1	4 5	7 6	8/20	揃 揃	21 30	8/21	乳 乳	101 73	8/27	乳 乳				8 13		
	土佐町 田井②	1 2	8/25	揃 揃	0 0		0 0		4 4	15 4	19 4	0 1	0 1	0 1	0 1	イネカメ幼、クロホシ成	1 0	1 0	2 6	21 6	8/20	揃 揃	43 21	8/21	乳 乳	16 25	8/27	乳 乳				30 39	
	いの町 出来地	1 2	8/24	始 出	0 0		0 0		2 9	1 9	3 9	0 0	0 0	0 0	0 0			0 6	3 15	8/25	揃 揃	12 9	8/26	出 出	10 20	8/31	始 始				39 139		
	日高村 沖名	1 2	8/24	揃 揃	7 12	7 12	1 0	1 0	5 6	13 2	18 8	3 3	3 3	0 0	0 0	イネカメ成、幼、シラホシ成ほか シラホシ成、イチモンジ成	5 2	5 2	10 2	39 25	8/19	乳 糊	26 30	8/22	乳 糊	41 169	8/27	乳 乳				7 2	
中央部の1ほ場当たりの平均虫数					1.6	0.1	1.7	0.4	0.1	0.5	4.9	7.6	12.5	0.5	0.0	0.5	1.2	0.0	1.2		12.4	3.1	15.5	31.9			38.4			54.3			34.7

地域	調査場所	令和3年度											令和2年度			令和元年度			平成30年度														
		※1 調査日	※2 生 育 ステージ	ミナミアオカメシ			ホソバカメシ			クモヘリカメシ			トゲシラホシカメシ			アカスジカスカメ			その他			合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計	※1 調査日	※2 生 育 ステージ	合計		
				成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計												成
中西部	佐川町 斗賀野	1 2	8/24	始 出	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	8/19	揃 揃	5 13	8/22	揃 揃	11 9	8/27	乳 乳	3 5		
	佐川町 室原	1 2	8/24	揃 揃	0 0	0 2	0 2	0 2	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ成 イネカメ成	2 1	2 1	3 5	8/19	揃 揃	23 15	8/22	揃 揃	16 4	8/27	乳 乳	1 4						
	佐川町 荷稲	1 2	8/24	揃 揃	0 0	0 0	0 0	2 2	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	アサシ成	1 1	0 1	2 3	8/19	出 出	1 4	8/22	揃 揃	5 2	8/27	乳 乳	7 4						
	佐川町 庄田	1 2	8/24	始 始	0 0	0 0	0 0	1 2	1 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ成	2 2	0 2	1 4	8/25	揃 揃	11 27	8/22	出 揃	12 27	8/27	出 出	15 1						
	越知町 柴尾	1 2	8/24	出 出	0 0	1 0	1 0	8 9	8 12	16 21	0 0	0 0	0 0	イネカメ成、幼、シラホシ成 シラホシ成	2 1	3 1	3 22	20 22	8/19	揃 揃	61 46	8/22	揃 乳	50 66	8/27	乳 乳	22 7						
	須崎市 吾桑	1 2	8/16	孕 出	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8/19	乳 乳	17 4	8/21	出 出	1 20	8/17	出 出	28 3						
	須崎市 上分	1 2	8/16	揃 揃	0 0	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0	1 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 0	8/19	乳 乳	5 2	8/13	乳 乳	4 6	8/6	出 出	10 3						
	津野町 姫野々	1 2	8/16	出 出	1 0	1 0	1 0	10 4	10 4	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	12 5	8/19	糊 糊	2 4	8/13	乳 乳	9 27	8/6	出 出	2 0						
	中土佐町 久礼	1 2	8/16	孕 孕	2 0	2 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 1	8/19	揃 揃	0 0	8/21	出 出	6 0	8/17	出 出	2 5						
	中土佐町 大野見	1 2	8/16	出 孕	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8/19	乳 乳	1 0	8/21	出 出	1 4	8/17	出 出	7 2						
	四万十町 影野	1 2	— —																8/19	揃 揃	2 12	8/21	揃 揃	2 1	8/22	揃 揃	0 0						
	四万十町 東又	1 2	8/27	出 出	3 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ成	1 1	0 1	3 1	8/19	揃 揃	21 6	8/21	揃 揃	7 21	8/22	揃 揃	1 0						
	四万十町 米奥	1 2	8/27	揃 揃	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8/19	揃 揃	2 3	8/21	揃 揃	4 3	8/22	揃 揃	1 1						
	四万十町 大井野	1 2	8/27	揃 揃	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	8/19	揃 揃	1 1	8/21	出 出	0 7	8/22	揃 揃	0 0						
	四万十町 西川角	1 2	8/27	揃 揃	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	0 0	0 0	3 0	3 0	0 0	0 0	0 0	0 1	3 1	8/19	乳 揃	10 1	8/21	揃 揃	2 6	8/22	揃 揃	0 0						
中西部の1ほ場当たりの平均虫数					0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	1.6	0.8	2.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2		0.4	0.0	0.4	3.4			10.0			11.1			4.5
西部	四万十市 若藤	1 2	8/24	出 出	1 0	1 0		1 12	1 12	0 0	1 0	0 0	0 0	2 2	イネカメ成	19 3	19 5	33 8	8/20	出 出	7 26	8/20	揃 出	2 56	8/21	揃 始	2 2	8/21	揃 始	0 0			
	四万十市 藤岡	1 2	8/24	出 出	6 6	6 6		2 2	2 2	0 0	0 0	0 0	1 1	イネカメ成 イネカメ成、幼	14 3	14 5	16 8	8/20	出 出	26 6	8/20	出 始	56 2	8/21	始 始	2 2	8/21	始 始	1 0				
	宿毛市 宿毛	1 2	8/24	出 出	1 0	1 0	2 2	3 1	4 1	0 0	0 0	0 0	0 0	イネカメ成、イネカメ成	2 0	2 0	5 5	8/20	揃 揃	6 0	8/20	始 始	12 12	8/21	揃 揃	1 10							
	宿毛市 平田	1 2	8/24	出 揃			2 4	2 4	3 5	2 5	5 5	0 0	3 9	イネカメ成	3 0	3 0	13 18	8/20	出 出	29 72	8/20	始 始	55 121	8/21	出 始	49 0							
西部1ほ場当たりの平均虫数					1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.9	1.1	4.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9		5.1	0.6	5.7	13.6			18.5			36.8			7.6
県下1ほ場当たりの平均虫数					0.9	0.0	0.9	0.4	0.0	0.4	3.0	2.6	5.6	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	1.0		6.0	1.0	7.0	15.0			21.0			29.7			16.6

※1 「—」は未調査を示す。

※2 始：出穂始、出：出穂期、揃：穂揃期、乳：乳熟期、糊：糊熟期、黄：黄熟期

※3 端数処理により合計は一致しないことがある。

令和3年度 早期稲予察ほ（防除適期決定ほ）

①水稲予察田（早期稲 普通期稲）調査様式

2021年 品種:コシヒカリ

調査場所:南国市下島

調査 月日	葉いもち /50株		穂いもち /50株		紋枯病 /50株		稲こうじ病 /50株	萎縮病 /50株		縞葉枯病 /50株		ツマグロヨコバイ /50株		ヒメトビウンカ /50株		セジロウンカ /50株		トビイロウンカ /50株				ニカメイガ /50株		コフノメイガ /50株	フタオビコヤガ /50株	イネミスソウムシ /50株		イネソウムシ /50株		他の病害虫の発生状況/コメント等		
	発病 株率 (%)	発 病 度	発病 株率 (%)	発 病 穂 率	発病 株率 (%)	発 病 度	発病株率 (%)	発 病 株率 (%)	発 病 程度	発病 株率 (%)	発 病 程度	成 虫	幼 虫	成 虫	幼 虫	成 虫	幼 虫	長 翅	短 翅	老 齢	若 齢	被害 茎率 (%)	被害 株率 (%)	上位2葉 被害葉率 (%)	寄生株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)			
4/19	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	4/10田植え スクミリンゴガイ:成貝6/50株		
4/26	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	スクミリンゴガイ:成貝2/50株	
5/3	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0	スクミリンゴガイ:成貝6/50株		
5/10	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1	2	スクミリンゴガイ:成貝5/50株	
5/17	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	6	スクミリンゴガイ:成貝9/50株	
5/24	0	0			0	0			0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	46	0	8	スクミリンゴガイ:成貝13/50株	
5/31	6	2			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	スクミリンゴガイ:成貝17/50株 葉いもち発生	
6/7	12	3			0	0			0	0	0	0	2	2	0	7	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	スクミリンゴガイ:成貝14・卵2/50株	
6/14	54	14			0	0			0	0	0	0	0	9	0	5	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	スクミリンゴガイ:成貝22・卵3/50株 間断かん水	
6/21	82	32			4	1			0	0	0	0	0	44	1	34	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝20・卵6/50株
6/28	100	56			4	1			0	0	0	0	6	59	0	12	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝15・卵3/50株
7/5	100	49			14	5			0	0	0	0	7	31	4	59	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	スクミリンゴガイ:成貝6・卵4/50株	
7/12	100	38	0	0	54	14	0		0	0	0	0	9	28	2	86	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝17・卵3/50株 出穂期
7/18	100	37	0	0	76	36	0		0	0	0	0	5	17	0	151	7	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝11・卵5/50株 イネヨトウ:幼虫1
7/26	70	18	50	12	72	36	0		0	0	0	0	0	3	0	23	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝13・卵1/50株、 イネヨトウ:被害株率0.01%、ごま葉枯 病:発病株率10%、発病度2.5
8/2	32	8	100	41	66	25	0		0	0	0	0	15	169	0	17	0	47	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝6/50株、イネヨ トウ:被害株率0.01%、イネカメムシ:成 虫6、フタオビコヤガ:幼虫2
8/8	26	7	100	61	98	50	0		0	0	0	0	19	163	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	イネヨトウ:被害株率0.02% イネカメムシ:成虫9

①水稲予察田 (早期稲) 普通期稲) 調査様式

2021年 品種:コシヒカリ

調査場所:四万十市竹島

調査 月日	葉いもち /50株		穂いもち /50株		紋枯病 /50株		稲こうじ病 /50株		萎縮病 /50株		縞葉枯病 /50株		ツマグロヨコバイ /50株		ヒメビウナ /50株		セジロウナ /50株		トビイロウナ /50株				ニカメイガ /50株		コブノメイガ /50株	フタオビコヤガ /50株	イネミスゾウムシ /50株		イネゾウムシ /50株		他の病害虫の発生状況/コメント等	
	発病 株率 (%)	発 病 度	発病 株率 (%)	発 病 穂 率	発病 株率 (%)	発 病 度	発病株率 (%)	発 病 程 度	発病 株率 (%)	発 病 程 度	発病 株率 (%)	発 病 程 度	成 虫	幼 虫	成 虫	幼 虫	成 虫	幼 虫	長 翅	短 翅	老 齢	若 齢	被害 茎率 (%)	被害 株率 (%)	上位2葉 被害葉率 (%)	寄生株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)		
4/19	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4/9田植え 寒風等によると思われる葉の上部の枯れが著しく全般的に葉色が抜けている	
4/26	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5/3	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0		
5/10	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0		
5/17	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	0	0		
5/24	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0		
5/31	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0		
6/7	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0		
6/14	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		
6/21	76	19			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6/28	100	25			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7/5	100	25			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7/12	100	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7/19	100	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7/26	100	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8/2	100	25	80	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8/9	100	25	98	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	調査終了

令和3年度 普通期稲予察ほ（防除適期決定ほ）

①水稲予察田（早期稲＜普通期稲＞）調査様式

2021年 品種：

調査場所：香美市土佐山田町逆川

調査 月日	葉いもち /50株		穂いもち /50株		紋枯病 /50株		稲こうじ病 /50株		萎縮病 /50株		縞葉枯病 /50株		ツマグ'ロコハイ' /50株		ヒトビ'ウカ /50株		セジ'ロウカ /50株		トビイロウカ /50株				ニカメイ' /50株		コブ'ノメイ' /50株		フタオビコヤガ /50株		イネス'ゾウムシ /50株		イネゾウムシ /50株		他の病害虫の発生状況/コメント等
	発病 株率 (%)	発病 度	発病 株率 (%)	発病 穂率	発病 株率 (%)	発病 度	発病株率 (%)	発病 程度	発病 株率 (%)	発病 程度	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	長翅	短翅	老 齢	若 齢	被害 茎率 (%)	被害 株率 (%)	上位2葉 被害葉率 (%)	寄生株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)					
5/31	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5月18～22日の間田植え		
6/7	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0			
6/14	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0				
6/21	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	イネクロカメムシ:4 スクミリンゴガイ:成員1/50株		
6/28	22	6			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	イネクロカメムシ:5 スクミリンゴガイ:成員1/50株		
7/5	50	17			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7/12	100	40			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イネクロカメムシ:2		
7/19	100	37			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7/18 いもち病防除		
7/26	100	28			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8/2	100	25			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率95%、発病度15		
8/8	100	25			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率100%、発病度50	
8/16	100	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率100%、発病度50、イネカメムシ:2 出穂期		
8/23	100	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率100%、発病度50、イネカメムシ:3	
8/30	100	32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率100%、発病度50	
9/6	100	32	64	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率100%、発病度50	
9/13	100	50	90	11	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率100%、発病度50	
9/20	100	50	100	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率100%、発病度50	

①水稲予察田（ 早期稲 普通期稲 ）調査様式

2021年 品種:ヒノヒカリ

調査場所:安芸市川北

調査 月日	葉いもち /50株		穂いもち /50株		紋枯病 /50株		稲こうじ病 /50株		萎縮病 /50株		縞葉枯病 /50株		ツマグロコハイ /50株		ヒメビウナ /50株		セジロウナ /50株		トビロウナ /50株				ニカメイ /50株		コブノメイ /50株	フタオビコヤ /50株	イネスゾウムシ /50株		イネゾウムシ /50株		他の病害虫の発生状況/コメント等
	発病 株率 (%)	発 病 度	発病 株率 (%)	発 病 穂 率	発病 株率 (%)	発 病 度	発病株率 (%)	発 病 程度	発病 株率 (%)	発 病 程度	発病 株率 (%)	発 病 程度	成 虫	幼 虫	成 虫	幼 虫	成 虫	幼 虫	長 翅	短 翅	老 齢	若 齢	被害 茎率 (%)	被害 株率 (%)	上位2葉 被害率 (%)	寄生株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)	
5/31	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5/28田植え スクミリンゴガイ:成貝5/50株
6/7	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	スクミリンゴガイ:成貝22/50株
6/14	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	スクミリンゴガイ:成貝32・卵3/50株
6/21	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝43・卵3/50株 イネカラバエ:被害株率2%
6/28	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝21・卵6/50株
7/5	4	1			0	0			0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝31・卵8/50株
7/12	10	3			0	0			0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝25・卵4/50株 ごま葉枯病:被害株率20%、発病度5.5
7/18	38	10			0	0			0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝30・卵6/50株 ごま葉枯病:被害株率30%、発病度7.5、葉いもちは進行型が増加
7/26	50	13			0	0			0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝24・卵1/50株 ごま葉枯病:被害株率28%、発病度7
8/2	42	11			0	0			0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝17・卵2/50株 ごま葉枯病:被害株率36%、発病度:9
8/8	26	7			0	0			0	0	0	0	9	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝8・卵3/50株 ごま葉枯病:被害株率50%、発病度12.5
8/16	32	8			0	0			0	0	0	0	59	19	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝13・卵4/50株 ごま葉枯病:被害株率72%、発病度18
8/23	34	9	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	28	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝27・卵4/50株、 ごま葉枯病:発病株率64%、発病度16、 イネカメムシ:1、ツヤアオカメムシ:2
8/30	6	3	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	アカスジカスミカメムシ:成虫1 ミナミアオカメムシ:成虫1・幼虫48 ごま葉枯病:株率96%、発病度25
9/6	4	1	4	0	48	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ミナミアオカメムシ:成虫1 スクミリンゴガイ:成貝5/50株
9/13	4	1	34	2	56	15	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ:成貝7/50株 ごま葉枯病:発病株率100%、発病度26
9/20	2	1	94	66	54	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病:発病株率100%、発病度26

①水稲予察田(早期稲 普通期稲) 調査様式

2021年 品種:十和錦

調査場所:中土佐町久礼

調査 月日	葉いもち /50株		穂いもち /50株		紋枯病 /50株		稲こうじ病 /50株		萎縮病 /50株		縞葉枯病 /50株		ツマク'ロコハイ /50株		ヒメビ'ウンカ /50株		セジ'ロウンカ /50株		トビ'イロウンカ /50株				ニカ'マイカ /50株		コブ'ノマイカ /50株	フタ'オビ'コヤカ /50株	イネ'ミス'ソ'ウムシ /50株		イネ'ソ'ウムシ /50株		他の病害虫の発生状況/コメント等
	発病 株率 (%)	発 病 度	発病 株率 (%)	発 病 穂 率	発病 株率 (%)	発 病 度	発病株率 (%)	発 病 度	発病 株率 (%)	発 病 程 度	発病 株率 (%)	発 病 程 度	成 虫	幼 虫	成 虫	幼 虫	成 虫	幼 虫	長 翅	短 翅	老 齢	若 齢	被害 茎率 (%)	被害 株率 (%)	上位2葉 被害葉率 (%)	寄生株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)	虫数 /50株	被害 株率 (%)	
5/31																															田植え準備中
6/7	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	田植え(6/5)直後
6/14	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ: 成貝5/50株
6/21	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	スクミリンゴガイ: 成貝5/50株
6/28	6	2			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	スクミリンゴガイ: 成貝6/50株
7/5	68	17			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	スクミリンゴガイ: 成貝10/50株
7/12	100	40			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	5	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ: 成貝7/50株
7/19	100	59			0	0			0	0	0	0	0	1	0	4	6	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	スクミリンゴガイ: 成貝17/50株
7/26	100	48			0	0			0	0	0	0	0	1	0	5	1	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	イチモンジセセリ: 被害株率2%
8/2	100	38			0	0			0	0	0	0	0	9	5	83	23	716	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	スクミリンゴガイ: 成貝12/50株
8/8	100	27			0	0			0	0	0	0	2	4	10	102	52	913	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	スクミリンゴガイ: 成貝24/50株
8/15	100	25			0	0			0	0	0	0	1	2	24	179	210	1034	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	スクミリンゴガイ: 成貝26/50株 イチモンジセセリ: 被害株率6%
8/22	100	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	17	159	192	888	0	0	1	16	0	0	1	0	0	0	0	0	出穂期 スクミリンゴガイ: 成貝24/50株
8/30	42	11	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	1	11	0	61	10	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	種揃期、防除 スクミリンゴガイ: 成貝21/50株
9/6	32	8	4	0	12	3	0	0	0	0	0	0	5	18	5	35	19	73	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	ごま葉枯病: 発病株率42.0%、発病度 10.5 スクミリンゴガイ: 成貝14/50株
9/13	22	6	36	2	8	2	0	0	0	0	0	0	7	19	4	10	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病: 発病株率48.0%、発病度 12.0 スクミリンゴガイ: 成貝6/50株
9/20	8	2	62	4	2	1	0	0	0	0	0	0	3	24	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ごま葉枯病: 発病株率60.0%、発病度 15.0 スクミリンゴガイ: 成貝6/50株

かんきつ

1 栽培面積

単位：ha

地区名	作物名	令和3年度
東 部	温州みかん	8 (0)
	中晩柑類	437 (1)
	計	445 (1)
中 央 部	温州みかん	226 (15)
	中晩柑類	372 (2)
	計	598 (17)
中 西 部	温州みかん	7 (0)
	中晩柑類	365 (9)
	計	372 (9)
西 部	温州みかん	40 (0)
	中晩柑類	331 (0)
	計	371 (0)
合 計	温州みかん	281 (15)
	中晩柑類	1505 (12)
	計	1786 (27)

令和2年度農業振興センター調べ推定値

() はハウス栽培面積内数

2 生育概況

2月～3月の気温が平年に比べてかなり高かったため、発芽期は、温州みかん、中晩柑とも平年よりも6～11日早かった。4月の気温は平年並となったものの、開花盛期は、温州みかん、中晩柑とも平年よりも6～8日早かった。開花量は温州ミカンでやや多く、中晩柑で平年並～やや少なかった。1月上旬の低温による寒害のため、各地で枝枯や樹全体の枯死が見られ、生理落果が多く、着果量は全体的に少なかった。また、ポンカンでは異常落葉が須崎市、土佐市および東洋町で発生し、これも冬期の寒害が影響していると考えられている。梅雨明け後の果実肥大は、良好であったが、8月中旬～下旬に続いた降雨の影響により、温州ミカンで裂果が発生した。また、その後の高温の影響により、文旦では日焼け果が発生した。収穫時期は平年並であったが、着果数が少なく、低収量で、早生温州ミカンでは8月の長雨の影響により、糖度、酸度とも低い傾向であった。

生育状況調査

(調査場所：高知市朝倉、農業技術センター果樹試験場調べ)

樹 種		温州みかん	土佐文旦	ポンカン	ユズ
作 型		露 地	露 地	露 地	露 地
品 種 名		興津早生	土佐文旦	高しょう系	—
発 芽 期		3月22日 (前年比：+2日) (平年比：-9日)	3月22日 (前年比：+1日) (平年比：-6日)	3月26日 (前年比：-4日) (平年比：-11日)	4月1日 (前年比：-13日) (平年比：-7日)
開 花 期 (月 日)	始	4月21日 (前年比：-5日) (平年比：-9日)	4月25日 (前年比：-5日) (平年比：-8日)	4月26日 (前年比：-7日) (平年比：-9日)	4月22日 (前年比：-12日) (平年比：-11日)
	盛	4月28日 (前年比：-5日) (平年比：-8日)	5月5日 (前年比：-8日) (平年比：-6日)	5月4日 (前年比：-6日) (平年比：-8日)	5月3日 (前年比：-7日) (平年比：-6日)
	終	5月3日 (前年比：-6日) (平年比：-8日)	5月9日 (前年比：-6日) (平年比：-9日)	5月13日 (前年比：-2日) (平年比：-5日)	5月7日 (前年比：-10日) (平年比：-9日)
落 果 期 (月 日)	始	5月8日 (前年比：-4日) (平年比：+1日)	5月7日 (前年比：-1日) (平年比：-2日)	5月6日 (前年比：-11日) (平年比：-6日)	4月30日 (前年比：-17日) (平年比：-13日)
	終	6月16日 (前年比：-19日) (平年比：-18日)	6月21日 (前年比：+8日) (平年比：-11日)	7月27日 (前年比：±0日) (平年比：+7日)	7月7日 (前年比：±0日) (平年比：+2日)
着 色 期 (半 旬)	始	10月第2半旬 (前年：10月第2半旬) (平年：10月第2半旬)	10月第5半旬 (前年：10月第4半旬) (平年：10月第4半旬)	11月第3半旬 (前年：11月第1半旬) (平年：11月第2半旬)	10月第2半旬 (前年：10月第2半旬) (平年：10月第2半旬)
	終	11月第1半旬 (前年：11月第1半旬) (平年：11月第2半旬)	12月第2半旬 (前年：12月第1半旬) (平年：12月第1半旬)	12月第2半旬 (前年：12月第3半旬) (平年：—)	11月第1半旬 (前年：11月第1半旬) (平年：11月第1半旬)

平年値は、1987年～2020年までの34年間の平均

3 病虫害発生概況


(1) 病 害

① そうか病

ア 発生概況	温州みかん	面積：多	程度：並
	中晩柑類	面積：並	程度：並

温州みかんでは、新葉（5月）での発生はほとんど認められなかったが、5月15日の梅雨入り以降の降雨によって、果実での発病が増加した。7月中旬や8月中下旬の連続した曇雨天により発病は更に増加し、9月の発生面積は平年の4倍以上になった。しかし、その後、摘果などにより平年並まで減少した。一方、中晩柑類では、ポンカンやユズで発生が見られ、例年よりも長い梅雨期間に発病が増加したが、7月の発生面積は平年並に留まった。その後、摘果や薬剤防除により、発生面積は平年よりも少なく推移した。

イ 発生経過




② 黒点病

ア 発生概況	温州みかん	面積：多	程度：やや低
	中晩柑類	面積：並	程度：並

温州みかんでは、新葉（5月）での発病が平年よりも多く、例年よりも早い5月15日の梅雨入り以降、果実での発病も増加し、7月以降の発生面積率は100%となった。8月中下旬には曇雨天が続く、発病程度も高くなったが、平年よりもやや低い程度に留まった。一方、中晩柑類でも同様に発生は漸増傾向で推移し、10月の発生面積率は約85%となった。また、梅雨期以降の薬剤防除が適期に行えなかったことから、発病程度の高いほ場が散見されたが、全般的には発病程度は平年並であった。

イ 発生経過




③ かいよう病

ア 発生概況	温州みかん	面積：少	程度：低
	中晩柑類	面積：やや少	程度：やや低

温州みかんでは、発生が見られなかった。中晩柑類では、春葉や幼果の時期から発生がみられたが、その後は摘果等により発生面積は減少した。9月 17～18 日に襲来した台風の影響により、10 月の発生面積がやや増加したが、平年よりもやや少ない程度に留まり、発病程度もやや低かった。

イ 発生経過




(2) 虫 害

① アブラムシ類

ア 発生概況	温州みかん	面積：並	程度：低
	中晩柑類	面積：多	程度：高

温州みかんでは、5月と7月～10月に発生が見られた。本年は秋枝の発生が多かったため、8～9月の発生が平年よりも多かったが、全般的には発生面積は平年並、発生程度は平年よりも低かった。中晩柑類では、5～10月に発生が見られた。今年は秋枝の発生が多かったため、9月の発生面積が平年よりもかなり多く、発生程度の高いほ場も見られた。

イ 発生経過




② ミカンハダニ

ア 発生概況	温州みかん	面積：多	程度：やや低
	中晩柑類	面積：多	程度：並

冬期の寒害の影響により、マシン油による防除を控えたほ場が多かったため、全体的に5月から密度が高い状態であった。温州みかんでは、6月に密度が一旦下がったことから、発生面積はほぼ横ばいであったが、7月には増加し、発生面積率は100%となった。その後、発生は一旦減少したが、10月には再び増加し、全般的には、平年に比べ発生程度はやや低いものの、発生面積は多となった。中晩柑類も温州みかんと同様な発生経過で、7月には発生面積率が80%となった。全般的には、発生面積は平年よりも多く、発生程度は平年並であった。

イ 発生経過




③ カイガラムシ類

ア 発生概況	温州みかん	面積：少	程度：低
	中晩柑類	面積：多	程度：並

温州みかんでは、発生が見られなかった。中晩柑類では、6月以降一部のほ場でイセリヤカイガラムシなどの発生が継続して見られた。発生面積は平年よりも多かったが、発生程度は平年並であった。

イ 発生経過




④ ミカンハモグリガ

ア 発生概況	温州みかん	面積：多	程度：並
	中晩柑類	面積：多	程度：並

温州みかんでは、5月の発生面積率はほぼ平年並であったが、今年は夏枝や秋枝の発生が多かったため、8～9月の発生面積は平年よりも多くなった。発生程度は平年並であった。中晩柑類では、温州みかんと同様に7～9月に夏枝や秋枝の多かったほ場を中心に発生程度の高いほ場が散見され、全般的には発生面積は平年よりも多かったが、発生程度は平年並であった。

イ 発生経過




⑤ カメムシ類

ア 発生概況	温州みかん	面積：少	程度：低
	中晩柑類	面積：やや少	程度：並

フェロモントラップ調査では、県西部を中心に9月第1～第4半旬の誘殺数が多かった（技術情報第9号参照）が、温州みかんの主要産地のある中央部での誘殺数は比較的少なく、ほ場での発生も平年よりも少なかった。中晩柑類では、県東部と西部で9～10月に発生が見られたが、全体的には平年よりもやや少ない発生面積に留まり、発生程度も平年並であった。

イ 発生経過



(3) 最高発生面積・率

① 温州みかん（露地）中央部 栽培面積

211 ha

病害虫名	年別	R 3		R 2	R 1	H30
		発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
そうか病	本年	184.6	87.5	37.5	50.0	50.0
	平年	55.6	26.4	24.6	24.6	27.3
黒点病	本年	211.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	平年	201.8	95.6	97.7	93.3	92.2
かいよう病	本年	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0
	平年	6.5	3.1	1.9	4.7	8.2
黄斑病	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
褐色腐敗病	本年	0.0	0.0	0.0	0.5	25.0
	平年	5.4	2.5	2.6	2.5	0.0
疫病	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
カンザリハダニ	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ミカンハダニ	本年	211.0	100.0	87.5	87.5	87.5
	平年	143.0	67.8	66.9	62.6	63.6
カメムシ類	本年	3.3	1.6	0.0	0.0	0.0
	平年	6.5	3.1	3.1	3.1	4.9
ハマキムシ類	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ミカンサビダニ	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	1.9	0.9	1.0	0.9	0.9
ヤノハガラムシ	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	4.2	2.0	2.1	2.0	2.0
ルビーロウムシ	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	2.1	1.0	1.1	1.0	1.0
その他カガラムシ類	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.3	0.1	0.5	0.9	0.9
コナジラミ類	本年	3.3	1.6	1.3	0.0	12.5
	平年	6.1	2.9	2.9	2.8	1.5
ミカンハモグリガ	本年	158.3	75.0	50.0	75.0	62.5
	平年	98.3	46.6	43.2	45.5	43.7
訪花害虫	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ヤガ類	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	4.8	2.3	2.5	2.4	2.4
アブラムシ類	本年	105.5	50.0	50.0	75.0	87.5
	平年	106.0	50.3	50.2	53.8	53.9

② 中晩柑類（露地）県内全域 栽培面積 1,493 ha

病虫害名	年別	R 3		R 2	R 1	H30
		発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
そうか病	本年	189.0	12.7	25.8	9.4	7.9
	平年	195.5	13.1	13.7	13.1	13.2
黒点病	本年	1285.1	86.1	94.5	84.5	83.3
	平年	1294.6	86.7	86.7	83.6	82.3
かいよう病	本年	133.9	9.0	32.5	13.5	14.9
	平年	193.6	13.0	9.7	9.0	8.3
黄斑病	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
褐色腐敗病	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	平年	16.4	1.1	1.1	1.1	1.1
疫病	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	平年	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
カンザワハダニ	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ミカンハダニ	本年	1206.3	80.8	70.9	53.2	64.2
	平年	839.3	56.2	55.5	56.3	56.0
カメムシ類	本年	29.6	2.0	0.7	0.2	0.7
	平年	37.7	2.5	2.5	3.1	3.1
ハマキムシ類	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ミカンサビダニ	本年	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
	平年	6.2	0.4	0.1	0.3	0.3
ヤノハカガラムシ	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2
ルビーロウムシ	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他カガラムシ類	本年	52.9	3.5	4.2	1.6	0.9
	平年	17.6	1.2	1.6	2.0	2.0
コナジラミ類	本年	7.6	0.5	1.8	0.0	0.0
	平年	2.6	0.2	0.2	0.4	0.4
ミカンモグリガ	本年	811.7	54.4	26.0	46.8	26.4
	平年	292.4	19.6	19.5	17.6	16.6
訪花害虫	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	7.2	0.5	0.5	0.5	0.0
ヤガ類	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アブラムシ類	本年	447.8	30.0	12.0	12.5	12.8
	平年	110.4	7.4	7.6	9.7	11.7

かんきつ巡回調査結果

ア 露地温州みかん（中央部）

中央部		作期:温州 2021年																栽培面積 211 ha																					
病害虫名	年別	5月				6月				7月				8月				9月				10月				最高発生面積													
		基	多	中	少	計	基	多	中	少	計	基	多	中	少	計	基	多	中	少	計	基	多	中	少	計	基	多	中	少	計								
そうか病	本年									52.8	52.8				52.8	52.8					79.1	79.1				184.6	184.6				26.4	26.4			184.6	184.6			
	平年				49.6	49.6				42.5	42.5			2.8	52.7	55.5					0.9	54.7	55.6				44.2	44.2				21.7	21.7			0.9	54.7	55.6	
黒点病	本年				105.5	105.5				158.3	158.3				211.0	211.0					211.0	211.0				79.1	131.9	211.0			52.8	158.3	211.0			79.1	131.9	211.0	
	平年			2.1	69.0	71.1				40.8	40.8			4.2	8.6	114.4	127.2	2.1	11.1	26.9	133.5	173.6	6.9	4.2	51.2	117.7	179.9	17.1	12.6	64.0	108.1	201.8	17.1	12.6	64.0	108.1	201.8		
かいよう病	本年																																						
	平年				2.2	2.2					2.1	2.1				1.8	1.8					1.9	1.9				4.3	4.3				6.5	6.5				6.5	6.5	
黄斑病	本年																																						
	平年																																						
褐色腐敗病	本年																																						
	平年																																						
疫病	本年																																						
	平年																																						
カンザワハダニ	本年																																						
	平年																																						
ミカンハダニ	本年	26.4			26.4	79.1	131.9				131.9	131.9				26.4	184.6	211.0				158.3	158.3				26.4	105.5	131.9			26.4	158.3	184.7			26.4	184.6	211.0
	平年					84.8	84.8	2.6		6.2	96.9	105.7	6.5	7.3	22.3	97.9	133.9	1.3	1.3	22.7	117.7	143.0			2.6	4.4	93.7	100.7				94.0	94.0	1.3	1.3	22.7	117.7	143.0	
カメムシ類	本年																					3.3	3.3								3.3	3.3				3.3	3.3		
	平年					1.3	1.3					0.9	0.9									0.2	0.2					3.2	3.2		0.4	0.4	5.6	6.5		0.4	0.4	5.6	6.5
ハマキムシ類	本年																																						
	平年																					0.0	0.0												0.0	0.0			
ミカンサビダニ	本年																																						
	平年																					1.9	1.9												1.9	1.9			
ヤノネカイガラムシ	本年																																						
	平年															2.1	2.1													2.1	2.1	4.2			2.1	2.1	4.2		
ルビーロウムシ	本年																																						
	平年																																						
その他カイガラムシ	本年																																						
	平年											0.3	0.3																						0.3	0.3			
コナジラミ類	本年																					3.3	3.3												3.3	3.3			
	平年					6.1	6.1				0.5	0.5			0.8	0.8					0.5	0.5				0.5	0.5		0.0	0.5	0.5			6.1	6.1				
ミカンハダニカ	本年				52.8	52.8	105.6				79.1	79.1				52.8	52.8				131.9	131.9				158.3	158.3								158.3	158.3			
	平年				6.5	91.8	98.3				58.0	58.0			7.0	36.9	44.0			9.7	37.8	47.5		2.6	7.9	43.6	54.1		2.6	6.2	8.8			6.5	91.8	98.3			
訪花害虫	本年																																						
	平年																																						
ヤガ類	本年																																						
	平年																					0.2	0.2				4.8	4.8				1.9	1.9			4.8	4.8		
アブラムシ類	本年				26.4	52.8	79.2								26.4	26.4					52.8	52.8				105.5	105.5			26.4		26.4			105.5	105.5			
	平年	10.6	16.9	26.2	52.4	106.0				2.6	15.3	17.9			2.6	16.9	19.5	0.1	3.1	9.4	10.2	22.7		11.3	14.8	35.9	61.9		2.6		11.3	13.9	10.6	16.9	26.2	52.4	106.0		

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

イ 中晩柑類（露地）県内合計

県合計		中晩柑類																栽培面積 1,493 ha																							
病害虫名	年別	2021年					5月					6月					7月					8月					9月					10月					最高発生面積				
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計					
そうか病	本年				39.2	39.2					91.0	91.0				189.0	189.0				83.6	83.6				30.7	30.7				30.7	30.7				189.0	189.0				
	平年				4.5	61.5	65.9				123.6	123.6				195.5	195.5				146.1	146.1				4.5	111.2	115.7				66.4	66.4				195.5	195.5			
黒点病	本年				11.0	700.1	711.1				574.5	574.5		105.7	52.9	795.9	954.5	52.9	44.5	300.4	864.2	1,262.0	52.9	44.5	358.2	829.5	1,285.1	44.5	52.9	383.5	781.9	1,262.7	52.9	44.5	358.2	829.5	1,285.1				
	平年	15.0	24.8	82.4	517.5	639.7				6.5	435.4	441.9	14.2	33.3	129.0	733.1	909.6	24.9	42.6	176.0	857.6	1,101.1	24.1	39.9	219.9	869.3	1,153.3	18.6	76.7	321.7	877.8	1,294.6	18.6	76.7	321.7	877.8	1,294.6				
かいよう病	本年				133.9	133.9				99.8	99.8				86.5	86.5				20.7	20.7				74.3	74.3				124.7	124.7				133.9	133.9					
	平年				2.2	30.5	32.7				0.0	109.2	109.2				103.0	103.0			4.5	135.1	139.5			4.5	189.2	193.6			4.5	152.3	156.7			4.5	189.2	193.6			
黄斑病	本年																																								
	平年																																								
褐色腐敗病	本年																																								
	平年																									0.0	0.0				16.4	16.4				16.4	16.4				
疫病	本年																																								
	平年																				0.1	0.1													0.1	0.1					
カンザワハダニ	本年																																								
	平年																																								
ミカンハダニ	本年	52.9	44.5	160.0	266.7	524.1				170.2	658.9	829.1	187.4	50.5	305.0	663.4	1,206.3		44.5	44.5	498.0	587.0		44.5	47.1	633.1	724.7	8.8	28.4	219.6	823.2	1,080.0	187.4	50.5	305.0	663.4	1,206.3				
	平年	4.1	13.6	40.4	342.7	400.9	39.5	21.3	106.5	452.3	619.6	115.5	81.6	152.2	490.0	839.3	33.6	30.7	128.5	513.7	706.5	14.0	17.3	95.9	569.5	696.6	16.2	24.7	97.5	620.9	759.3	115.5	81.6	152.2	490.0	839.3					
カメムシ類	本年																									21.6	21.6				29.6	29.6				29.6	29.6				
	平年					31.8	31.8				3.5	3.5				3.5	3.5				1.0	1.0				6.2	6.2			0.5	37.2	37.7			0.5	37.2	37.7				
ハマキムシ類	本年																																								
	平年															0.0	0.0																	0.0	0.0						
ミカンサビダニ	本年																																								
	平年																																								
ヤノネカイラムシ	本年																																								
	平年															0.5	0.5																		0.8	0.8					
ルビーロウムシ	本年																																								
	平年																																								
その他カイラムシ	本年									52.9	52.9				52.9	52.9				52.9	52.9				52.9	52.9				52.9	52.9				52.9	52.9					
	平年				2.6	2.6			0.1	9.2	9.3				7.9	7.9			1.0	7.8	8.7			0.5	10.0	10.6			0.5	17.0	17.6			0.5	17.0	17.6					
コナジラミ類	本年																				7.6	7.6													7.6	7.6					
	平年										2.6	2.6																							2.6	2.6					
ミカンハダニガ	本年				136.3	136.3		2.0	4.5	546.9	553.4		125.0	145.9	540.8	811.7		11.2	134.5	532.4	678.1	43.2		309.7	339.8	692.7	0.1	1.8	127.2	52.3	181.4		125.0	145.9	540.8	811.7					
	平年			4.5	62.0	66.4		4.4	17.7	159.1	181.3	2.5	8.4	50.8	230.7	292.4		2.8	39.0	225.3	267.0	0.0	4.5	28.1	148.6	181.2	0.1	1.4	16.2	129.6	147.3	2.5	8.4	50.8	230.7	292.4					
訪花害虫	本年																																								
	平年				7.2	7.2																													7.2	7.2					
ヤガ類	本年																																								
	平年																																								
アブラムシ類	本年				196.2	196.2			47.5	167.0	214.5		44.5	167.5	98.4	310.4			44.5	46.2	90.7	66.1		52.9	328.8	447.8				45.5	45.5	66.1		52.9	328.8	447.8					
	平年		2.7	15.2	92.5	110.4			2.9	53.9	56.7		1.8	6.3	53.2	61.3	0.0	3.9	16.2	64.4	84.5	0.0	0.0	12.9	53.8	66.6		4.5	5.4	29.3	39.1		2.7	15.2	92.5	110.4					

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

[illegible]

- 49 -

エ 中晩柑類（中央部）

中央部		作期: 中晩柑類 2021年																									栽培面積 370 ha									
病害虫名	年別	5月					6月					7月					8月					9月					10月					最高発生面積				
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計
そうか病	本年																																			
	平年				4.1	4.1					7.8	7.8				17.6	17.6				21.7	21.7				17.6	17.6				11.6	11.6			21.7	21.7
黒点病	本年				317.1	317.1					264.3	264.3		105.7	52.9	211.4	370.0	52.9		211.4	105.7	370.0	52.9	158.6	158.6	370.1		52.9	158.6	158.6	370.0	52.9		158.6	158.6	370.1
	平年	10.6	15.9	33.6	209.3	269.3					137.7	137.7	13.2	28.7	63.9	218.7	324.6	20.5	38.2	73.0	212.0	343.7	15.2	31.0	93.1	203.7	343.1	11.6	50.5	103.2	187.1	352.5	11.6	50.5	103.2	187.1
かいよう病	本年																																			
	平年				21.2	21.2					40.0	40.0				28.5	28.5				34.0	34.0				48.2	48.2				45.2	45.2			48.2	48.2
黄斑病	本年																																			
	平年																																			
褐色腐敗病	本年																																			
	平年																																			
疫病	本年																																			
	平年																																			
カンザワハダニ	本年																																			
	平年																																			
ミカンハダニ	本年	52.9		105.7	105.7	264.3				105.7	264.3	370.0			105.7	264.3	370.0				264.3	264.3			264.3	264.3	8.8	17.6	26.5	211.4	264.3			105.7	264.3	370.0
	平年	4.1		13.1	180.0	197.2	25.8	12.6	52.8	147.4	238.6	50.6	21.2	26.7	154.0	252.6	3.2	7.8	45.9	201.8	258.7	11.6	10.9	33.9	136.1	192.6	2.6	12.6	35.1	156.9	207.1	3.2	7.8	45.9	201.8	258.7
カメムシ類	本年																																			
	平年				4.6	4.6					0.5	0.5													0.5	0.5			0.5	5.5	6.0			0.5	5.5	6.0
ハマキムシ類	本年																																			
	平年																																			
ミカンサビダニ	本年																																			
	平年																			0.1	0.1				0.5	0.5				0.5	0.5			0.5	0.5	
ヤノネカイガラムシ	本年																																			
	平年																																			
ルビーロウムシ	本年																																			
	平年																																			
その他カイガラムシ	本年									52.9	52.9				52.9	52.9				52.9	52.9				52.9	52.9				52.9	52.9			52.9	52.9	
	平年				2.6	2.6				8.9	8.9				6.3	6.3			0.5	6.3	6.8			0.5	6.3	6.8			0.5	6.3	6.8			8.9	8.9	
コナジラミ類	本年																			7.6	7.6													7.6	7.6	
	平年										2.6	2.6																						2.6	2.6	
ミカンモグリカ	本年				31.7	31.7				52.9	52.9			52.9	105.7	158.6				158.6	158.6			52.9	264.3	317.2						52.9	264.3	317.2		
	平年				4.6	4.6				31.5	31.5				28.5	28.5				45.3	45.3			5.3	15.2	20.5				25.8	25.8			45.3	45.3	
訪花害虫	本年																																			
	平年																																			
ヤガ類	本年																																			
	平年																																			
アブラムシ類	本年				52.9	52.9				105.7	105.7													52.9	105.7	158.6							52.9	105.7	158.6	
	平年			5.3	30.4	35.7				6.5	6.5				11.3	11.3				9.9	9.9			10.6	31.1	41.6			5.3	10.6	15.9			10.6	31.1	41.6

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

オ 中晩柑類（中西部）

中西部		作期：中晩柑類 2021年																									栽培面積 356 ha									
病害虫名	年別	5月					6月					7月					8月					9月					10月					最高発生面積				
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計
そうか病	本年																																			
	平年			4.5	29.3	33.8				14.8	14.8				63.7	63.7				37.8	37.8			4.5	23.0	27.4				8.9	8.9				63.7	63.7
黒点病	本年				356.0	356.0				267.0	267.0				356.0	356.0		44.5	89.0	222.5	356.0		44.5	178.0	133.5	356.0	44.5		133.5	178.0	356.0	44.5		133.5	178.0	356.0
	平年	4.5	8.9	48.8	166.1	228.3				103.8	103.8	0.9	4.6	52.3	210.6	268.4	4.5	4.5	81.6	222.4	312.9	8.9	8.9	66.8	231.3	315.9	6.9	12.4	95.4	214.5	329.2	6.9	12.4	95.4	214.5	329.2
かいよう病	本年				133.5	133.5				89.0	89.0				44.5	44.5														89.0	89.0				133.5	133.5
	平年			2.2	8.9	11.1				43.0	43.0				31.2	31.2			4.5	43.0	47.5			4.5	63.3	67.7			4.5	57.8	62.3			4.5	63.3	67.7
黄斑病	本年																																			
	平年																																			
褐色腐敗病	本年																																			
	平年																																			
疫病	本年																																			
	平年																																			
カザワハダニ	本年																																			
	平年																																			
ミカンハダニ	本年		44.5	44.5	133.5	222.5			44.5	267.0	311.5	89.0	44.5	133.5	89.0	356.0		44.5	44.5	222.5	311.5		44.5	44.5	267.0	356.0			311.5	311.5	89.0	44.5	133.5	89.0	356.0	
	平年		13.6	27.3	134.0	175.0	13.7	8.7	39.7	181.0	243.2	56.6	34.1	71.2	94.7	256.6	17.3	4.0	49.9	143.9	215.1	1.5	2.0	36.6	192.8	232.8	13.4	8.9	26.7	212.1	261.0	13.4	8.9	26.7	212.1	261.0
カメムシ類	本年																																			
	平年				9.2	9.2				1.4	1.4														1.0	1.0				7.7	7.7			9.2	9.2	
ハマキムシ類	本年																																			
	平年																																			
ミカンサビダニ	本年																																			
	平年																																			
ヤノネカイガラムシ	本年																																			
	平年														0.5	0.5																	0.5	0.5		
ルビーロウムシ	本年																																			
	平年																																			
その他カイガラムシ	本年																																			
	平年									0.0	0.0				0.4	0.4			0.4	0.9	1.3				2.6	2.6				10.7	10.7			10.7	10.7	
コナジラミ類	本年																																			
	平年																																			
ミカンハモグリカ	本年				35.6	35.6				267.0	267.0				89.0	133.5	222.5				89.0	89.0		133.5	44.5	178.0							267.0	267.0		
	平年			4.5	54.9	59.3			7.4	77.1	84.5			10.4	56.3	66.7			19.3	90.5	109.7		4.5	15.6	47.5	67.5		13.4	58.6	72.0		19.3	90.5	109.7		
訪花害虫	本年																																			
	平年																																			
ヤガ類	本年																																			
	平年																																			
アブラムシ類	本年				133.5	133.5			44.5	44.5	89.0		44.5	44.5		89.0			44.5		44.5	44.5			89.0	133.5				44.5	44.5	44.5		89.0	133.5	
	平年			4.5	32.5	37.0				11.9	11.9				1.1	1.1		0.1	2.2	6.6	8.9			2.2	2.2	4.5		4.5	0.1	15.6	20.1		4.5	32.5	37.0	

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

カ 中晩柑類（西 部）

西部		作期：中晩柑類 2021年																				栽培面積 331 ha														
病害虫名	年別	5月					6月					7月					8月					9月					10月					最高発生面積				
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計
そうか病	本年														15.0	15.0				9.1	9.1				9.1	9.1				15.0	15.0					
	平年				0.4	0.4				4.1	4.1				13.6	13.6				9.7	9.7				10.4	10.4				9.4	9.4				13.6	13.6
黒点病	本年				5.0	5.0									206.9	206.9				121.2	121.2				135.0	135.0		59.0	177.0	236.0			59.0	177.0	236.0	
	平年				119.9	119.9				83.3	83.3			12.8	168.0	180.7			21.3	173.1	194.5			39.3	168.8	208.1		5.8	49.6	184.6	240.0		5.8	49.6	184.6	240.0
かいよう病	本年				0.4	0.4									30.1	30.1				17.9	17.9				19.0	19.0				24.9	24.9				30.1	30.1
	平年				0.4	0.4				0.0	15.1	15.2				27.4	27.4			0.0	25.5	25.5			0.0	23.8	23.8				21.7	21.7				27.4
黄斑病	本年																																			
	平年																																			
褐色腐敗病	本年																																			
	平年																																			
疫病	本年																																			
	平年																																			
カンザワハダニ	本年																																			
	平年																																			
ミカンハダニ	本年									27.6	27.6		6.0	55.0	165.5	226.5							2.6	80.2	82.8		59.0	177.0	236.0			59.0	177.0	236.0		
	平年				16.5	16.5				25.1	25.1	3.3	5.6	23.3	111.3	143.4	12.6	15.9	24.8	85.9	139.2	0.9	1.7	9.0	114.5	126.1	0.2	0.6	14.0	128.6	143.3	3.3	5.6	23.3	111.3	143.4
カメムシ類	本年																																			
	平年									0.2	0.2				0.1	0.1									1.6	1.6				8.0	8.0				8.0	8.0
ハマキムシ類	本年																																			
	平年														0.0	0.0																		0.0	0.0	
ミカンサビダニ	本年																																			
	平年																			0.1	0.1				0.2	0.2				0.2	0.2				0.2	0.2
ヤノネカイガラムシ	本年																																			
	平年																								0.8	0.8									0.8	0.8
ルビーロウムシ	本年																																			
	平年																																			
その他カイガラムシ	本年																																			
	平年									0.1	0.3	0.4				1.2	1.2				0.1	0.1				0.1	0.1				0.1	0.1				1.2
コナジラミ類	本年																																			
	平年																																			
ミカンハモグリカ	本年				1.0	1.0		2.0	4.5	27.0	33.5		2.0	4.0	34.0	40.0				26.9	26.9				31.0	31.0	0.1	1.8	3.8	52.3	58.0	0.1	1.8	3.8	52.3	58.0
	平年				2.2	2.2		4.4	7.6	16.8	28.8	0.0	4.4	5.1	40.2	49.8		0.0	5.7	31.6	37.3	0.0	0.0	1.8	36.5	38.4	0.1	1.4	2.9	41.0	45.4	0.0	4.4	5.1	40.2	49.8
訪花害虫	本年																																			
	平年																																			
ヤガ類	本年																																			
	平年																																			
アブラムシ類	本年								3.0	6.8	9.8									5.4	5.4											3.0	6.8	9.8		
	平年				2.3	2.3			0.2	5.1	5.2					8.0	8.0	0.0	0.1	0.2	6.3	6.6	0.0	0.0	0.1	2.8	2.9				2.1	2.1				8.0

※ 端数処理により合計は一致しないことがある。

令和3年度 果樹（かんきつ）予察ほ（防除適期決定ほ）

① 北川村野友（ユズ）

区分	調査月日	病害の調査部位	黒点病		そうか病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	ミカンハモグリガ	他の病害虫の発生状況/コメント等
			100葉(果)		100葉(果)		100葉(果)		100葉		50新梢	100葉	
			発病率%	発病度	発病率%	発病度	発病率%	発病度	雌成虫数	寄生率%	寄生枝率%	寄生率%	
無 防 除 ○ 防 除	5月3日	新葉	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	イセリヤカイガラムシ寄生、開花盛期、開花量：極少、枯れ枝・落葉多
	5月10日	新葉	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	防除、新葉に葉害症状有
	5月17日	新葉	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	5月24日	新葉	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	5月31日	新葉	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	6月7日	新葉	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0	
	6月14日	果実	0	0	0	0	0	0	12	10	0	0	
	6月21日	果実	4	0.3	0	0	0	0	14	11	0	0	イセリヤカイガラムシ寄生
	6月28日	果実	4	0.3	0	0	0	0	5	10	0	8	
	7月5日	果実	4	0.3	0	0	0	0	16	15	0	0	
	7月12日	果実	4	0.3	0	0	0	0	21	18	0	0	
	7月18日	果実	5	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7月26日	果実	8	2	0	0	0	0	11	10	0	0	
	8月2日	果実	9	2.5	0	0	0	0	9	9	20	6	
	8月8日	果実	9	2.5	0	0	0	0	61	31	26	83	ハダニ急増
	8月16日	果実	20	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	アブラムシ類・ミカンハモグリガが寄生(新梢が高位置のため確認不能)、イセリヤカイガラムシ3/100果
	8月23日	果実	60	10.6	0	0	0	0	0	0	10	8	新梢が腰部から発生、イセリヤカイガラムシ4/100果
	8月30日	果実	62	10.7	0	0	0	0	2	2	28	51	
	9月6日	果実	64	12	0	0	0	0	8	9	36	89	イセリヤカイガラムシ2/100果
	9月13日	果実	65	23.8	0	0	0	0	4	3	32	87	イセリヤカイガラムシ1/100果
	9月20日	果実	87	31.9	0	0	0	0	5	4	33	91	イセリヤカイガラムシ2/100果
	9月27日	果実	88	33	0	0	0	0	2	2	36	90	イセリヤカイガラムシ2/100果
	10月4日	果実	98	35.4	0	0	0	0	3	3	0	0	新梢発生無で確認できず
	10月11日	果実	100	41.4	0	0	0	0	4	4	0	0	
	10月18日	果実	100	46.3	0	0	0	0	3	4	0	0	
	10月25日	果実	100	53.4	0	0	0	0	2	2	0	0	

② 香南市香我美町下分（興津早生（温州））

区分	調査月日	病害の調査部位	黒点病		そうか病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	ミカンハモグリガ	他の病害虫の発生状況/コメント等
			100葉(果)		100葉(果)		100葉(果)		100葉		50新梢	100葉	
			発病率%	発病度	発病率%	発病度	発病率%	発病度	雌成虫数	寄生葉率%	寄生枝率%	寄生葉率%	
無 防 除 ○ 防 除	5月3日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	開花始め
	5月10日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	5月17日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	5月24日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	5月31日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	6月7日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	6月14日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6/13防除
	6月21日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
	6月28日	果実	4	0.5	3	1	0	0	0	0	0	70	6/27ジマンダイセン、スブラサイド防除
	7月5日	果実	4	0.5	3	1	0	0	0	0	0	62.5	
	7月12日	果実	10	1.7	3	1	0	0	3	2	0	0	
	7月19日	果実	10	1.7	3	1	0	0	0	0	0	0	
	7月26日	果実	8	1.4	1	0.1	0	0	0	0	0	21.3	
	8月2日	果実	16	2.6	3	0.4	0	0	0	0	0	73	
	8月9日	果実	32	5.4	3	0.4	0	0	0	0	0	80	
	8月16日	果実	88	13.4	0	0	0	0	56	28	0	100	
	8月23日	果実	88	14.3	0	0	0	0	68	42	0	93	
	8月30日	果実	90	14.6	0	0	0	0	77	48	0	45.2	
	9月6日	果実	90	14.6	0	0	0	0	71	44	1	14	
	9月13日	果実	92	15.1	0	0	0	0	16	14	6	6	
	9月20日	果実	98	15.7	0	0	0	0	9	9	9	5.9	
	9月27日	果実	98	15.7	0	0	0	0	5	5	4.3	15	
	10月4日	果実	98	15.1	0	0	0	0	5	4	3.3	12	着色始め
	10月11日	果実	100	15.4	0	0	0	0	41	32	0	13	
	10月18日	果実	100	24.9	0	0	0	0	110	62	—	—	新梢なし
	10月25日	果実	100	24.9	0	0	0	0	46	28	—	—	新梢なし

③ 須崎市浦ノ内（ポンカン）

区分	調査月日	病害の調査部位	黒点病		そうか病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	ミカンモグリガ	他の病害虫の発生状況/コメント等
			100葉(果)		100葉(果)		100葉(果)		100葉		50新梢	100葉	
			発病率%	発病度	発病率%	発病度	発病率%	発病度	雌成虫数	寄生葉率%	寄生枝率%	寄生葉率%	
無 防 除 (防除)	5月3日	旧葉	15	3	0	0	4	1.4	3	3	—	—	
	5月3日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	開花始め
	5月10日	新葉	0	0	0	0	0	0	4	4	2	0	開花盛期、不明病害:葉率2%、発病度0.3
	5月17日	新葉	0	0	0	0	0	0	4	4	2	1	不明病害:葉率8%、発病度1.7
	5月24日	新葉	0	0	0	0	0	0	11	10	0	9	不明病害:葉率39%、発病度13.6
	5月31日	新葉	2	0.3	0	0	0	0	6	5	0	6	不明病害:葉率74%、発病度28.6
	6月7日	新葉	2	0.3	0	0	0	0	12	12	0	7	不明病害:葉率77%、発病度30.1
	6月14日	新葉	5	0.7	0	0	0	0	11	10	0	5	不明病害:葉率79%、発病度29.6
	6月21日	新葉	5	0.7	0	0	0	0	0	0	0	7	不明病害:葉率81%、発病度28.7 防除
	6月28日	果実	24	4.6	2	0.3	0	0	0	0	4	48	注)果実調査果数:50果 (着果数が少ないため)
	7月5日	果実	26	5.4	8	1.7	0	0	0	0	26	28	
	7月12日	果実	40	8.6	8	17.1	0	0	0	0	22	41	
	7月19日	果実	42	8.9	10	2	0	0	3	3	16	14	
	7月26日	果実	42	8.9	10	2	0	0	3	3	6	15	防除
	8月2日	果実	42	8.9	10	2	0	0	2	2	28	14	
	8月8日	果実	42	8.9	10	2	0	0	5	4	8	2	
	8月15日	果実	46	9.4	10	2	0	0	0	0	0	0	
	8月22日	果実	36	6.9	8	1.7	0	0	1	1	0	0	生理落果 炭疽病:発病果率80%、発病度25.7
	8月30日	果実	36	6.9	8	1.7	0	0	0	0	—	—	新梢なし 炭疽病:発病果率94%、発病度30.9
	9月6日	果実	36	6.9	8	1.7	0	0	0	0	0	69	炭疽病:発病果率78%、発病度26.6
	9月13日	果実	36	6.9	8	1.7	0	0	0	0	4	74	炭疽病:発病果率90%、発病度29.7
	9月20日	果実	42	7.7	8	1.7	0	0	0	0	32	56	炭疽病:発病果率94%、発病度32.6
	9月27日	果実	42	8.2	8	1.7	0	0	2	2	50	12	炭疽病:発病果率90%、発病度35.7
	10月4日	果実	46	10	8	1.7	0	0	1	1	58	19	炭疽病:発病果率90%、発病度35.7
	10月10日	果実	46	10	8	1.7	0	0	3	2	4	5	炭疽病:発病果率90%、発病度35.7
	10月18日	果実	66	15.7	8	1.7	0	0	1	1	—	—	新梢なし 炭疽病:発病果率90%、発病度35.7
	10月24日	果実	72	16.8	8	1.7	0	0	2	2	—	—	新梢なし 炭疽病:発病果率90%、発病度35.7

④ 四万十市竹島（文旦）

区分	調査月日	病害の調査部位	黒点病		そうか病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	ミカンハモグリガ	他の病害虫の発生状況/コメント等
			100葉(果)		100葉(果)		100葉(果)		100葉		50新梢	100葉	
			発病率%	発病度	発病率%	発病度	発病率%	発病度	雌成虫数	寄生葉率%	寄生枝率%	寄生葉率%	
無 防 除 ○ 防 除	5月3日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	開花中
	5月10日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5月17日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5月24日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5月31日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6月7日	新葉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6月14日	果実	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6月21日	果実	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	6月28日	果実	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
	7月5日	果実	0	0	0	0	0	0	4	2	0	4	防除
	7月12日	果実	0	0	0	0	0	0	14	9	0	4	
	7月19日	果実	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7月26日	果実	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	防除
	8月2日	果実	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8月9日	果実	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8月16日	果実	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	摘果作業直後
	8月23日	果実	8	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8月30日	果実	8	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9月6日	果実	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	摘果作業後
	9月13日	果実	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	防除
	9月20日	果実	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9月27日	果実	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	摘果作業直後
	10月4日	果実	9	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	着色始め
	10月11日	果実	9	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10月18日	果実	9	1.3	0	0	0	0	8	6	0	0	
	10月25日	果実	9	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	調査終了

ナシ

1 作付面積

88 ha (うち 新高 67 ha)

(令和2年度農業振興センター調べ推定値)

2 生育概況

開花盛期は、「豊水」、「あきづき」で平年より7日早く、「新高」で8日早かった。「新高」、「豊水」では冬期の低温不足による花芽の枯死や開花異常（開花がばらつく、花数が少ない、花が小さい、軸が短いなど）がみられた。果実肥大は、花質が良くなかった影響から平年よりもやや遅れ気味、小玉傾向で推移した。収穫始期は、「豊水」で平年よりも2日、「新高」で6日早く、「あきづき」で1日遅く、収穫終期は、「豊水」で平年よりも5日、「新高」で4日早く、「あきづき」で平年並であった。果実品質については、「新高」の果実重が平年よりも重く、糖度と果肉硬度はほぼ平年並であった。生産量は平年並であった。

生育状況調査

(場所：高知市朝倉、農業技術センター果樹試験場調べ)

品種名		豊 水	あきづき	新 高
開花期 (月日)	始	3月27日 (前年比：－7日) (平年比：－7日)	3月29日 (前年比：－9日) (平年比：－6日)	3月29日 (前年比：－5日) (平年比：－3日)
	盛	3月30日 (前年比：－10日) (平年比：－7日)	3月31日 (前年比：－10日) (平年比：－7日)	4月1日 (前年比：－13日) (平年比：－8日)
	終	4月1日 (前年比：－8日) (平年比：－11日)	4月3日 (前年比：－8日) (平年比：－7日)	4月3日 (前年比：－11日) (平年比：－8日)
収穫期 (月日)	始	8月27日 (前年比：－11日) (平年比：－2日)	9月7日 (前年比：±0日) (平年比：＋1日)	9月24日 (前年比：－5日) (平年比：－6日)
	終	8月30日 (前年比：－11日) (平年比：－5日)	9月13日 (前年比：－4日) (平年比：±0日)	10月5日 (前年比：±0日) (平年比：－4日)

注) 平年値：豊水、新高は33年間(1988年～2020年)、あきづきは9年間(2012年～2020年)の平均

3 病虫害発生概況 (新高)

(1) 病 害

① 黒星病

面積：少

程度：低

開花期以降は好天の日が多かったことや防除により、春期の感染が少なく、発生が少なかったものと考えられる。

② 炭そ病

面積：多

程度：高

例年よりも早い5月中旬の梅雨入りのため、梅雨期間が長く、多くのほ場で発生が見られ、発生程度の高いほ場も見られた。

(2) 虫 害

① ハダニ類 面積：やや少 程度：低

例年よりも梅雨期間が長く、連続した曇雨天も多かったことから、発生面積は平年よりもやや少なく、密度も低かった。

② カメムシ類 面積：少 程度：低

フェロモントラップ調査では、県西部を中心に9月第1～第4半旬の誘殺数が多かった（技術情報第9号参照）が、主要産地のある中央部での誘殺数は比較的少なく、また、ほ場での発生も見られなかった。

③ アブラムシ類 面積：やや少 程度：やや高

5月に新梢での発生が見られた。発生面積は平年よりもやや少なかったが、発生程度の高いほ場が散見された。

(3) 最高発生面積・率

栽培面積 67ha

病害虫名	年別	R3		R2	R1	H30	H29	H28
		発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
黒星病	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
	平年	4.8	7.2	10.6	10.6	10.6	8.0	11.4
炭そ病	本年	67.0	100.0	66.7	100.0	100.0	33.3	33.3
	平年	30.0	44.8	44.8	38.0	37.1	40.4	37.1
ハダニ類	本年	22.3	33.3	66.7	33.3	100.0	66.6	66.6
	平年	30.0	44.7	44.7	44.7	41.4	41.4	41.3
カメムシ類	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
	平年	3.9	5.9	5.8	5.9	5.9	6.1	6.2
コナカイガラムシ類	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アブラムシ類	本年	22.3	33.3	33.3	100.0	100.0	66.6	33.3
	平年	32.9	49.2	45.8	42.6	35.7	32.4	32.4

ナシ（新高）巡回調査結果（9月及び11月は調査未実施）

中央部 新高ナシ 2021年 発生面積 栽培面積 67 ha

病害虫名	年別	5月					6月					7月					8月				
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計
黒星病	本年																				
	平年				4.8	4.8															
炭そ病	本年							7.5	7.4	7.4	22.3						22.3		44.7		67.0
	平年						2.2		2.2	17.8	22.3								2.2	27.8	30.0
ハダニ類	本年														22.3	22.3					
	平年											0.3	0.5	3.7	25.5	30.0					
カメムシ類	本年																				
	平年																				
コナカイガラムシ類	本年																				
	平年																				
アブラムシ類	本年	5.8	5.5	5.5	5.5	22.3															
	平年		0.7	11.4	20.9	32.9															

病害虫名	年別	10月					12月					最高発生面積				
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計
黒星病	本年															
	平年														4.8	4.8
炭そ病	本年											22.3		44.7		67.0
	平年													2.2	27.8	30.0
ハダニ類	本年														22.3	22.3
	平年									13.2	13.2	0.3	0.5	3.7	25.5	30.0
カメムシ類	本年															
	平年			1.0	3.0	3.9								1.0	3.0	3.9
コナカイガラムシ類	本年															
	平年															
アブラムシ類	本年											5.8	5.5	5.5	5.5	22.3
	平年												0.7	11.4	20.9	32.9

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 平年値は、平成23～令和2年の発生面積の平均による。

野菜

1 栽培面積

作物名	作型別	栽培面積 (ha)	作物名	作型別	栽培面積 (ha)
キュウリ	冬春栽培 (促成+ハウス抑制)	116	メロン	抑制栽培	21
	夏秋栽培 (露地)	1		促成栽培	7
ナス	冬春栽培 (促成+半促成)	254		半促成栽培	36
	夏秋栽培 (雨よけ+露地)	11	オクラ	施設	25
ピーマン (シシトウ含む)	冬春栽培 (促成)	89		露地	67
	夏秋栽培 (雨よけ+露地)	32	イチゴ	施設	20
トマト	冬春栽培 (促成)	45			
	夏秋栽培 (雨よけ+露地)	6	ニラ	施設	203
ネギ	施設	133		露地	39
	露地	105	ショウガ	施設	35
スイカ	抑制栽培	5		露地	388
	促成栽培	4	ミョウガ	施設	106
	半促成栽培	4			
	早熟・露地	1	カンショ (早掘)	促成	19

2 生育概況

冬春キュウリ (促成栽培)

定植のピークは、県中央部で9月中旬～10月上旬、中西部、西部で9月下旬～10月上旬であり、概ね平年並であった。全般的に9月下旬～10月上旬定植が主であるが、8月下旬～9月中旬定植のほ場も見られた。11月は平年よりも気温が高かったため徒長気味となり、雄花や死果の発生が多く、この間の収量は平年よりも少ない地域があった。12月中旬頃からは気温は平年並となり、天候にも恵まれたため生育が回復し、冬期の収量は平年並となった。しかし、2～3月は急激な気温の上昇によって急性萎凋症の発生が多く見られ、さらに5月以降に曇雨天が続いた影響で大幅な減収となり、年間収量は平年よりもやや少なめとなった。

促成栽培での主要品種は「常翔661」、「千秀2号」、「エクセレント」、「カレント」「ニーナZ」、「勇翔」、「耐病光華」などで、台木品種は「オールスター輝」、「ゆうゆう一輝黒」、「GT-II」が多かった。

冬春ナス (促成栽培)

定植のピークは、県東部で8月中旬～9月上旬、中央部では8月下旬～9月中旬であり、概ね平年並であった。生育初期の9月中旬には台風や前線、湿った空気の影響で曇雨天の日が多く、定植の早かった県東部では日照量不足により2～3番果の着果が不良気味であった。10月下旬～11月中旬の生育は概ね順調で、年内の収量は平年並となった。年明けの1月上～中旬には再び収穫の山となる見込みであったが、最低気温が氷点下となる日があるなど低温が続き、無加温栽培のほ場では凍害が発生した。2～3月には気温が高く、比較的天候にも恵まれたため増収となったが、5月には曇雨天が続いた影響で花落ちや落果、果実肥

大が鈍化したうえ病害の発生も多くなり、減収となった。年間収量は概ね平年並であった。

促成栽培での主要品種は「竜馬」、「慎太郎」、「土佐鷹」などで、台木品種は「トナシム」、「台太郎」が多かった。

冬春ピーマン・シシトウ（促成栽培）

ピーマンの定植ピークは、県東部では8月上～9月中旬、中西部では9月上旬と概ね平年並であった。中央部の定植ピークは8月上～中旬または9月上～中旬と産地によって異なっていた。シシトウの定植ピークは8月下旬～9月中旬と、概ね平年並であった。定植が早かったほ場では8月の高温や9月の日照量不足の影響により、着花数がやや少なくなった。10月下旬～11月上旬には曇雨天の影響で樹勢の低下や果実肥大の遅れが見られたが、年内の収量は概ね平年並であった。12月から1月にかけては収穫の谷となっていたが、2月になると日照量の増加に伴い着花数は順調に増え、冬期の収量は概ね平年並であった。3～4月は気温が高く、天候も比較的安定しており増収となったが、5月には曇雨天が続いた影響で花落ちや果形の崩れ、果実肥大が鈍化したうえ病害の発生も多くなり、減収となった。年間収量は概ね平年並であった。

促成栽培のピーマンの主要品種は「みおぎ」、「みはた2号」、シシトウは「葵ししとう」、「土佐じしスリム」などである。

冬春トマト（促成栽培）

定植のピークは8月中旬頃で、平年並～やや早かった。生育初期は高温が続いたため、通常よりかん水量を多めに管理するほ場が多かった。10月から1月は比較的生育に好適な天候が続いたことから収穫の山谷はあったものの収量は安定しており、収量は概ね平年並となった。2～3月は気温が平年に比べて高かったことから水分の吸収量が多く、軟化した果実が見られたが、生育自体は順調で、冬期の収量は概ね平年並であった。4月以降になると再び好天に恵まれ、生育は順調となり、収量も増加した。年間収量は概ね平年並であった。

促成栽培の主要品種は桃太郎系（特に「CF桃太郎ファイト」）などで、台木品種は「グリーンガード」、「バックアタック」が多かった。

青ネギ（露地栽培）

5月までの生育は概ね順調であったが、苗の更新が遅れ、古い苗を定植したほ場が多かったためか、べと病やさび病などの発生が見られた。さらに、平年よりも早い梅雨入りの影響で6月は病害の発生が広がり、7月までの収量は平年の6～7割となった。また、8月は停滞した前線などの影響による長雨と、その後の急激な気温上昇による品質の低下や軟腐病の発生により、夏期の収量は平年よりもかなり少なくなった。9月以降も苗不足により収量は伸び悩み、年間収量は平年よりも少なかった。

青ネギの露地栽培は、根から抜いて収穫する通常出荷ネギと、根部を残し地上部のみを刈り取る加工用ネギの2種類があり、主な品種は「合黒」である。

3 病害虫発生概況

冬春キュウリ（ハウス促成栽培）

(1) 病 害

① ベと病


面積：やや多

程度：並

ア 発生概況

10月の発生面積は平年よりも多かったものの、12月まで大幅な増加はなく、発生面積率は40%以下で推移した。1月以降は漸増傾向となり、発生面積率は3月には約75%、4月には約91%まで上昇した。発病葉率もほぼ同様の傾向で推移し、4月の発病葉率は約22%まで上昇した。全般的には発生面積は平年よりもやや多く、発病程度は平年並であった。

イ 発生経過



キュウリ(促成栽培)におけるべと病の発生推移

② 灰色かび病


面積：少

程度：並

ア 発生概況

本病の発生時期である12～3月は晴れの日が比較的多く、日照時間も平年よりも長かったことから発生はほとんど見られず平年よりも少発生であった。また、発病果率も発生が見られた2月で0.1%と低く、発生程度は平年並であった。

イ 発生経過



キュウリ(促成栽培)における灰色かび病の発生推移

③ 菌核病


面積：多

程度：並

ア 発生概況

11月から発生が見られ始め、発生面積率は平年の2.8倍と多かった。その後、1月には一旦減少したが、2月～3月にかけて増加した。11月および2～3月の気温は平年よりも高く、暖房機の稼働時間が短かったため施設内が多湿になりやすく、多発したと考えられた。しかしながら、発病果率は、発生期間を通して0.1%程度と低く、発生程度は平年並であった。

イ 発生経過



キュウリ(促成栽培)における菌核病の発生推移

④ モザイク病


面積：少

程度：低

ア 発生概況

巡回調査では、作期を通じて発生は見られなかった。黄化えそ病対策のため防虫ネットの展張や殺虫剤の散布など媒介虫の防除対策が徹底されており、ほとんど発生が見られなかったと考えられる。

イ 発生経過



キュウリ(促成栽培)におけるモザイク病の発生推移

⑤ うどんこ病


面積：多

程度：高

ア 発生概況

栽培期間を通して発生が見られた。発生面積率は10～1月までは平年に比べてやや少～並程度で推移していたが、2月以降は漸増傾向となり、4月には発生面積率は約84%、発病葉率は約17%と高くなった。全般的には平年よりも発生面積は多く、発病程度は高かった。

イ 発生経過



⑥ 黄化えそ病


面積：並

程度：並

ア 発生概況

栽培初期から漸増傾向で推移したが、ほぼ平年並の発生であった。また、発病株率は4月を除き平年並～やや高く推移した。11月の気温が平年よりも高く、媒介虫であるミナミキイロアザミウマの発生を抑えきれなかったほ場を中心に発生が継続したことが要因と考えられた。

イ 発生経過




⑦ つる枯病 面積：並 程度：低

ア 発生概況

1月から発生が見られ始め、2～3月にかけて増加した。その後、防除の徹底により4月は平年並以下まで低下し、全般的には平年並の発生であった。発病株率は、平年よりもやや低～低で推移した。

イ 発生経過




⑧ 褐斑病 面積：少 程度：低

ア 発生概況

栽培初期の発生面積率は平年よりも高かったが、12月には防除の徹底により平年並以下となり、1月以降の発生はほとんど見られなかった。発病葉率は栽培期間を通して平年並以下で推移した。全般的には平年よりも発生面積は少なく、発生程度は低かった。

イ 発生経過



⑨ 退緑黄化病


面積：多

程度：高

ア 発生概況

11月から発生が見られ、2月以降増加した。発生面積率、発病株率ともに栽培期間を通して平年よりも高く推移した。媒介虫であるタバココナジラミの発生が平年よりも多かったことが要因と考えられる。

イ 発生経過



(2) 虫 害

① アブラムシ類


面積：多

程度：高

ア 発生概況

栽培中・後期の2月と4月にワタアブラムシの発生が見られた。平年に比べて発生面積率、発生程度ともに高かったが、最高発生面積率は約13%、寄生株率は1%程度であり、実害はほとんどなかった。

イ 発生経過



② ハスモンヨトウ


面積：少

程度：並

ア 発生概況

例年とは異なり栽培初期の発生は見られず、1月にわずかに発生が見られたのみであった。全般的には、発生面積は平年よりも少なく、発生程度は平年並であった。

イ 発生経過



キュウリ(促成栽培)におけるハスモンヨトウの発生推移

③ ミナミキイロアザミウマ


面積：並

程度：やや低

ア 発生概況

栽培初期の発生面積率は平年に比べ高く、それ以降も漸増したが、概ね平年並で推移した。寄生葉率は1月以降増加傾向であったが、全般的には発生程度は平年よりもやや低であった。薬剤抵抗性の発達で効果の高い防除薬剤が少ないため、年内に防除が徹底できていない場合、日照時間が長くなり、気温の上昇する2月頃から密度が高まったと考えられた。

イ 発生経過



キュウリ(促成栽培)におけるミナミキイロアザミウマの発生推移

④ タバココナジラミ


面積：並

程度：低

ア 発生概況

栽培期間を通じて発生が見られた。全般的には発生面積は平年並、発生程度は平年よりも低かったが、12月以降の発生面積率は平年よりも高く推移したことから、本種が媒介する退緑黄化病の多発生につながったと考えられる。

イ 発生経過



キュウリ(促成栽培)におけるタバココナジラミの発生推移

(3) 最高発生面積・率

病害虫名	栽培面積 R3		栽培面積 116ha		
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	R2 発生面積率 (%)	H31 発生面積率 (%)	H30 発生面積率 (%)
べと病	104.9	90.4	75.7	74.5	58.9
斑点細菌病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
灰色かび病	0.5	0.4	5.7	3.6	3.8
菌核病	9.7	8.3	4.0	7.8	3.8
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うどんこ病	97.0	83.6	57.0	55.6	75.6
つる枯病	54.7	47.2	47.9	48.4	53.5
つる割病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
褐斑病	7.7	6.6	11.7	18.4	15.7
黄化えそ病	70.4	60.7	74.5	56.1	26.5
ハスモンヨトウ	1.9	1.6	6.4	13.6	0.6
シロイチモンズヨトウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ミナミキイロアザミウマ	96.6	83.3	82.0	80.5	89.9
ヒラズハナアザミウマ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
オンシツコナジラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバココナジラミ	59.6	51.4	38.8	22.8	46.1
オカボノアザミウマ	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
ワタハリクロノメイガ	7.8	6.7	0.0	0.2	0.0
トマトハモクグリハエ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハダニ類	15.3	13.2	6.4	10.7	8.9
ホリタニ類	8.0	6.9	3.5	3.2	8.8
アブラムシ類	15.3	13.2	10.4	7.6	0.0

作物名:キュウリ		作型:ハウス抑制・促成						中央部(防除所)						令和3園芸年度(2020～2021)						栽培面積						69 ha	
病害虫名	年別	2月					平均 ()	3月					平均 ()	4月					平均 ()	最高発生面積					平均 ()		
		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計			
べと病 (発病葉率)	本年 平年		3.2	5.7	38.3 24.0	38.3 32.9	(4.3) (8.1)	0.8	6.1	15.3 10.2	46.0 28.2	61.3 45.2	(15.2) (14.7)	3.3	15.3 9.6	30.7 15.4	23.0 28.5	69.0 56.7	(34.0) (25.6)	3.3	15.3 9.6	30.7 15.4	23.0 28.5	69.0 56.7	(34.0) (25.6)		
斑点細菌病 (発病葉率)	本年 平年																										
灰色かび病 (発病果率)	本年 平年																										
菌核病 (発病果率)	本年 平年			0.8	1.4	2.3	(0.1)				0.9	0.9	(0.0)				1.1	1.1	(0.0)			0.8	1.4	2.3	(0.1)		
モザイク病 (発病株率)	本年 平年				7.7 0.1	7.7 0.1	(0.1)				7.7	7.7	(0.2)										7.7 2.0	7.7 2.0	(0.2) (0.0)		
うどんこ病 (発病葉率)	本年 平年		3.8 1.8	3.8 7.3	30.7 33.6	38.3 42.7	(9.1) (8.6)		7.7 1.7	7.7 6.4	30.7 35.7	46.0 44.3	(14.8) (9.5)		7.7 2.6	15.3 7.3	38.3 34.1	61.3 45.4	(20.0) (13.0)		7.7 2.6	15.3 7.3	38.3 34.1	61.3 45.4	(20.0) (13.0)		
つる枯病 (発病株率)	本年 平年				38.3 20.2	38.3 20.2	(0.8) (1.0)				46.0 26.7	46.0 26.8	(1.3) (1.5)				23.0 36.3	23.0 36.4	(1.6) (2.6)			0.0	0.1	46.0 36.4	46.0 36.4	(1.3) (2.6)	
褐斑病 (発病葉率)	本年 平年			0.0	2.5	2.5	(0.6)			0.0	2.6	2.7	(0.4)			0.0	2.6 3.7	2.6 3.8	(0.1) (0.9)			0.8	7.7 3.5	7.7 4.3	(0.4) (0.6)		
疫病 (発病株率)	本年 平年																										
軟腐病 (発病株率)	本年 平年																										
緑枯細菌病 (発病葉率)	本年 平年																										
つる割病 (発病株率)	本年 平年				0.1	0.1					0.1	0.1					0.1	0.1					0.1	0.1			
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平年		7.6 0.9	7.7 1.5	7.7 32.4	23.0 42.3	(3.1) (2.9)	0.6 1.9	7.0 3.4	7.7 10.0	23.0 29.5	(4.3) (4.6)	0.6 3.0	7.0 6.6	15.4 9.4	15.4 27.7	38.4 46.7	(7.3) (7.4)	0.6 3.0	7.0 6.6	15.4 9.4	15.4 27.7	38.4 46.7	(7.3) (7.4)			
輪紋病 (発病葉率)	本年 平年																										
炭そ病 (発病葉率)	本年 平年																						0.1	0.1			
ウリケンワハ (寄生株率)	本年 平年																										
トマトモグリハエ (被害葉率)	本年 平年																0.0 0.0	0.0					1.5 1.5	1.5 1.5	(0.0)		
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平年				7.7 2.7	7.7 2.7	(0.2) (0.1)				1.9	1.9	(0.1)				15.3 2.2	15.3 2.2	(3.1) (0.4)				15.3 4.1	15.3 4.1	(3.1) (0.2)		
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平年				1.3	1.3	(0.1)				0.7	0.7	(0.1)				0.1	0.1	(0.0)				10.3 10.3	10.3 10.3	(0.7)		
ミナミキアザミウマ (寄生葉率)	本年 平年		1.7	7.3	53.7 51.4	53.7 60.4	(3.6) (10.9)	3.0	6.3	11.9 38.3	53.7 59.4	(6.7) (22.1)	8.5	11.1	7.7 14.5	53.7 31.1	61.3 65.1	(13.8) (33.2)	8.5	11.1	7.7 14.5	53.7 31.1	61.3 65.1	(13.8) (33.2)			
オンツコナジラミ (寄生株率)	本年 平年																										
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平年				7.7 0.8	7.7 0.8	(0.2) (0.0)				7.7 0.1	7.7 0.1	(0.4) (0.0)										7.7 1.7	7.7 1.7	(0.4) (0.1)		
シロイチモンジトウ (被害株率)	本年 平年																										
オカボノアカアブラムシ (寄生株率)	本年 平年										0.4	0.4	(0.0)			0.4	0.4	0.8	(0.2)			0.4	0.4	0.8	(0.2)		
ワタベクロノメイカ (被害株率)	本年 平年																						7.7 4.8	7.7 4.8	(0.2) (0.3)		
ヒラスハナアザミウマ (寄生葉率)	本年 平年																										
タバココナジラミ (寄生株率)	本年 平年				30.7 12.9	30.7 12.9	(2.0) (1.0)				15.3 12.4	15.3 12.4	(2.3) (1.0)			7.7	23.0 13.1	30.7 14.3	(5.8) (2.6)		0.2	1.0	7.0	38.3 37.6	38.3 45.7	(2.1) (8.3)	
ハダニ類 (寄生葉率)	本年 平年			0.1	0.4	0.5	1.0	(0.4)			7.7 0.8	7.7 0.8	(0.7) (0.0)		7.7		7.7 2.3	15.3 2.3	(5.1) (0.1)		7.7		7.7 2.3	15.3 2.3	(5.1) (0.1)		
チビクロハネキノコハエ (寄生株率)	本年 平年										0.0	0.0											0.0	0.0			
オオタバコガ (寄生株率)	本年 平年																										
黒星病 (発病果率)	本年 平年																										
退緑黄化病 (発病株率)	本年 平年		3.8	3.9	15.3 1.4	23.0 1.4	(2.6) (0.1)			15.3	15.3	15.3 3.2	46.0 3.2	(7.1) (0.1)		15.3	23.0	30.6 4.7	68.9 4.7	(7.1) (0.2)		15.3	23.0	30.6 4.7	68.9 4.7	(7.1) (0.2)	

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

作物名: キュウリ		作型: 促成		中西部(須崎)		令和3園芸年度(2020~2021)		栽培面積 27 ha																	
病害虫名	年別	2月					平均 ()	3月					平均 ()	4月					平均 ()	最高発生面積					平均 ()
		基	多	中	少	計		基	多	中	少	計		基	多	中	少	計		基	多	中	少	計	
べと病 (発病葉率)	本年 平年	0.1	7.7 0.7	3.9 1.8	5.3	11.6 7.9	(20.4) (6.5)	0.9	3.9 2.0	0.8	15.4 8.5	19.3 12.3	(14.7) (10.8)	3.9 0.5	2.5	19.3 4.4	10.6	23.2 17.9	(35.4) (18.1)	3.9 0.5	2.5	19.3 4.4	10.6	23.2 17.9	(35.4) (18.1)
斑点細菌病 (発病葉率)	本年 平年				0.4	0.4	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)										0.4	0.4	(0.0)
灰色かび病 (発病果率)	本年 平年			0.1 0.4	0.4 0.1	0.5 0.5	(0.2) (0.2)				0.5	0.5	(0.1)				0.5	0.5	(0.0)			0.1 0.4	0.4 0.1	0.5 0.5	(0.2) (0.2)
菌核病 (発病果率)	本年 平年				1.0 1.2	1.0 1.2	(0.1) (0.1)				0.0	0.0	(0.0)										1.0 1.2	1.0 1.2	(0.1) (0.1)
モザイク病 (発病株率)	本年 平年										0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0	
うどんこ病 (発病葉率)	本年 平年				3.9 6.3	3.9 6.7	(2.6) (2.2)		3.9 0.5	7.7 5.8	11.6 6.2	(7.7) (2.0)		7.7 0.6	15.4 4.4	23.1 10.1	(15.6) (6.1)		7.7 0.6	15.4 4.4	23.1 10.1	(15.6) (6.1)	7.7 7.6	15.4 10.1	(15.6) (6.1)
つる枯病 (発病株率)	本年 平年			0.4	3.8	4.2	(2.5)			0.8	4.7	5.5	(3.4)			1.2	6.0	7.2	(3.7)			1.2	6.0	7.2	(3.7)
褐斑病 (発病葉率)	本年 平年			2.0	3.8	5.8	(3.6)		0.1	0.9	3.6	4.6	(3.6)	0.1		0.1	4.7	4.9	(3.4)			1.5	6.2	7.7	(3.1)
疫病 (発病株率)	本年 平年																								
軟腐病 (発病株率)	本年 平年																								
緑枯細菌病 (発病葉率)	本年 平年																								
つる割病 (発病株率)	本年 平年																								
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平年			7.7 1.7	7.7 4.6	15.4 6.9	(2.6) (2.5)			11.6 1.5	3.9 4.6	15.5 7.1	(3.1) (3.7)			11.6 2.9	3.9 5.9	15.5 10.1	(3.4) (4.6)			11.6 2.9	3.9 5.9	15.5 10.1	(3.4) (4.6)
輪紋病 (発病葉率)	本年 平年	0.0	0.6	1.7	4.6	6.9	(2.5)	0.4	0.6	1.5	4.6	7.1	(3.7)	0.4	0.8	2.9	5.9	10.1	(4.6)	0.4	0.8	2.9	5.9	10.1	(4.6)
炭そ病 (発病葉率)	本年 平年																								
ウリケンワハ (寄生株率)	本年 平年																								
トマトハモグリハエ (被害葉率)	本年 平年																						0.1	0.1	(0.1)
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平年										0.5	0.5	(0.0)				0.6	0.6	(0.3)				0.1	0.1	(0.1)
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平年																						2.1	2.1	(0.6)
ミナミキロアザミウマ (寄生葉率)	本年 平年	0.0	0.5	0.6	19.3 7.4	19.3 8.6	(5.1) (4.9)		7.7 0.4	11.6 2.0	19.3 9.5	(15.4) (6.7)		7.7 0.6	19.3 3.0	27.0 16.5	(22.0) (18.1)		7.7 0.6	19.3 3.0	27.0 16.5	(22.0) (18.1)	19.3 9.8	27.0 16.5	(22.0) (18.1)
オンシツコナシラミ (寄生株率)	本年 平年																0.1	0.1	(0.0)				0.1	0.1	(0.0)
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平年																0.8	0.8	(0.0)				0.8	0.8	(0.0)
シロイチモンシトウ (被害株率)	本年 平年																								
オカボノアカアブラムシ (寄生株率)	本年 平年																								
ワタヘクロノメイカ (被害株率)	本年 平年																						0.1	0.1	(0.0)
ヒラスハナアザミウマ (寄生葉率)	本年 平年																						0.1	0.1	(0.0)
タバココナシラミ (寄生株率)	本年 平年				11.6 2.6	11.6 2.6	(0.9) (1.0)			7.7 1.8	7.7 1.8	(1.1) (0.2)			7.7 4.3	7.7 4.3	(0.9) (0.9)			7.7 4.3	7.7 4.3	(0.9) (0.9)	3.9 6.0	15.4 8.1	(10.0) (7.5)
ハダニ類 (寄生葉率)	本年 平年			0.1	0.1	0.1	(0.0)		0.5	0.4	0.8	(0.4)	0.0	0.1	0.6	0.4	1.1	(1.5)	0.0	0.1	0.6	0.4	1.1	(1.5)	
チビクロハネキノコハエ (寄生株率)	本年 平年																								
オオタハカ (寄生株率)	本年 平年																								
黒星病 (発病果率)	本年 平年																								
退緑黄化病 (発病株率)	本年 平年				0.2	0.2	(0.0)				0.2	0.2	(0.0)				0.2	0.2	(0.0)				0.2	0.2	(0.0)

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

作物名: キュウリ		作型: 促成		西部(幡多)		令和3園芸年度(2020～2021)		栽培面積		19 ha															
病害虫名	年別	2月					平均 ()	3月					平均 ()	4月					平均 ()	最高発生面積					平均 ()
		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計	
べと病 (発病葉率)	本年 平均		0.0	1.2	5.7 7.4	5.7 8.6	(2.7) (7.1)		0.1	1.9	5.7 7.7	5.7 9.8	(2.7) (9.4)	0.2	0.9	2.1 2.8	10.6 8.2	12.7 12.1	(3.3) (14.9)	0.2	0.9	2.1 2.8	10.6 8.2	12.7 12.1	(3.3) (14.9)
斑点細菌病 (発病葉率)	本年 平均																								
灰色かび病 (発病果率)	本年 平均				0.3	0.3	(0.1)				0.7	0.7	(0.3)				0.3	0.3	(0.0)			0.0	1.0	1.0	(0.2)
菌核病 (発病果率)	本年 平均				1.0 0.9	1.0 0.9	(0.1) (0.2)				0.5 0.5	0.5 0.5	(0.1) (0.1)				0.2	0.2	(0.0)				1.0 1.0	1.0 1.0	(0.1) (0.3)
モザイク病 (発病株率)	本年 平均				0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0					0.0	0.0	
うどんこ病 (発病葉率)	本年 平均				9.5 7.6	9.5 8.2	(1.3) (5.8)		1.9	7.6	9.5	9.5	(7.5)	2.1	2.1	8.4	12.6	12.6	(15.8)	2.1	2.1	8.4	12.6	12.6	(15.8)
つる枯病 (発病株率)	本年 平均	0.1	0.6	7.6 0.1	8.2 0.1	(5.8) (0.1)		0.4	6.5	6.9	1.0	(3.5) (0.2)	0.5	0.8	1.9	7.8	11.0	(12.7)	0.5	0.8	1.9	7.8	11.0	(12.7)	
褐斑病 (発病葉率)	本年 平均			0.1	3.3	3.4	(1.4)		0.2	0.3	0.5	1.0	(0.2)	0.2	0.5	1.4	2.1	(3.3)	0.2	0.5	1.4	2.1	(3.3)		
疫病 (発病株率)	本年 平均	0.0	0.1	0.4	1.9	2.4	(3.6)		0.2	0.3	2.6	3.1	(3.7)	0.0	0.5	2.0	2.6	(3.4)	0.2	0.3	2.6	3.1	(3.7)		
軟腐病 (発病株率)	本年 平均																					0.0	0.0		
緑枯細菌病 (発病葉率)	本年 平均																								
つる割病 (発病株率)	本年 平均																	(0.0)							(0.0)
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平均		0.5 0.3	1.0 0.9	15.0 3.7	16.5 4.9	(3.2) (1.8)	0.5 0.4	1.0 4.4	15.0 5.9	16.5 (2.5)	(3.2)	0.2 0.3	0.8 0.9	1.5 1.5	14.0 4.9	16.5 7.6	(4.7) (5.3)	0.2 0.3	0.8 0.9	1.5 1.5	14.0 4.9	16.5 7.6	(4.7) (5.3)	
輪紋病 (発病葉率)	本年 平均	0.0	0.3	0.9	3.7	4.9	(1.8)	0.1	0.4	1.0	4.4	5.9	(2.5)	0.3	0.9	1.5	4.9	7.6	(5.3)	0.3	0.9	1.5	4.9	7.6	(5.3)
炭そ病 (発病葉率)	本年 平均																								
ウリキンウハ (寄生株率)	本年 平均																								
トマトハモグリハエ (被害葉率)	本年 平均																					0.0	0.0	(0.0)	
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平均				0.1	0.1	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)			0.0	0.3	0.3	(0.2)			0.0	0.3	0.3	(0.2)
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平均				0.7	0.7	(0.5)			0.1	0.6	0.8	(0.5)			0.1	0.8	0.9	(0.6)			0.1	1.9	1.9	(2.6)
ミナミキロアザミウマ (寄生葉率)	本年 平均		1.9 0.0	1.9 1.3	3.8 8.1	(6.9) 9.4	(5.4)	0.7	1.9	3.8	5.7	(7.6) (14.2)	0.2 0.2	1.5 1.5	2.1 3.4	4.5 8.5	8.3 13.7	(16.0) (19.8)	0.2 0.2	1.5 1.5	2.1 3.4	4.5 8.5	8.3 13.7	(16.0) (19.8)	
オンシツコナシラ (寄生株率)	本年 平均																								
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平均	0.1	0.1	0.1	1.2	1.4	(1.3)			0.1	0.3 0.7	0.3 0.8	(0.4) (0.5)				0.1	0.1	(0.0)	0.1	0.1	0.1	0.3 1.2	0.3 1.4	(0.4) (1.3)
シロイチモンシトウ (被害株率)	本年 平均																								
オホボノアカアブラムシ (寄生株率)	本年 平均				0.0	0.0	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)
ワタベクロメカイ (被害株率)	本年 平均																					0.1 0.4	0.1 0.4	0.1 (0.2)	
ヒラスハナアザミウマ (寄生葉率)	本年 平均																								
タバココナジラミ (寄生株率)	本年 平均				1.9 0.8	1.9 0.8	(0.2) (0.2)				1.0	1.0	(0.4)			2.1 0.0	8.4 1.7	10.5 1.7	(8.7) (1.0)		2.1 0.3	8.4 6.0	10.5 6.4	(8.7) (4.4)	
ハダニ類 (寄生葉率)	本年 平均				0.0	0.0	(0.1)				0.1	0.1	(0.1)				0.1	0.1	(0.1)				0.1 0.1	0.1 (0.1)	
チビクロハネキノコハエ (寄生株率)	本年 平均				0.0	0.0	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)				0.0	0.0					0.0	0.0	(0.0)
オオカキカ (寄生株率)	本年 平均																								
黒星病 (発病果率)	本年 平均																								
退緑黄化病 (発病株率)	本年 平均				0.0	0.0	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)				0.0	0.0	(0.0)

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

冬春ナス（促成栽培）

（１）病 害

① 灰色かび病


面積：やや多

程度：低

ア 発生概況

1月から発生が見られ始め、最多時の発生面積は平年よりもやや多かったが、発病果率は最高時でも約0.2%と低かった。

イ 発生経過



ナス(促成栽培)における灰色かび病の発生推移

② 青枯病


面積：やや少

程度：低

ア 発生概況

栽培初期の9月から県東部を中心に発生が見られ、10月までの発生は平年並であった。その後は微増傾向で推移したが、発生面積、発病株率ともに栽培期間を通して平年並以下であった。

イ 発生経過



ナス(促成栽培)における青枯病の発生推移

③ 黒枯病


面積：並

程度：やや高

ア 発生概況

栽培初期の9月から発生が見られ始めたものの、発生面積、発病程度ともに栽培後期の4月まで平年よりも低く推移した。しかしながら、5月には発生が急増し、水泡症などの果実被害も見られた。

イ 発生経過



④ すすかび病


面積：並

程度：並

ア 発生概況

発生は栽培後期まで漸増傾向で推移したが、発生面積、発病程度ともに平年並であった。天敵利用に伴う薬剤防除回数の減少により、県下の各産地とも発生が多い傾向にある。

イ 発生経過




⑤ うどんこ病 面積：少 程度：低

ア 発生概況

栽培初期の9月から発生が見られ始めたものの、例年発生の多い10～12月の発生面積は平年の半分以下と少なく、1月以降も概ね平年並で推移した。発病程度は5月には平年よりも高くなったものの、概ね平年よりも低く推移した。

イ 発生経過




(2) 虫 害

① アブラムシ類 面積：やや多 程度：低

ア 発生概況

栽培期間を通して発生がみられ、3月までの発生は概ね平年並～多く推移し、特に、11～12月の発生面積は平年の4～5倍と多かった。寄生株率も最多時の11月には約1.4%と平年よりも高かったが、全般的には低い発生程度であった。

イ 発生経過



② ハスモンヨトウ


面積：多

程度：高

ア 発生概況

栽培初期の9月は県東部を中心に発生が多く、発生面積率は約49%であった。その後は減少したものの、一部で冬期も発生が続き、栽培後期の5月にも発生が見られた。全般的に発生面積は平年よりも多く、発生程度も高かった。発生の多かった県東部では、ジアミド剤に対する感受性が低下したと考えられる個体群が確認されている。

イ 発生経過



③ ミナミキイロアザミウマ


面積：少

程度：低

ア 発生概況

栽培初期の9～10月を中心に発生が見られたものの、平年よりもかなり少なかった。天敵(タバコカスミカメ)が増殖・定着した11月以降は低密度に抑えられ、栽培期間を通して概ね平年よりも少なく推移し、被害果の発生もほとんど見られなかった。

イ 発生経過



④ ホコリダニ類


面積：並

程度：低

ア 発生概況

主に栽培初期および後期に発生が見られた。3月の発生面積は平年よりも多かったが、全般的には平年並で、被害株率も概ね平年並～低で推移した。

イ 発生経過



⑤ タバココナジラミ


面積：並

程度：少

ア 発生概況

栽培初期から発生が見られたが、発生面積、寄生葉率ともに栽培期間を通して平年並以下で推移した。天敵(タバコカスミカメ)の増殖・定着により、12月以降は成虫が散見される程度であり、すす病の発生はほとんど見られなかった。

イ 発生経過




⑥ ハモグリバエ類 面積：少 程度：高

ア 発生概況

栽培初期の9月から発生が見られたが、発生面積は栽培期間を通して平年並以下で推移した。被害葉率は12月に2.8%と高かった以外は防除により1%以下と低く推移し、ほとんど問題にならない程度の発生であった。

イ 発生経過



(3) 最高発生面積・率

冬春栽培

栽培面積

254 ha

病虫害名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
灰色かび病	20.3	8.0	7.6	8.1	9.7
菌核病	5.0	2.0	0.1	0.0	1.0
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うどんこ病	41.5	16.3	31.6	32.7	25.0
青枯病	23.8	9.4	11.5	22.6	4.2
黒枯病	181.3	71.4	75.0	79.8	83.2
すすかび病	191.1	75.2	100.0	93.5	96.3
白絹病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
疫病	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0
半身萎凋病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
水泡症 (灰色かび病)	0.0	0.0	0.4	7.3	2.7
軟腐病	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
褐紋病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
輪紋病	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0
苗立枯病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄化えそ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ミナキイロアザミウマ	69.0	27.2	64.6	58.7	83.5
ヒラズミナキイロアザミウマ	45.6	18.0	36.0	10.2	64.6
アブラムシ類	21.3	8.4	4.0	3.7	7.3
ハスモンヨトウ	125.0	49.2	41.7	15.8	34.4
オンシツコナシラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ホコリダニ類	31.7	12.5	17.4	20.6	24.0
シロイチモシヨトウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバココナシラミ	232.8	91.7	93.6	93.6	99.0
ハモグリバエ類	7.2	2.8	11.0	9.6	8.1
ハダニ類	19.8	7.8	8.4	3.8	23.1
オオタバコカ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
コナカイガラムシ類	2.0	0.8	7.7	0.8	7.5

夏秋ナス（雨よけ・露地栽培）

（１）最高発生面積・率

夏秋栽培 病害虫名	栽培面積 R3		11ha		
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	R2 発生面積率 (%)	H31 発生面積率 (%)	H30 発生面積率 (%)
灰色かび病	1.3	11.5	12.8	4.4	1.3
菌核病	0.3	2.5	1.6	0.8	0.2
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うどんこ病	3.8	34.7	32.0	88.8	28.0
青枯病	1.2	10.5	13.2	10.7	7.8
黒枯病	2.5	23.1	25.2	6.7	12.6
すすかび病	2.2	19.8	18.8	16.3	31.2
白絹病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
疫病	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0
半身萎凋病	0.8	7.6	3.6	5.1	3.2
軟腐病	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0
褐紋病	2.4	21.8	32.0	0.0	41.6
輪紋病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
苗立枯病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄化えそ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ミナミキイロアザミウマ	2.2	20.0	23.2	18.4	18.0
ヒラスハナアザミウマ	2.1	19.1	23.2	18.4	22.0
アブラムシ類	1.9	17.6	18.0	10.4	9.1
ハスモンヨトウ	2.2	19.8	27.6	4.0	9.6
オンシツコナシラミ	0.6	5.5	4.4	4.0	2.0
ホコリダニ類	0.3	2.9	3.6	2.5	2.6
シロイチモシヨトウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバココナシラミ	1.5	13.8	15.2	8.8	7.2
ハモクリハエ類	0.0	0.0	4.0	3.2	2.5
ハダニ類	2.2	19.8	25.2	62.2	61.0
オオタバコガ	2.2	20.2	29.2	4.0	8.0

$$\begin{array}{c} | \\ \infty \\ | \end{array}$$

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

作物名: ナス		作型: 促成		中央部(防除所)		令和3園芸年度(2020~2021)																栽培面積		12 ha									
病害虫名	年別	基	多	中	少	計	平均	基	多	中	少	計	平均	基	多	中	少	計	平均	基	多	中	少	計	平均								
灰色かび病 (発病果率)	本年 平年				0.5 1.1	0.5 1.1	(0.0) (0.2)				0.4 0.8	0.4 0.8	(0.0) (0.0)				1.0 1.0	1.0 1.0	(0.1) (0.1)				0.1 0.4	0.1 0.4	(0.0) (0.0)				0.8 1.1	0.8 1.1	(0.1) (0.2)		
菌核病 (発病株率)	本年 平年				0.3 0.3	0.3 0.3	(0.0) (0.0)				0.5 0.5	0.5 0.5	(0.1) (0.1)				0.3 0.3	0.3 0.3	(0.0) (0.0)				0.5 0.5	0.5 0.5	(0.1) (0.1)				0.5 0.5	0.5 0.5	(0.1) (0.1)		
モザイク病 (発病株率)	本年 平年																																
うどんこ病 (発病度)	本年 平年										1.5 2.0	1.5 2.0	(0.1) (0.5)				1.5 2.2	1.5 2.4	(0.1) (1.7)				1.7 0.5	1.7 3.5	(4.0) (2.9)				4.5 0.3	4.5 4.3	(0.3) (1.8)		
青枯病 (発病株率)	本年 平年			0.1	0.5	0.5	(0.3)			0.1	0.5	0.5	(0.3)		0.0	0.0	0.6	0.6	(0.5)		0.0	0.0	0.7	0.7	(0.6)		0.0	0.0	0.7	0.7	(0.6)		
黒枯病 (発病度)	本年 平年			1.5	6.0	7.5	(4.8)			1.5	9.0	10.5	(7.6)			4.5	7.5	12.0	(12.8)			1.7	6.9	8.6	(9.8)			4.5	7.5	12.0	(12.8)		
すすかび病 (発病度)	本年 平年				5.9	5.9	(2.2)			0.3	4.1	4.4	(2.8)	0.1	0.1	1.1	4.9	6.2	(6.4)			1.1	3.8	4.9	(4.5)		0.1	0.2	6.5	6.8	(4.5)		
すずかび病 (発病度)	本年 平年				7.5	7.5	(1.6)			1.5	6.0	7.5	(6.8)			6.0	3.0	9.0	(15.2)			5.1	3.4	8.6	(14.8)			6.0	3.0	9.0	(15.2)		
白絹病 (発病株率)	本年 平年	0.1	0.1	2.1	6.4	8.6	(9.4)		0.3	2.2	7.1	9.6	(11.0)	0.2	0.5	3.8	6.5	10.9	(16.6)	0.1	0.4	2.7	8.1	11.2	(14.4)	0.1	0.4	2.7	8.1	11.2	(14.4)		
疫病 (発病株率)	本年 平年																																
半身萎凋病 (発病株率)	本年 平年																																
水泡症(灰色かび) (発病果率)	本年 平年				0.5	0.5	(0.1)				0.1	0.1	(0.1)															0.5	0.5	(0.1)			
水泡症(黒枯病) (発病果率)	本年 平年										0.2	0.2	(0.0)															0.2	0.2	(0.0)			
軟腐病 (発病株率)	本年 平年																																
半枯病 (発病株率)	本年 平年																																
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平年																																
萎縮病 (発病株率)	本年 平年																																
ミミキアザミ	本年 平年																																
ミミキアザミ (寄生葉率)	本年 平年		0.2	0.5	1.7	2.3	(2.0)	0.3	0.2	0.5	1.3	2.3	(2.4)	0.1	0.3	0.2	2.3	3.0	(3.0)	0.0	0.5	1.0	1.8	3.4	(4.0)	1.6	1.8	1.8	4.5	9.7	(22.0)		
ヒラアザミ (寄生花率)	本年 平年		0.2	0.3	0.9	1.4	(2.1)	0.2	0.3	0.3	1.3	2.1	(3.4)	0.2	0.4	0.3	0.8	1.7	(5.0)	0.5	0.6	0.5	1.8	3.3	(6.1)	1.0	0.5	1.6	4.8	7.9	(12.2)		
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平年				0.3	0.3	(0.1)				0.8	0.8	(0.1)				0.5	0.5	(0.1)				1.7	1.7	(1.7)			0.2	0.2	3.0	3.0	(0.5)	
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平年																1.5	1.5	(0.3)				0.7	0.7	(0.2)		0.2	0.2	2.8	3.2	(2.4)		
オンシツコナシ (寄生葉率)	本年 平年																0.0	0.0	(0.0)				3.4	3.4	(0.9)			0.2	0.6	4.5	6.0	(5.3)	
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平年																0.2	0.2	(0.3)									0.2	0.2	(0.3)			
シロイモシヨウ (被害株率)	本年 平年				0.6	0.6	(0.1)			0.2	0.7	0.8	(0.4)				1.5	1.5	(0.3)				1.6	1.6	(0.3)			1.0	1.0	(0.2)	1.5	1.5	(0.3)
カコナシ (寄生葉率)	本年 平年				9.0	9.0	(3.4)				6.0	6.0	(1.0)				6.0	6.0	(3.6)				8.6	8.6	(10.3)		1.5	3.0	7.5	12.0	(25.1)		
ハモグリバエ類 (被害葉率)	本年 平年				7.4	8.0	(7.1)		0.3	1.1	5.0	6.5	(8.0)		0.5	1.4	5.0	6.9	(11.1)	0.3	0.7	1.8	5.9	8.7	(14.9)	2.3	2.5	3.3	3.7	11.9	(45.0)		
ハダニ類 (寄生株率)	本年 平年				1.5	1.5	(0.9)				0.4	0.4	(0.5)										1.7	1.7	(0.1)			4.5	4.5	(1.8)			
オオカ (被害果率)	本年 平年				0.3	0.3	(0.1)																1.3	1.3	(0.9)			3.7	3.7	(1.5)			
ミカンキアザミ (寄生花率)	本年 平年																1.5	1.5	(0.8)				1.8	1.8	(0.7)	0.0	0.2	0.9	1.5	1.5	(0.8)		
コナカラムシ (寄生株率)	本年 平年		0.0		0.3	0.3	(0.4)		0.0		0.2	0.3	(0.5)	0.0		0.1	1.1	1.2	(1.4)				1.8	1.8	(0.7)	0.0	0.2	0.9	2.6	3.8	(3.9)		
ミカンキアザミ (寄生花率)	本年 平年																																
コナカラムシ (寄生株率)	本年 平年										1.5	1.5	(0.3)																1.5	1.5	(0.3)		
	本年 平年																0.2	0.2	(0.0)				0.3	0.3	(0.1)			0.7	0.7	(0.3)			

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

エ ナス (西 部)

作物名: ナス		作型: 促成		西部(幡多)		令和3園芸年度(2020~2021)		栽培面積		4 ha																																
病害虫名	年別	基	多	9月	中	少	計	平均	()	基	多	10月	中	少	計	平均	()	基	多	11月	中	少	計	平均	()	基	多	12月	中	少	計	平均	()	基	多	1月	中	少	計	平均	()	
灰色かび病 (発病果率)	本年 平年														0.0	0.0	(0.0)						0.0	0.0	(0.1)												0.0	0.0	(0.1)			
菌核病 (発病株率)	本年 平年																						0.0	0.0	(0.0)																	
モザイク病 (発病株率)	本年 平年																																									
うどんこ病 (発病度)	本年 平年														0.1	0.1	(0.1)						0.1	0.1	(0.1)										0.3	0.3	(0.3)					
青枯病 (発病株率)	本年 平年														0.6	0.6	(0.6)						0.3	0.3	(0.3)										0.5	0.5	(0.3)					
黒枯病 (発病度)	本年 平年														0.0	0.0	(0.0)						0.0	0.0	(0.0)										0.1	0.1	(0.1)					
すすかび病 (発病度)	本年 平年														2.0	2.0	(4.8)						1.0	2.0	3.0	(12.3)			1.0	2.0	3.0	(9.3)			1.0	1.0	(1.3)					
白絹病 (発病株率)	本年 平年														0.2	0.6	0.9	(2.1)					0.0	0.4	1.9	2.4	(8.3)			0.0	0.0	0.7	2.1	2.9	(11.4)			0.0	0.5	2.2	2.8	(10.4)
疫病 (発病株率)	本年 平年																						0.2	2.8	3.0	(15.6)			0.2	2.8	3.0	(15.6)			0.1	0.6	3.0	3.7	(29.9)			
半身萎凋病 (発病株率)	本年 平年														0.6	0.6	(1.6)						0.0	0.5	1.6	2.1	(7.4)			0.1	0.6	2.3	2.9	(13.2)								
水泡症(灰色かび) (発病果率)	本年 平年																																									
水泡症(黒枯病) (発病果率)	本年 平年														0.0	0.0	(0.0)						0.1	0.1	(0.3)										0.0	0.0	(0.1)					
軟腐病 (発病株率)	本年 平年																																									
半枯病 (発病株率)	本年 平年																																									
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平年																																									
萎縮病 (発病株率)	本年 平年																																									
ミミキアザミウマ (寄生葉率)	本年 平年					0.5	0.5	(0.3)						1.0	1.0	(0.3)							1.0	1.0	(0.3)																	
ヒラアザミウマ (寄生花率)	本年 平年														0.1	0.3	0.4	(17.8)					0.1	0.1	0.2	1.1	1.6	(14.1)			0.0	0.1	0.1	0.9	1.2	(5.2)			0.1	0.7	0.8	(2.6)
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平年														0.1	0.1	(0.1)						0.0	0.1	0.3	0.4	(2.1)									0.2	0.2	(0.3)				
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平年														0.2	0.2	(0.1)						0.0	0.0	(0.1)										0.0	0.0	(0.0)					
オンシツコナシ (寄生葉率)	本年 平年														2.0	2.0	(1.0)						0.4	0.4	(0.2)																	
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平年														0.4	0.4	(0.2)						0.0	0.0	(0.0)																	
シロイモシトウ (被害株率)	本年 平年														0.2	0.2	(0.0)						0.1	0.1	(0.0)										0.0	0.0	(0.0)					
カハコナシ (寄生葉率)	本年 平年					0.5	0.5	(7.0)						0.5	2.5	3.0	(13.3)					2.0	2.0	4.0	(22.3)					4.0	4.0	(10.0)			4.0	4.0	(8.3)					
ハモグリバエ類 (被害葉率)	本年 平年														0.0	0.1	0.4	(14.6)					0.2	2.0	2.2	(9.2)			0.0	0.1	1.7	1.8	(8.0)			1.1	1.1	(3.1)				
ハダニ類 (寄生株率)	本年 平年					0.5	0.5	(7.0)						0.5	0.5	(0.5)						0.4	0.4	(0.4)						0.3	0.3	(0.2)			0.1	0.1	(0.1)					
オオハコ (被害果率)	本年 平年														0.1	0.1	(0.1)						0.0	0.0	(0.1)																	
ミカンキアザミウマ (寄生花率)	本年 平年																																									
コナカハラムシ (寄生株率)	本年 平年																																									

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

冬春ピーマン・シシトウ（促成栽培）

（１）病 害

① うどんこ病


面積：並

程度：高

ア 発生概況

栽培期間を通して発生が見られ、10月は平年よりも少なかったが、11月以降は概ね平年並で推移した。発病程度は2月までは平年よりも低く推移したが、3～5月には成り疲れなどが要因で平年並～やや高となった。硫黄くん煙による防除を行っているほ場が多く、落葉などが見られるほ場は少なかった。

イ 発生経過



② 青枯病


面積：多

程度：低

ア 発生概況

県中央部の一部で2月に発生が見られたが、その後の発生の拡大はなく、既発ほ場での病勢の進展も見られなかった。

イ 発生経過



③ モザイク病


面積：少

程度：低

ア 発生概況

県中央部の一部で3月に発生が見られたが、その後発生面積の拡大はなく、既発ほ場での病勢の進展も見られなかった。

イ 発生経過



④ 斑点病


面積：並

程度：低

ア 発生概況

11月から発生が見られ始め、発生面積は4月に平年よりやや多かったのを除き、平年並以下であった。発病程度は栽培期間を通して平年並以下で推移した。

イ 発生経過



⑤ 黒枯病


面積：多

程度：やや高

ア 発生概況

栽培期間を通して発生が見られ、発生面積は、2月までは平年よりやや少～少で推移したが、3月には増加し、平年よりもやや多～多となった。発病程度は2月までは平年よりも低く推移したが、発生が増加した3月以降には平年並～やや高となった。2～3月の気温は平年よりも高く、暖房機の稼働時間が短かったことから施設内が多湿になり、多発したと考えられた。

イ 発生経過



(2) 虫害

① アブラムシ類


面積：並

程度：低

ア 発生概況

栽培期間を通して発生が見られ、発生面積は栽培期間を通して概ね平年並以下で推移した。寄生株率は、10月には平年よりも高かったが、11月以降は低下し、平年並～低で推移した。発生種は主にワタアブラムシで、ヒメカメノコテントウ等の天敵が導入されているものの、アブラムシ類の密度が高くなった場合はスポット的に薬剤防除が行われている。

イ 発生経過



② ハスモンヨトウ


面積：並

程度：やや低

ア 発生概況

例年同様、栽培初期の10月～11月にかけて発生が多く、その後は減少したものの、県中央部の一部では冬期～春先にかけても発生が続いた。被害株率は2月に平年よりもやや高かったが、全般的には平年よりもやや低く推移した。

イ 発生経過



③ ミナミキイロアザミウマ


面積：並

程度：やや低

ア 発生概況

栽培期間を通して発生が見られたが、発生面積は3月までは概ね平年並で推移した。4月には増加したものの、薬剤防除などにより5月には減少し、全般的には平年並となった。寄生花率は、栽培期間を通して平年並以下であった。例年は天敵（タイリクヒメハナカメムシ、タバコカスミカメ）の定着に伴い発生面積、寄生花率とも減少するが、一部ほ場ではチビトビカスミカメ類やコナカイガラムシ類などを対象とした薬剤防除により天敵類の密度が減少し、栽培後期に本虫の発生が増加した。

イ 発生経過




④ ヒラズハナアザミウマ 面積：やや多 程度：やや低

ア 発生概況

発生は栽培初期の10月に最も多く、その後も継続して発生が見られた。例年は栽培初期に発生が多く、天敵（タイリクヒメハナカメムシ、タバコカスミカメ）の定着に伴い発生面積、寄生花率とも減少する傾向であるが、チビトビカスミカメ類やコナカイガラムシ類などが発生したほ場では薬剤防除により天敵類が減少し、栽培中～後期に本虫の発生が増加した。発生程度は栽培後期の4～5月を除くと平年並以下であった。

イ 発生経過




⑤ タバココナジラミ 面積：並 程度：低

ア 発生概況

栽培初期から広範囲に発生が見られ、その後1月までは漸減傾向であった。2月以降は平年並～やや多で推移したが、寄生葉率は10%以下と低く、すす病の発生はほとんど見られなかった。多くのほ場で天敵（スワルスキーカブリダニ、タバコカスミカメ）を導入しており、栽培期間を通して成虫が散見される程度の発生であった。

イ 発生経過



⑥ ハダニ類


面積：並

程度：高

ア 発生概況

栽培期間を通して発生が見られ、発生面積は栽培初期の10月および厳寒期の12～2月には平年よりも少なかったが、その他では平年並であった。発生程度は平年よりも高かったものの、寄生株率は最多時の5月でも4%程度と低く、実害は見られなかった。

イ 発生経過



⑦ ホコリダニ類


面積：多

程度：低

ア 発生概況

栽培初期から発生が見られ、その後は漸減傾向で推移したものの概ね栽培期間を通して発生が見られた。しかしながら、発生程度は低く、実害もほとんど見られなかった。

イ 発生経過



(3) 最高発生面積・率

冬春（促成）栽培

栽培面積

89ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
うどんこ病	65.0	73.0	79.1	72.0	78.3
灰色かび病	3.5	3.9	0.0	1.6	1.8
菌核病	2.2	2.4	2.3	1.6	0.0
青枯病	5.4	6.1	11.0	0.0	5.5
疫病	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
モザイク病	0.2	0.2	0.0	6.9	17.9
斑点病	56.4	63.3	80.0	60.9	52.7
白斑病	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
軟腐病	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
白絹病	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
苗立枯病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
斑点細菌病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄化えそ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アブラムシ類	29.4	33.0	34.5	32.9	33.7
ハスモンヨトウ	30.1	33.8	21.8	17.5	12.7
ハダニ類	21.4	24.0	23.6	20.7	14.5
ミナミキイロアサミウマ	46.4	52.1	43.5	57.6	57.9
ホコリタニ類	6.6	7.4	8.6	3.3	3.5
センチュウ類	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
コガネムシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ヒラスハナアサミウマ	63.2	71.0	61.1	43.0	51.1
オオタバコガ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
シロイチモシヨトウ	0.0	0.0	16.1	5.6	1.2
タバココナシラミ	77.4	86.9	92.8	76.4	81.4
ハモクリハエ類	3.1	3.5	3.8	5.6	0.0
ミカンキイロアサミウマ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
コナカイラミ類	22.1	24.8	18.2	24.4	33.9
チャノキイロアサミウマ	5.8	6.5	10.8	6.7	5.9
モトシロアサミウマ	27.0	30.3	16.1	16.8	22.0
黒枯病	31.4	35.3	25.0	26.7	47.0
葉枯細菌病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

夏秋ピーマン・シシトウ（雨よけ・露地栽培）

(1) 最高発生面積・率

夏秋栽培

栽培面積

32ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
うどんこ病	7.1	22.2	19.1	15.1	22.7
灰色かび病	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0
菌核病	0.5	1.5	0.8	0.6	0.2
青枯病	0.6	1.9	1.9	4.2	9.0
疫病	0.1	0.5	0.2	1.3	1.3
モザイク病	0.1	0.2	0.8	0.7	0.2
斑点病	14.0	43.9	42.3	43.8	41.7
白斑病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
軟腐病	1.2	3.8	4.4	3.8	0.0
白絹病	0.6	1.8	3.3	5.8	7.1
苗立枯病	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
斑点細菌病	12.3	38.6	39.4	62.2	49.2
黄化えそ病	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
アブラムシ類	8.4	26.1	23.7	32.0	23.1
ハスモンヨトウ	8.8	27.6	31.1	27.3	26.9
ハダニ類	1.2	3.7	2.2	3.1	4.5
ミナミキイロアサミウマ	4.2	13.0	15.3	22.5	15.7
ホコリタニ類	0.0	0.1	0.8	1.8	0.1
センチュウ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
コガネムシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ヒラスハナアサミウマ	9.2	28.7	38.6	42.1	43.3
タバココガネ類	10.1	31.4	35.3	40.2	35.6
シロイチモシヨトウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバココナシラミ	5.2	16.2	11.4	9.5	4.2
ハモクリハエ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ミカンキイロアサミウマ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黒枯病	10.2	31.9	36.3	38.9	27.2
葉枯細菌病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

作物名:ピーマン		作型:促成		東部(安芸)		令和3園芸年度(2020～2021)		平均		3月		平均		4月		平均		5月		平均		栽培面積		25 ha	
病害虫名	年別	基	多	中	少	計	()	基	多	中	少	計	()	基	多	中	少	計	()	基	多	中	少	計	()
灰色かび病 (発病株率)	本年 平成																								
菌核病 (発病株率)	本年 平成																								
モザイク病 (発病株率)	本年 平成																								
うどんこ病 (発病度)	本年 平成																								
青枯病 (発病株率)	本年 平成																								
炭そ病 (発病株率)	本年 平成																								
白絹病 (発病株率)	本年 平成																								
疫病 (発病株率)	本年 平成																								
軟腐病 (発病株率)	本年 平成																								
白斑病 (発病果率)	本年 平成																								
斑点病 (発病度)	本年 平成																								
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平成																								
立枯病 (発病株率)	本年 平成																								
ヒス'ハナアサミマ (寄生花率)	本年 平成																								
ミミキイロアサミマ (寄生花率)	本年 平成																								
チャキイロアサミマ (寄生花率)	本年 平成																								
モシロアサミマ (寄生花率)	本年 平成																								
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平成																								
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平成																								
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平成																								
シロイモシヨトウ (被害株率)	本年 平成																								
タバコナシタ (寄生葉率)	本年 平成																								
ハモグリバエ類 (被害葉率)	本年 平成																								
ハダニ類 (寄生株率)	本年 平成																								
コカ'カラムシ類 (寄生株率)	本年 平成																								
オオカ'カ (被害果率)	本年 平成																								
ミカンキイロアサミマ (寄生花率)	本年 平成																								
センチュウ類 (寄生株率)	本年 平成																								
葉枯細菌病 (発病度)	本年 平成																								
斑点細菌病 (発病度)	本年 平成																								
黒枯病 (発病度)	本年 平成																								
葉こぶ症 (発症度)	本年 平成																								

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

ウ ピーマン・シシトウ（中央部）

作物名:ピーマン・シシトウ 作型:促成		中央部(防除所)										令和3園芸年度(2020～2021)										栽培面積 54 ha										
病害虫名	年別	10月					平均 ()	11月					平均 ()	12月					平均 ()	1月					平均 ()	2月					平均 ()	
		基	多	中	少	計		基	多	中	少	計		基	多	中	少	計		基	多	中	少	計		基	多	中	少	計		
灰色かび病 (発病株率)	本年 平年																															
菌核病 (発病株率)	本年 平年																0.2	0.2	(0.0)					0.0	0.0							
モザイク病 (発病株率)	本年 平年				1.9	1.9	(0.1)				2.9	2.9	(0.1)			0.5	3.1	3.6	(0.2)		0.0	0.8	3.4	4.2	(0.4)							
うどんこ病 (発病度)	本年 平年				5.4	5.4	(0.1)				43.2	43.2	(2.5)				37.8	37.8	(4.8)			5.4	37.8	43.2	(8.7)							
青枯病 (発病株率)	本年 平年			1.0	21.1	22.1	(2.7)		0.5	5.4	35.2	41.1	(7.3)		1.5	6.4	34.5	42.4	(10.2)	0.4	3.3	2.9	33.9	40.6	(9.3)							
炭そ病 (発病株率)	本年 平年										1.0	1.0	(0.0)				1.1	1.1	(0.0)					1.2	1.2	(0.0)						
白絹病 (発病株率)	本年 平年										0.3	0.3	(0.0)																			
疫病 (発病株率)	本年 平年																															
軟腐病 (発病株率)	本年 平年																															
白斑病 (発病果率)	本年 平年				0.1	0.1	(0.0)																									
斑点病 (発病度)	本年 平年				2.0	2.0	(0.0)				16.2	16.2	(0.3)				27.0	27.0	(1.0)				27.0	27.0	(1.7)		0.5	30.4	30.9	(2.1)		
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平年										20.5	20.5	(0.5)				28.6	28.6	(1.7)													
立枯病 (発病株率)	本年 平年																															
ヒス・ハナアサミウ (寄生花率)	本年 平年	5.4 4.3		5.4 3.4	27.0 17.2	37.8 28.3	(9.6) (11.5)	5.4 6.3	10.8 4.0	5.4 6.5	10.8 12.3	32.4 29.1	(20.4) (16.5)	5.4 2.7	5.4 1.9		16.2 15.2	27.0 27.1	(13.8) (9.1)		5.4 2.8		21.6 12.5	27.0 22.3	(4.1) (10.0)							
ミミキイロアサミウ (寄生花率)	本年 平年			5.4 0.3	27.0 20.1	32.4 23.4	(3.2) (2.4)			10.8 5.1	21.6 18.0	32.4 23.9	(4.2) (4.2)			7.3	32.4 14.9	32.4 19.3	(1.1) (2.7)			3.0	21.6 17.7	21.6 21.0	(1.0) (2.2)							
チャキイロアサミウ (寄生株率)	本年 平年				2.7 2.6	2.7 2.6	(0.2) (0.2)				2.7 3.0	2.7 3.7	(0.1) (0.3)				5.4 1.6	5.4 2.3	(0.6) (0.2)				2.7 1.3	2.7 1.3	(0.1) (0.0)							
モシロアサミウ (寄生株率)	本年 平年				7.1	7.1	(0.5)			1.4	8.4	9.9	(1.3)	0.7	1.4	0.7	5.4 3.5	5.4 6.3	(0.6) (2.1)			0.7	5.4 7.7	5.4 8.4	(0.4) (0.9)							
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平年	5.4 0.3		1.4	13.2	14.8	(3.2)	1.0		4.4	10.8	16.2	(8.4)				5.4 2.5	16.2 14.4	(4.4) (3.5)		0.5	1.0	10.8 12.9	10.8 14.4	(0.8) (3.2)							
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平年		0.5	0.5	21.6 17.5	21.6 18.5	(1.2) (2.9)				16.2 7.9	16.2 7.9	(1.8) (1.1)			0.5	5.4 2.7	5.4 4.0	(0.6) (1.4)			0.3	5.4 4.0	5.4 4.2	(0.6) (0.6)							
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平年				5.4 1.4	5.4 1.4	(0.2) (0.2)				0.5	0.5	(0.2)				0.5	0.5	(0.0)													
シロイモシトウ (被害株率)	本年 平年				1.0 1.0	1.0 1.0	(0.0) (0.0)				1.5 1.5	1.5 1.5	(0.1) (0.1)											0.1	0.1	(0.0)						
カハコナシ (寄生葉率)	本年 平年			10.8 2.8	43.2 30.7	54.0 47.8	(15.3) (20.1)		10.8 0.8	5.4 3.9	32.4 32.4	48.6 44.7	(20.5) (18.1)			5.4 7.0	27.0 31.6	32.4 43.1	(9.8) (15.3)			5.4 6.9	21.6 23.7	27.0 36.1	(8.9) (16.6)							
ハモグリバエ類 (被害葉率)	本年 平年				0.8 1.0	0.8 1.0	(0.0) (0.0)				1.7 5.4	1.7 5.4	(0.1) (0.2)			0.2	1.3 1.5	1.5 1.5	(0.4) (0.4)			0.3	0.8 5.4	1.0 5.4	(0.6) (0.2)							
ハダニ類 (寄生株率)	本年 平年				5.6 4.2	5.6 4.2	(0.4) (0.4)			0.9	4.4 8.1	5.3 8.6	(0.6) (0.8)			1.0	9.4 8.3	10.4 8.8	(1.1) (1.4)		0.2	1.6 2.3	4.4 10.4	6.3 13.8	(1.3) (2.7)							
コナカハラムシ類 (寄生株率)	本年 平年				5.4 4.2	5.4 4.2	(0.2) (0.4)				10.8 8.1	10.8 8.6	(0.4) (0.8)			0.5	10.8 8.3	10.8 8.8	(1.0) (1.4)		0.5	0.6 2.3	10.8 10.4	10.8 13.8	(0.8) (2.7)							
オオハハカ (被害果率)	本年 平年				0.5 0.5	0.5 0.5	(0.0) (0.0)																									
ミカンキイロアサミウ (寄生花率)	本年 平年										0.2	0.2	(0.0)																			
センチュウ類 (寄生株率)	本年 平年																															
葉枯細菌病 (発病度)	本年 平年																															
斑点細菌病 (発病度)	本年 平年																															
黒枯病 (発病度)	本年 平年				6.7	6.7	(0.3)			0.4	8.3	8.7	(0.5)			0.5	9.5	9.9	(0.4)				5.6	5.6	(0.2)							
葉こぶ症 (発病度)	本年 平年																							0.5	0.5	(0.1)						

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

エ ピーマン・シシトウ (中西部)

作物名:ピーマン・シシトウ 作型:促成		中西部(須崎)					令和3園芸年度(2020～2021)					栽培面積					7 ha														
病害虫名	年別	10月					平均 ()	11月					平均 ()	12月					平均 ()	1月					平均 ()						
		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計							
灰色かび病 (発病株率)	本年 平年										0.1 0.1	(0.0)																			
菌核病 (発病株率)	本年 平年										1.2 0.1	1.2 (0.2)				0.1		0.1 (0.1)				0.1	0.2	0.3 (0.3)							
モザイク病 (発病株率)	本年 平年				0.4 0.4	(0.1)					0.5 0.5	(0.1)						0.5 0.5	(0.1)				0.5 0.5	(0.1)							
うどんこ病 (発病度)	本年 平年										4.7 2.8	4.7 (1.5)					4.7 3.1	4.7 (3.0)					3.5 3.7	3.5 (3.5)							
青枯病 (発病株率)	本年 平年			0.3	0.8	1.0 (1.5)			0.1	0.4	2.8 3.3	(4.4)		0.1	0.2	0.4	3.1 3.7	(6.1)			0.2	0.3	3.7 4.3	(5.2)							
炭そ病 (発病株率)	本年 平年										0.1 0.1	(0.0)					0.1 0.1	(0.0)					0.2 0.2	(0.1)							
白絹病 (発病株率)	本年 平年																														
疫病 (発病株率)	本年 平年																														
軟腐病 (発病株率)	本年 平年																0.4 0.4	(0.1)					0.2 0.2	(0.1)							
白斑病 (発病果率)	本年 平年																														
斑点病 (発病度)	本年 平年				0.6	0.6 (0.3)			0.1	3.0 3.2	(2.4)			0.1	0.7	3.2 3.9	(5.4)		0.1	0.1	0.5	3.1 3.8	(5.3)								
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平年																														
立枯病 (発病株率)	本年 平年																														
ヒス'ハナアサミウ (寄生花率)	本年 平年				3.5 1.0	3.5 2.9 (12.7)		1.2 0.3	2.3 1.0	3.5 3.2 (20.1)												1.2 1.4	1.2 2.6 (8.5)								
ミナキイロアサミウ (寄生花率)	本年 平年				1.2 1.4	1.2 2.5 (4.7)			0.0 0.4	1.2 2.1	1.2 2.5 (2.5)					0.4	2.5 2.8 (2.3)			0.2	0.9	1.2 2.5	1.2 3.7 (4.6)								
チャキイロアサミウ (寄生株率)	本年 平年																														
トシ'ロアサミウ (寄生株率)	本年 平年																														
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平年			1.2	1.2	2.3 (4.7)					2.3 2.3	(0.7)																			
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平年	0.1			0.6	0.7 (1.9)	0.0	0.1	0.2	1.1 1.5	(4.5)				0.1	1.0 1.1	(1.3)					1.4 1.4	(1.3)								
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平年		0.1	0.2	0.8	1.0 (2.5)		0.1	0.5	0.6 (1.0)						0.4 0.4	(0.5)														
シロイモシ'トウ (被害株率)	本年 平年		0.1		0.3	0.4 (0.4)				0.5 0.5	(0.2)				0.1	0.3 0.5	(0.2)					0.1 0.1	(0.1)								
カ'コナシ'ミ (寄生葉率)	本年 平年				4.7 3.1	4.7 4.1 (9.5)			0.3	0.3	4.7 2.6	(1.8) (6.3)				2.3 1.7	2.3 (4.2)				0.3	2.3 1.5	2.3 1.9 (3.7)								
ハモグリバエ類 (被害葉率)	本年 平年				0.4	0.4 (0.1)																									
ハダニ類 (寄生株率)	本年 平年				0.1	0.1 (0.3)					1.2 0.2	1.2 (0.3) (0.1)			1.2		1.2 0.3 (2.3) (0.1)					0.6 0.2	0.6 0.2 (0.1)								
コナ'カ'ラムシ類 (寄生株率)	本年 平年															1.2 0.1	1.2 0.1 (0.3) (0.0)					1.2 1.2	1.2 (0.3) (0.0)								
オオ'ハ'カ (被害果率)	本年 平年																														
ミナキイロアサミウ (寄生花率)	本年 平年																														
センチュウ類 (寄生株率)	本年 平年																						0.1 0.1	(0.0)							
葉枯細菌病 (発病度)	本年 平年																														
斑点細菌病 (発病度)	本年 平年																														
黒枯病 (発病度)	本年 平年				0.6	0.6 (0.2)					1.2 3.7	1.2 (0.4) (1.5)				1.2 2.8	1.2 (0.1) (1.2)						2.9 2.9	(1.5)							
葉こぶ症 (発症度)	本年 平年			0.1	0.4	0.5 (0.4)			0.7	0.9	1.6 (1.8)			0.2	0.5	0.6 1.4	(2.2)			0.2	0.8	0.7 1.8	(2.2)								

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

作物名:ピーマン・シシトウ 作型:促成		中西部(須崎)					令和3園芸年度(2020~2021)															栽培面積					7 ha					
病害虫名	年別	2月					平均 ()	3月					平均 ()	4月					平均 ()	5月					平均 ()	最高発生面積					平均 ()	
		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		甚	多	中	少	計		
灰色かび病 (発病株率)	本年 平成			0.1	0.1	0.2	(0.1)				0.1	0.1	(0.0)			3.5 0.3	3.5 0.3	(1.2) (0.1)				0.5	0.5	(0.1)				3.5 0.5	3.5 0.5	(1.2) (0.1)		
菌核病 (発病株率)	本年 平成			0.1	0.2	0.3	(0.2)			0.1	0.6	0.7	(0.4)			0.1	0.1	0.2	(0.3)				0.4	0.4	(0.1)			0.1	1.2 0.6	1.2 0.7	(0.2) (0.4)	
モザイク病 (発病株率)	本年 平成				0.5	0.5	(0.1)				0.7	0.7	(0.1)	0.1			0.7	0.7	(0.8)	0.1			0.7	0.7	(0.8)	0.1			0.7	0.7	(0.8)	
うどんこ病 (発病度)	本年 平成				6.4	6.4	(4.5)			1.2	3.5	4.7	(5.0)			2.3	2.3	4.7	(11.7)			2.3	4.7	7.0	(12.6)			2.3	4.7	7.0	(12.6)	
	平成	0.1	0.1	0.3	3.9	4.5	(5.8)	0.1	0.2	0.7	2.8	3.7	(7.1)	0.1	0.1	0.5	3.2	3.9	(6.7)	0.1	0.4	0.5	3.4	4.4	(10.3)	0.1	0.1	0.3	3.9	4.5	(5.8)	
青枯病 (発病株率)	本年 平成				0.2	0.2	(0.1)				0.3	0.3	(0.1)				0.4	0.4	(0.1)			0.1	0.3	0.5	(0.3)			0.1	0.3	0.5	(0.3)	
炭そ病 (発病株率)	本年 平成																															
白絹病 (発病株率)	本年 平成																															
疫病 (発病株率)	本年 平成																															
軟腐病 (発病株率)	本年 平成				0.1	0.1	(0.0)										0.1	0.1	(0.0)				0.2	0.2	(0.1)				0.4	0.4	(0.1)	
白斑病 (発病果率)	本年 平成																															
斑点病 (発病度)	本年 平成				3.5	3.5	(1.0)				4.7	4.7	(1.6)			1.2	3.5	4.7	(5.9)			1.2	4.7	5.8	(9.9)			1.2	4.7	5.8	(9.9)	
	平成		0.2	0.8	3.8	4.8	(6.4)	0.1	0.1	0.7	2.9	3.7	(6.6)	0.3	0.3	0.7	4.3	5.7	(11.4)	0.3	0.4	0.9	3.6	5.3	(12.7)	0.3	0.3	0.7	4.3	5.7	(11.4)	
黄化えそ病 (発病株率)	本年 平成																															
立枯病 (発病株率)	本年 平成																															
ヒス/ハナアサミウマ (寄生花率)	本年 平成																1.2	1.2	(0.3)				1.2	2.3	3.5	(4.0)			1.2	2.3	3.5	(7.0)
	平成	0.1	0.4	0.6	1.5	2.6	(6.4)	0.4	0.1	0.4	1.3	2.2	(9.0)	0.1	0.2	0.8	1.5	2.6	(5.2)	0.1		0.6	1.7	2.4	(3.5)	1.2	0.3	0.6	1.0	3.2	(20.1)	
ミナキイロアサミウマ (寄生花率)	本年 平成																1.2	1.2	(1.7)				2.3	2.3	(0.5)				2.3	2.3	(0.5)	
	平成			0.1	2.0	2.1	(1.3)			0.1	2.1	2.2	(1.6)		0.2	0.4	2.3	2.8	(3.2)		0.3	0.7	1.9	2.8	(4.4)		0.2	0.9	2.5	3.7	(4.6)	
チャノキイロアサミウマ (寄生株率)	本年 平成																															
モシロアサミウマ (寄生株率)	本年 平成																															
アブラムシ類 (寄生株率)	本年 平成				1.2	1.2	(1.4)			0.1	1.0	1.2	(1.8)				1.2	1.2	(0.7)				4.7	4.7	(2.7)				4.7	4.7	(2.7)	
	平成																1.4	1.4	(2.1)			0.1	1.3	1.4	(1.4)	0.0	0.1	0.2	1.1	1.5	(4.5)	
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年 平成				0.1	0.1	(0.1)				0.1	0.1	(0.0)				0.1	0.1	(0.0)				0.1	0.1	0.2	(0.7)		0.1	0.2	0.8	1.0	(2.5)
	平成			1.2	1.2	2.3	(2.0)										1.2	1.2	(0.3)										3.5	3.5	(1.7)	
ホコリダニ類 (被害株率)	本年 平成				0.1	0.1	(0.1)										0.2	0.2	(0.0)										0.1	0.3	0.5	(0.2)
シロイモシトウ (被害株率)	本年 平成																															
	平成																													0.1	0.1	(0.3)
タバコナシタ (寄生葉率)	本年 平成			3.5	3.5	(5.2)	1.2				1.2	(14.8)				1.2	1.2	(0.3)				3.5	3.5	(6.3)				4.7	4.7	(1.8)		
	平成	0.5	1.4	1.9	(3.9)			0.1	0.1	1.9	2.1	(3.8)		0.2	0.3	2.2	2.7	(6.3)				0.5	1.4	1.9	(4.4)		0.4	0.6	3.1	4.1	(9.5)	
ハモグリバエ類 (被害葉率)	本年 平成				0.1	0.1	(0.2)				0.1	0.1	(0.0)				0.1	0.1	(0.0)										0.4	0.4	(0.1)	
	平成			0.6	0.6	(0.2)											1.2	1.2	(0.3)								1.2		1.2	1.2	(2.3)	
ハダニ類 (寄生株率)	本年 平成										0.2	0.2	(0.1)				0.3	0.3	(0.2)				0.3	0.3	(0.2)				0.3	0.3	(0.2)	
	平成																															
コカ/カラムシ類 (寄生株率)	本年 平成																0.4	0.4	(0.3)				1.2	1.2	(1.3)				1.2	1.2	(1.3)	
	平成																					0.1	0.1	0.1	(0.2)				0.4	0.4	(0.3)	
オオタバコ (被害果率)	本年 平成										0.1	0.1	(0.0)																			
	平成																															
ミナキイロアサミウマ (寄生花率)	本年 平成																												0.1	0.1	(0.0)	
	平成																															
センチュウ類 (寄生株率)	本年 平成																															
	平成																															
葉枯細菌病 (発病度)	本年 平成																															
	平成																															
斑点細菌病 (発病度)	本年 平成																															
	平成																															
黒枯病 (発病度)	本年 平成				2.5	2.5	(1.0)			0.1	4.7	4.7	(1.1)			2.3	2.3	(3.3)				3.5	3.5	(5.0)				4.7	4.7	(1.1)		
	平成										1.8	1.9	(1.1)			3.0	3.2	(2.4)		0.2	0.4	2.3	2.9	(5.0)				3.7	3.7	(1.5)		
葉こぶ症 (発症度)	本年 平成			0.5	0.6	1.1	(0.9)			0.5	0.5	1.0	(1.1)		0.1	0.4	0.6	1.1	(1.6)			0.6	0.8	1.4	(1.5)		0.2	0.8	0.7	1.8	(2.2)	

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

冬春トマト（促成栽培）

（１）病 害

① 灰色かび病


面積：並

程度：高

ア 発生概況

3～4月に発生が見られた。発生面積はほぼ平年並であったが、茎での発病が見られるほ場があるなど、発病程度は高かった。2～3月の気温が平年よりも高く、暖房機の稼働時間が短くなったために施設内が多湿条件になったことが、発生が急増した原因と考えられる。

イ 発生経過



② 青枯病


面積：少

程度：低

ア 発生概況

作期を通して発生は見られなかった。

イ 発生経過



③ 葉かび病


面積：多

程度：高

ア 発生概況

栽培初期から発病が見られ、発生面積は平年よりも多かった。冬期には一旦発生が少なくなったが、気温の上昇とともに発生面積は増加し、発病程度も高くなった。全般的には、発生面積は平年よりも多く、発病程度も高かった。

イ 発生経過



④ すすかび病


面積：多

程度：低

ア 発生概況

栽培初期の10月から発生が見られ、11月の発生面積は平年よりも多く、発病程度も高かった。冬期の1月には一旦発生が少なくなったが、2月以降は再び増加した。全般的には発生面積は平年よりも多かったが、発病程度は低かった。

イ 発生経過



⑤ 黄化葉巻病


面積：少

程度：低

ア 発生概況

栽培初期の10月にわずかに発生が見られ、12月には既発ほ場でやや増加したが、全般的には発生面積は平年よりも少なく、発病程度も低かった。媒介虫であるタバコナジラミの侵入防止対策として、施設開口部への細かな目合いの防虫ネットの展張および薬剤防除の徹底により発生が抑えられているものと考えられる。

イ 発生経過



(2) 虫 害

① ハスモンヨトウ


面積：多

程度：高

ア 発生概況

例年と同様に栽培初期の10月から発生が見られ、翌年の1月まで発生が継続した。発生面積は平年よりも多く、発生程度も高かった。秋期における野外での密度が高かったことに加え、薬剤感受性の低下した個体群が発生しているためと思われる。

イ 発生経過



② タバココナジラミ


面積：多

程度：高

ア 発生概況

栽培初期の10月から発生が見られたが、発生面積は平年並であった。12月には発生がほとんど見られなくなったが、1～2月には発生が増加し、3～4月には寄生葉率も上昇した。全般的には発生面積は平年よりも多く、発生程度も高かった。

イ 発生経過



(3) 最高発生面積・率

病害虫名	栽培面積		29ha (中央部)		
	R3	R2	H31	H30	
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
灰色かび病	11.3	39.1	0.0	12.5	44.4
疫病	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0
菌核病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
青枯病	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
萎凋病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
根腐萎凋病	3.8	13.0	0.0	0.0	0.0
葉かび病	18.9	65.1	66.6	44.4	44.4
モザイク病	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0
輪紋病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
かいよう病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白絹病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
褐色輪紋病	3.8	13.0	0.0	12.5	0.0
軟腐病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アブラムシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハスモンヨトウ	7.6	26.1	11.1	11.1	0.0
オンシツコナジラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
センチュウ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
シロイチモンヨトウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバココナジラミ	15.1	52.1	33.4	11.1	11.1
タバコカビ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハモグリバエ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
トマトサビダニ	1.8	6.2	11.1	5.9	0.0
ホリタニ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うどんこ病	7.6	26.1	11.1	22.2	11.1
黄化えそ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄化葉巻病	1.5	5.2	0.0	25.3	4.1
すすかび病	15.1	52.1	22.3	50.0	55.6

夏秋トマト（雨よけ・露地栽培）

（１）最高発生面積・率

夏秋（雨よけ・露地）栽培 栽培面積 6ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
灰色かび病	0.7	11.7	8.6	20.0	16.5
疫病	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0
菌核病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
青枯病	0.0	0.0	6.0	0.0	0.4
萎凋病	0.1	1.0	0.0	1.0	0.4
根腐萎凋病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
葉かび病	2.5	41.7	48.0	43.5	43.5
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
輪紋病	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
かいよう病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
苗立枯病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
白絹病	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
褐色輪紋病	0.8	13.3	4.0	0.7	0.0
軟腐病	0.0	0.0	0.4	0.0	1.1
アブラムシ類	0.4	6.7	4.0	3.5	3.5
ハスモンヨトウ	0.5	8.3	12.4	3.3	3.5
オンシツコナジラミ	1.9	31.7	16.0	33.0	26.3
センチュウ類	0.0	0.3	2.0	47.3	53.8
シロイチモシヨトウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバココナジラミ	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0
タバコカビ類	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
ハモグリバエ類	0.2	2.8	6.0	7.2	31.0
ホリタビ類	0.0	0.0	0.0	8.3	10.0
うどんこ病	0.2	3.3	8.0	13.5	10.0
黄化えそ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄化葉巻病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
すすかび病	1.9	31.7	26.0	26.5	55.5

トマト巡回調査結果

ア トマト（中央部）

作物名: トマト		作型: 促成		中央部(防除所)		令和3園芸年度(2020～2021)										栽培面積					34 ha				
病害虫名	年別	10月					11月					12月					1月					平均 ()			
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計				
モザイク病 (発病株率)	本年																								
	平年														0.4	0.4	(0.0)				0.4	0.4	(0.0)		
黄化えそ病 (発病株率)	本年																								
	平年																								
青枯病 (発病株率)	本年																								
	平年				0.5	0.5	(0.0)				0.7	0.7	(0.0)			0.7	0.7	(0.0)			0.7	0.7	(0.0)		
うどんこ病 (発病度)	本年																								
	平年									2.6	2.6	(0.1)			4.2	4.2	(0.2)				3.8	3.8	(0.3)		
軟腐病 (発病株率)	本年																								
	平年																								
疫病 (発病度)	本年																								
	平年														1.0	1.0	(0.0)				0.4	0.4	(0.0)		
かいよう病 (発病株率)	本年																								
	平年																								
灰色かび病 (発病果率)	本年																								
	平年									0.0	0.0				0.6	0.6	(0.0)				2.7	2.7	(0.1)		
菌核病 (発病果率)	本年																								
	平年														0.1	0.1					0.5	0.5	(0.0)		
斑点病 (発病度)	本年																								
	平年																								
輪紋病 (発病度)	本年																								
	平年																								
褐色輪紋病 (発病度)	本年															3.8	3.8	(0.1)							
	平年														0.8	0.8	(0.1)				1.2	1.2	(0.1)		
葉かび病 (発病度)	本年				7.6	7.6	(0.2)				3.8	3.8	(0.1)								7.6	7.6	(1.5)		
	平年			0.4	0.4	0.8	(0.5)	0.4			2.3	2.6	(1.2)		0.2	0.2	1.9	2.3	(0.9)		0.4	1.9	3.8	6.1	(3.2)
白絹病 (発病株率)	本年																								
	平年																								
萎凋病 (発病株率)	本年																								
	平年				0.5	0.5	(0.0)				0.5	0.5	(0.0)			0.5	0.5	(0.1)			0.0	0.5	0.5	(0.1)	
根腐萎凋病 (発病株率)	本年																								
	平年																								
アブラムシ類 (寄生株率)	本年																								
	平年																								
ハモグリバエ類 (被害葉率)	本年																								
	平年				0.4	0.4	(0.0)																		
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年				7.6	7.6	(0.4)				3.8	3.8	(0.2)			7.6	7.6	(1.6)			1.8	1.8	(0.2)		
	平年				3.6	3.6	(0.4)				0.9	0.9	(0.0)			0.2	0.2	(0.0)			0.5	0.5	(0.0)		
シロイチモジヨトウ (被害株率)	本年																								
	平年																								
トマトサビダニ (被害株率)	本年				0.7	0.7	(0.0)														1.8	1.8	(0.1)		
	平年				0.0	0.0					0.7	0.7	(0.1)			0.5	0.5	(0.1)			0.4	0.4	(0.1)		
ホコリダニ類 (被害株率)	本年																								
	平年																								
ハダニ類 (寄生株率)	本年																								
	平年																								
オンシツコナジラミ (寄生葉率)	本年																								
	平年															0.0	0.0								
タバコナジラミ (寄生葉率)	本年				3.8	3.8	(0.2)				3.8	3.8	(0.1)								7.6	7.6	(0.3)		
	平年				3.7	3.7	(0.4)				4.2	4.2	(0.3)			4.0	4.0	(0.3)			3.3	3.3	(0.3)		
タバコ (被害果率)	本年																								
	平年																								
オオタバコ (被害果率)	本年																								
	平年																								
黄化葉巻病 (発病株率)	本年				1.5	1.5	(0.0)				1.5	1.5	(0.0)			0.3	1.2	1.5	(0.1)		0.3	1.2	1.5	(0.1)	
	平年				3.8	3.8	(0.1)			0.3	6.8	7.2	(0.4)			0.3	8.5	8.9	(0.5)		0.7	8.6	9.3	(0.7)	
すすかび病 (発病度)	本年				3.8	3.8	(0.9)				11.3	11.3	(2.8)			15.1	15.1	(0.7)			7.6	7.6	(0.4)		
	平年				7.4	7.4	(0.8)				7.2	7.2	(0.8)			0.4	10.4	10.8	(1.3)		10.0	10.0	(1.2)		

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

作物名: トマト		作型: 促成		中央部(防除所)		令和3園芸年度(2020～2021)										栽培面積					34 ha							
病害虫名	年別	2月					3月					4月					最高発生面積					平均						
		甚	多	中	少	計	平均	甚	多	中	少	計	平均	甚	多	中	少	計	平均	甚	多	中	少	計	平均			
モザイク病 (発病株率)	本年																											
	平年				0.4	0.4	(0.0)				0.4	0.4	(0.0)				0.4	0.4	(0.0)				0.4	0.4	(0.0)			
黄化えそ病 (発病株率)	本年																											
	平年																											
青枯病 (発病株率)	本年																											
	平年				0.7	0.7	(0.0)				0.7	0.7	(0.0)				0.4	0.4	0.7	(0.1)			0.4	0.4	0.7	(0.1)		
うどんこ病 (発病度)	本年				7.6	7.6	(0.4)				3.8	3.8	(0.2)				7.6	7.6	(1.2)				7.6	7.6	(1.2)			
	平年				4.0	4.0	(0.4)				0.8	1.9	2.6	(0.8)	0.4		0.4	2.8	3.6	(1.6)				4.2	4.2	(0.2)		
軟腐病 (発病株率)	本年																											
	平年																											
疫病 (発病度)	本年																											
	平年				0.1	0.1					0.4	1.1	1.5	(0.5)				0.4	0.4	(0.0)				0.4	1.1	1.5	(0.5)	
かいよう病 (発病株率)	本年																											
	平年																											
灰色かび病 (発病果率)	本年										3.8	7.6	11.3	(1.2)				7.6	7.6	(0.2)				3.8	7.6	11.3	(1.2)	
	平年				0.7	6.0	6.7	(0.5)			0.7	9.1	9.9	(0.8)				9.9	9.9	(0.5)				0.7	9.1	9.9	(0.8)	
菌核病 (発病果率)	本年																											
	平年																							0.5	0.5	(0.0)		
斑点病 (発病度)	本年																											
	平年										0.4	0.4	(0.0)											0.4	0.4	(0.0)		
輪紋病 (発病度)	本年																											
	平年																											
褐色輪紋病 (発病度)	本年																							3.8	3.8	(0.1)		
	平年				0.4	0.4	(0.0)				0.8	0.8	(0.1)				0.4	0.4	(0.0)				1.2	1.2	(0.1)			
葉かび病 (発病度)	本年				11.3	11.3	(3.0)				3.8	11.3	15.1	(5.2)			3.8	7.6	7.6	18.9	(11.4)			3.8	7.6	7.6	18.9	(11.4)
	平年				2.8	3.6	6.4	(3.3)			1.9	6.4	8.3	(2.1)			0.4	2.6	4.6	7.6	(3.9)			1.9	6.4	8.3	(2.1)	
白絹病 (発病株率)	本年																											
	平年																											
萎凋病 (発病株率)	本年																											
	平年				0.0	0.5	0.5	(0.1)			0.0	0.5	0.6	(0.1)			0.0	0.6	0.6	(0.2)				0.0	0.6	0.6	(0.2)	
根腐萎凋病 (発病株率)	本年																											
	平年																							3.8	3.8	(0.1)		
アブラムシ類 (寄生株率)	本年																											
	平年																											
ハモグリバエ類 (被害葉率)	本年																											
	平年																							0.4	0.4	(0.0)		
ハスモンヨトウ (被害株率)	本年																							7.6	7.6	(1.6)		
	平年				0.4	0.4	(0.0)				0.0	0.0												3.6	3.6	(0.4)		
シロイチモジヨトウ (被害株率)	本年																											
	平年																											
トマトサビダニ (被害株率)	本年																							1.8	1.8	(0.1)		
	平年				0.8	0.8	(0.1)				0.5	0.5	(0.1)				1.8	1.8	(0.2)				1.8	1.8	(0.2)			
ホコリダニ類 (被害株率)	本年																											
	平年																							0.0	0.0			
ハダニ類 (寄生株率)	本年																											
	平年																											
オンシツコナジラミ (寄生株率)	本年																											
	平年				0.0	0.0					0.0	0.0												0.0	0.0			
タバココナジラミ (寄生株率)	本年				15.1	15.1	(0.6)				7.6	7.6	(1.3)				15.1	15.1	(3.6)				15.1	15.1	(3.6)			
	平年				0.3	1.9	2.2	(0.3)			4.6	4.6	(1.0)				0.4	0.4	6.2	7.0	(2.2)			0.4	0.4	6.2	7.0	(2.2)
タバコカ (被害果率)	本年																											
	平年																											
オオタバコカ (被害果率)	本年																											
	平年																											
黄化葉巻病 (発病株率)	本年				0.3	1.2	1.5	(0.1)			0.3	1.2	1.5	(0.1)			0.3	1.2	1.5	(0.1)				0.3	1.2	1.5	(0.1)	
	平年				1.0	9.6	10.6	(0.8)			1.0	10.2	11.2	(0.8)			1.4	10.5	11.9	(1.0)				1.4	10.5	11.9	(1.0)	
すすかび病 (発病度)	本年				15.1	15.1	(0.6)				11.3	11.3	(0.7)				7.6	7.6	(0.8)				15.1	15.1	(0.7)			
	平年				9.1	9.1	(1.1)				6.4	6.4	(0.6)				5.9	5.9	(0.8)				0.4	10.4	10.8	(1.3)		

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R元農業振興センター調べ。

ネギ

(1) 最高発生面積・率

① ネギ（施設栽培）

栽培面積：133ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
黒斑病	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
さび病	3.4	2.6	1.0	1.0	1.0
白色疫病	5.7	4.3	5.0	5.0	2.5
軟腐病	3.4	2.6	3.0	3.0	3.0
べと病	3.4	2.6	3.0	3.0	3.0
えそ条斑病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黒穂病	1.1	0.9	0.0	0.0	0.0
萎凋病	17.1	12.9	15.0	10.0	5.0
ハモグリハエ類	28.6	21.4	25.0	25.0	25.0
アザミウマ類	108.5	81.4	95.0	95.0	95.0
ハスモンヨトウ	34.3	25.7	30.0	15.0	20.0
シロイチモンジヨトウ	22.8	17.1	20.0	10.0	7.0
ネギコガ	8.0	6.0	7.0	7.0	7.0
ネタニ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ネコフセンチュウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

② ネギ（露地栽培）

栽培面積：105ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
黒斑病	19.2	18.3	25.7	26.8	27.6
さび病	23.2	22.1	26.2	24.0	19.0
白色疫病	9.2	8.8	6.4	5.8	4.9
軟腐病	36.0	34.4	14.1	12.6	8.2
べと病	33.4	31.9	30.5	29.8	32.4
えそ条斑病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
萎凋病	3.0	2.9	3.0	4.0	1.4
ハモグリハエ類	13.5	12.9	8.3	7.2	7.2
アザミウマ類	95.8	91.5	86.5	53.2	100.0
ハスモンヨトウ	50.4	48.2	56.8	48.2	49.4
シロイチモンジヨトウ	41.5	39.6	51.3	53.0	45.6
ネギコガ	10.0	9.5	6.5	5.8	6.8
ネタニ	12.1	11.6	23.0	25.1	24.2

ネギ巡回調査結果

ア ネギ

作物名: 青ネギ		作型: 露地		中央部(防除所)		令和3年(2021年)										栽培面積										92ha	
病害虫名	年別	5月					6月					7月					8月					9月					
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	
黒斑病 (発病程度)	本年				30.7	30.7					92.0	92.0				46.0	46.0										
	平年				4.1	4.1					7.2	7.2				16.6	16.6				16.2	16.2				7.1	7.1
さび病 (発病株率)	本年				61.3	61.3			61.3	30.7	92.0			23.0	23.0	46.0											
	平年	1.5	0.8	0.9	8.6	11.8	2.7	2.5	4.3	26.2	35.6	0.2	0.2	2.2	6.2	8.7				1.7	1.7						
べと病 (発病株率)	本年				15.3	15.3				30.7	30.7														23.0	23.0	
	平年	1.7	2.6	7.5	8.2	19.9			7.7	24.7	32.4		2.6	2.6	4.6	9.7			1.7	1.7	6.8	10.2			2.0	2.0	
葉枯病 (発病株率)	本年																										
	平年				0.1	0.1															2.2	2.2					
軟腐病 (発病株率)	本年																				0.3	0.3				46.0	46.0
	平年														6.3	6.3			0.2	0.3	0.5		5.1	1.7	6.3	13.1	
ネギアザミウマ (発生程度)	本年	92.0				92.0	92.0				92.0	69.0			23.0	92.0	30.7		30.7	30.7	92.0	46.0			46.0	92.0	
	平年	33.5	24.5	2.7	8.4	69.0	55.3	14.6	15.8	4.6	90.3	26.6	10.2	14.2	34.9	85.9	29.5	13.3	24.4	20.5	87.8	31.9	5.7	16.7	28.9	83.2	
ネギハモグリバエ (発生程度)	本年									30.7	30.7				23.0	23.0											
	平年			2.0	6.7	8.7				11.8	11.8	3.2	0.6	1.4	14.2	19.4	0.6	0.8	4.7	17.0	23.2	3.4	3.4	2.6	25.9	35.3	
シロイチモジヨトウ (発生虫数)	本年								30.7		30.7			23.0		23.0			30.7	30.7	61.4		23.0		23.0	46.0	
	平年			2.6	2.6	5.1		3.1	4.4	13.0	20.5			4.8	13.3	18.1	0.8	5.5	16.0	16.0	38.4	3.8	6.4	16.0	25.1	51.3	
ハスモンヨトウ (寄生虫数)	本年																										
	平年				6.1	6.1		0.5	3.1	2.3	6.0		1.0	2.9	14.2	18.1		2.5	7.7	28.8	39.0	0.8	4.2	10.8	16.3	32.2	
ネギコガ (寄生虫数)	本年																										
	平年								2.4	4.7	7.2				16.9	16.9			1.7	3.4	5.1				4.3	4.3	
アブラムシ類 (寄生株率)	本年				30.7	30.7																					
	平年				10.2	10.2																			1.7	1.7	

作物名:青ネギ		作型:露地		中央部(防除所)		令和3年(2021年)					栽培面積					92ha	
病害虫名	年別	10月					11月					最高発生面積					計
		甚	多	中	少	計	甚	多	中	少	計	甚	多	中	少		
黒斑病 (発病程度)	本年				23.0	23.0									92.0	92.0	
	平年				18.7	18.7				12.6	12.6				18.7	18.7	
さび病 (発病株率)	本年													61.3	30.7	92.0	
	平年									2.0	2.0	2.7	2.5	4.3	26.2	35.6	
べと病 (発病株率)	本年									23.0	23.0				30.7	30.7	
	平年				6.0	6.0				3.2	3.2			7.7	24.7	32.4	
葉枯病 (発病株率)	本年																
	平年														2.2	2.2	
軟腐病 (発病株率)	本年														46.0	46.0	
	平年												5.1	1.7	6.3	13.1	
ネギアザミウマ (発生程度)	本年	46.0		23.0	23.0	92.0		23.0	46.0	23.0	92.0	92.0				92.0	
	平年	21.8	17.6	20.6	30.3	90.3	25.9	20.5	19.2	23.9	89.4	55.3	14.6	15.8	4.6	90.3	
ネギハモグリバエ (発生程度)	本年														30.7	30.7	
	平年		0.8	2.6	27.6	31.0		0.9	1.7	9.2	11.8	3.4	3.4	2.6	25.9	35.3	
シロイチモジヨトウ (発生虫数)	本年			46.0	46.0	92.0				23.0	23.0			46.0	46.0	92.0	
	平年			7.2	33.7	40.9			4.1	22.0	26.1	3.8	6.4	16.0	25.1	51.3	
ハスモンヨトウ (寄生虫数)	本年				69.0	69.0									69.0	69.0	
	平年		4.4	8.2	24.1	36.7				11.9	11.9		2.5	7.7	28.8	39.0	
ネギコガ (寄生虫数)	本年																
	平年				1.7	1.7									16.9	16.9	
アブラムシ類 (寄生株率)	本年				46.0	46.0									46.0	46.0	
	平年									4.1	4.1				10.2	10.2	

※1 端数処理により合計は一致しないことがある。 ※2 栽培面積は「高知の園芸」R2農業振興センター調べ。

スイカ

(1) 最高発生面積・率

① スイカ抑制栽培

栽培面積：5ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
緑斑モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
えそ斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
退緑黄化病	0.1	2.7	4.0	0.6	0.6
黄化えそ病	0.0	0.4	0.8	1.9	1.0
斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
つる枯病	0.1	2.3	3.4	2.1	2.1
炭そ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
疫病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うどんこ病	1.1	23.8	24.9	28.0	30.0
つる割病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黒点根腐病	0.1	1.2	2.4	0.0	0.0
アブラムシ類	0.1	2.3	1.0	3.4	4.2
ハスモンヨトウ	0.3	5.4	5.0	6.8	8.4
ハダニ類	0.5	11.2	10.8	15.8	19.9
ミナミキイロアザミウマ	1.1	23.8	26.8	29.3	32.5
オンシツコナシラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
センチュウ類	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
タバココナシラミ	1.3	27.7	46.8	34.2	28.1
タネハエ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ウリハムシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハモクグリハエ類	0.0	0.4	0.8	4.6	5.8
ワタヘリクロノメイカ	0.0	0.4	—	—	—

② スイカ促成栽培

栽培面積：4ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
緑斑モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
えそ斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
退緑黄化病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄化えそ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
つる枯病	0.2	4.6	10.0	10.0	10.0
炭そ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
疫病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うどんこ病	0.5	13.8	30.0	30.0	30.0
つる割病	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2
黒点根腐病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アブラムシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハスモンヨトウ	0.0	0.9	2.0	2.0	2.0
ハダニ類	0.1	2.3	5.0	5.0	5.0
ミナミキイロアザミウマ	0.2	4.6	10.0	10.0	10.0
オンシツコナシラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
センチュウ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバココナシラミ	0.4	11.5	25.0	15.0	10.0
タネハエ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ウリハムシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハモクグリハエ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ワタヘリクロノメイカ	0.0	0.0	—	—	—

③ スイカ半促成栽培

栽培面積：4ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
緑斑モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
えそ斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
退緑黄化病	0.1	1.5	3.0	1.4	0.8
黄化えそ病	0.0	0.4	1.5	1.4	1.4
斑点病	0.0	0.3	0.2	1.5	1.5
つる枯病	0.1	2.6	3.3	3.9	4.5
炭そ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
疫病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うどんこ病	0.5	11.2	17.7	18.5	20.0
つる割病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黒点根腐病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アブラムシ類	0.2	4.5	4.9	9.4	9.4
ハスモンヨトウ	0.1	3.2	3.6	6.5	3.6
ハダニ類	0.4	10.2	13.2	14.4	17.1
ミナミキイロアザミウマ	0.5	13.1	17.1	28.3	31.2
オンシツコナシラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
センチュウ類	0.1	1.2	0.4	2.9	0.3
タバココナシラミ	0.7	16.8	34.4	32.2	30.0
タネハエ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ウリハムシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハモクグリハエ類	0.0	0.4	0.0	1.4	1.4
ワタヘリクロノメイカ	0.0	0.0	—	—	—

④ スイカ早熟・露地栽培

栽培面積：1ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
緑斑モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
えそ斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
退緑黄化病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄化えそ病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
斑点病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
つる枯病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
炭そ病	0.0	1.5	1.5	2.0	2.0
疫病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うどんこ病	0.1	9.2	28.0	26.0	23.0
つる割病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黒点根腐病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アブラムシ類	0.1	9.2	26.0	30.0	35.0
ハスモンヨトウ	0.1	12.3	30.0	28.0	36.0
ハダニ類	0.1	15.4	48.0	55.0	65.0
ミナミキイロアザミウマ	0.1	16.9	55.0	60.0	70.0
オンシツコナシラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
センチュウ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバココナシラミ	0.1	18.5	60.0	56.0	67.0
タネハエ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ウリハムシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハモクグリハエ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ワタヘリクロノメイカ	0.0	0.0	—	—	—

イチゴ

(1) 最高発生面積・率

① イチゴ（施設栽培）

栽培面積：20ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
うどんこ病	0.7	3.6	6.6	5.4	10.0
灰色かび病	2.0	9.8	13.6	14.2	23.6
炭そ病	3.8	19.0	38.2	38.7	48.0
アブラムシ類	5.3	26.5	34.0	31.3	37.0
ハダニ類	9.3	46.5	70.6	73.8	75.4
アザミウマ類	10.5	52.5	73.4	68.5	70.4
イチゴメセンチュウ	0.1	0.5	0.0	0.2	1.0
コガネムシ類	0.2	0.9	1.1	2.0	3.3
ネグサレセンチュウ類	0.3	1.5	0.5	0.2	1.6
コナジラミ類	1.1	5.3	6.8	5.8	7.0

メロン

(1) 最高発生面積・率

① メロン（抑制栽培）

栽培面積：21ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
べと病	0.3	1.7	1.9	1.1	1.6
えそ斑点病	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3
うどんこ病	6.0	29.0	23.0	38.2	42.8
つる枯病	1.3	6.3	9.6	10.7	11.8
疫病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
菌核病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
灰色かび病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
つる割病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黒点根腐病	0.5	2.5	8.7	5.0	6.0
黄化えそ病	2.1	10.3	11.3	13.3	12.7
退緑黄化病	5.2	25.0	31.1	9.8	13.4
アブラムシ類	1.7	8.3	7.5	5.4	5.8
ハスモンヨトウ	0.8	4.1	8.0	13.5	14.7
ハダニ類	0.3	1.2	1.0	1.4	2.2
ミナミキイロアザミウマ	5.8	27.9	25.6	44.2	42.9
オシロコシコナジラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
センチュウ類	0.4	2.1	2.2	2.1	2.5
タバココナジラミ	11.4	54.8	50.9	36.9	47.2
ハモグリバエ類	0.9	4.1	3.7	3.7	3.7
ワタハリクロノメイガ	0.4	2.1	—	—	—

② メロン（促成栽培）

栽培面積：7ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
べと病	0.2	2.5	2.1	0.6	0.6
えそ斑点病	0.0	0.4	0.3	0.2	0.2
うどんこ病	2.5	34.9	22.8	34.6	36.2
つる枯病	0.7	10.3	8.7	10.4	14.7
疫病	0.0	0.0	0.3	0.4	2.2
菌核病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
灰色かび病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
つる割病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黒点根腐病	0.2	2.1	3.7	4.4	4.0
黄化えそ病	0.6	8.2	9.6	11.0	10.7
退緑黄化病	1.2	16.6	16.6	5.7	9.0
アブラムシ類	0.2	2.1	1.9	0.4	0.0
ハスモンヨトウ	0.1	0.8	0.5	3.1	0.5
ハダニ類	0.0	0.4	0.3	0.6	0.6
ミナミキイロアザミウマ	1.7	23.5	16.3	17.7	18.4
オンシツコナシラミ	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
センチュウ類	0.2	2.3	1.9	1.8	1.8
タバココナシラミ	2.4	33.3	25.0	17.3	20.2
ハモクグリハエ類	0.2	3.3	3.2	1.6	1.6
ワタハリクロノメイガ	0.0	0.0	—	—	—

③ メロン（半促成栽培）

栽培面積：36ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
べと病	0.9	2.5	0.4	2.0	3.1
えそ斑点病	0.4	1.2	1.1	1.1	1.1
うどんこ病	14.8	41.1	41.9	58.2	64.8
つる枯病	4.5	12.3	13.6	19.1	22.5
疫病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
菌核病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
モザイク病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
灰色かび病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
つる割病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黒点根腐病	0.9	2.5	6.8	6.8	4.4
黄化えそ病	6.0	16.5	23.5	25.5	26.1
退緑黄化病	9.0	24.8	17.7	16.3	20.9
アブラムシ類	0.8	2.1	1.6	1.7	2.8
ハスモンヨトウ	0.7	2.0	2.8	3.2	1.8
ハダニ類	1.5	4.1	3.6	6.4	9.1
ミナミキイロアザミウマ	10.2	28.2	29.9	46.5	53.8
オンシツコナシラミ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
センチュウ類	1.5	4.2	5.4	5.5	5.8
タバココナシラミ	14.9	41.2	46.1	46.3	50.0
ハモクグリハエ類	0.8	2.1	1.1	1.1	1.7
ワタハリクロノメイガ	0.0	0.0	—	—	—

オクラ

(1) 最高発生面積・率

① オクラ（施設栽培）

栽培面積：25ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
葉すす病	0.6	2.3	4.0	8.2	7.0
苗立枯病	2.4	9.6	8.0	6.2	7.9
うどんこ病	1.0	3.8	5.0	5.4	9.1
黒根病	1.8	7.0	14.2	15.8	13.7
輪紋病	0.1	0.5	0.0	0.2	0.5
立枯病	0.0	0.0	0.0	0.2	1.9
疫病	0.1	0.5	0.4	0.2	0.2
灰色かび病	7.7	30.7	48.7	38.5	28.8
アブラムシ類	4.2	16.5	20.2	18.3	24.0
ハスモンヨトウ	1.6	6.5	10.7	8.7	12.7
ミナキイロアザミウマ	1.0	4.0	9.7	10.0	5.9
ネコブセンチュウ	1.4	5.6	5.6	4.0	3.1
カメムシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
オオホノアザアブラムシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
シロイチモジヨトウ	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
タバコカビ類	0.1	0.5	0.4	0.5	2.2
タバコナジミ	1.3	5.0	6.9	5.7	5.0
ハモグリバエ類	0.0	0.0	0.0	2.2	5.6

② オクラ（露地栽培）

栽培面積：67ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
葉すす病	14.1	21.1	12.2	13.4	19.6
苗立枯病	8.4	12.6	13.7	10.6	13.3
うどんこ病	9.2	13.7	10.4	2.8	6.2
黒根病	2.0	3.0	3.3	1.9	2.0
輪紋病	2.3	3.4	1.5	2.2	1.5
立枯病	0.9	1.3	2.1	0.7	0.0
疫病	0.7	1.1	3.2	2.5	4.1
アブラムシ類	45.1	67.5	63.9	54.7	57.5
ハスモンヨトウ	42.7	63.9	48.4	36.7	46.4
ミナキイロアザミウマ	0.5	0.7	0.8	0.7	0.1
ネコブセンチュウ	3.0	4.4	7.2	5.0	5.9
カメムシ類	16.3	24.5	19.8	8.3	9.7
オオホノアザアブラムシ	0.2	0.3	1.3	0.4	0.7
シロイチモジヨトウ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
タバコカビ類	19.0	28.4	12.2	7.6	19.6
タバコナジミ	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7
ハモグリバエ類	0.1	0.2	0.0	0.3	0.3

ニラ

(1) 最高発生面積・率

① ニラ（施設栽培）

栽培面積：203ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
さび病	36.4	18.0	25.1	10.2	8.2
白斑葉枯病	38.5	19.0	21.2	22.5	23.6
白絹病	23.5	11.6	12.2	12.1	12.6
葉腐病	57.2	28.2	26.1	26.1	26.4
株腐細菌病	4.6	2.3	2.4	0.6	0.1
軟腐病	73.6	36.3	39.1	39.5	41.4
乾腐病	0.5	0.3	2.6	2.8	2.5
えそ条斑病	78.8	38.9	12.5	56.1	57.0
アブラムシ類	1.5	0.8	0.8	0.8	0.8
ネダニ	64.9	32.0	34.2	34.8	32.5
アザミウマ類	170.9	84.3	90.8	87.4	85.9
ネキコガ	21.4	10.6	10.3	11.6	11.2
ハモグリハエ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハスモンヨトウ	21.4	10.5	13.0	4.6	8.6

② ニラ（露地栽培）

栽培面積：39ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
さび病	13.2	33.6	34.7	14.7	8.8
白斑葉枯病	0.1	0.3	0.0	1.3	3.9
白絹病	5.8	14.9	28.1	16.2	11.0
葉腐病	10.9	27.7	23.1	26.3	28.2
株腐細菌病	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
軟腐病	16.4	41.7	51.4	28.0	33.9
乾腐病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
えそ条斑病	25.4	64.6	61.2	66.7	69.3
アブラムシ類	0.6	1.5	0.3	0.0	0.0
ネダニ	8.4	21.5	22.2	28.2	28.2
アザミウマ類	29.0	74.0	72.8	83.9	83.9
ネキコガ	4.3	10.9	11.2	11.2	10.6
ハモグリハエ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハスモンヨトウ	4.4	11.2	13.1	5.7	40.8

ショウガ

(1) 最高発生面積・率

① ショウガ（施設栽培）

栽培面積：35ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
根茎腐敗病	1.7	4.9	5.6	2.0	3.7
立枯病	0.8	2.4	0.8	1.4	2.8
白星病	0.2	0.5	0.5	0.5	1.3
紋枯病	0.5	1.6	0.8	1.3	0.4
腐敗病	1.0	2.8	8.8	0.6	1.5
青枯病	0.2	0.6	0.4	2.1	2.2
ハダニ類	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
アワメガ	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
イネトリ	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
ハスモントリ	1.3	3.8	2.8	4.5	6.5
センチュウ類	1.8	5.2	2.0	1.5	1.3
カブラヤガ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

② ショウガ（露地栽培）

栽培面積：388ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
根茎腐敗病	75.2	19.4	25.9	22.9	24.8
立枯病	57.5	14.8	11.6	11.3	10.7
白星病	122.2	31.5	39.4	44.8	41.6
紋枯病	31.6	8.1	5.1	4.6	5.5
腐敗病	51.8	13.3	12.5	12.9	9.6
青枯病	22.2	5.7	9.1	9.6	3.7
ハダニ類	3.4	0.9	1.9	2.8	0.0
アワメガ	75.0	19.3	11.4	16.2	17.6
イネトリ	6.7	1.7	4.7	3.9	0.0
ハスモントリ	124.1	32.0	36.4	38.3	43.3
センチュウ類	7.6	2.0	1.9	1.4	0.4
カブラヤガ	41.2	10.6	5.8	6.8	9.6

ミョウガ

(1) 最高発生面積・率

① ミョウガ（施設栽培）

栽培面積：106ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
根茎腐敗病	12.5	11.7	12.9	12.8	12.9
紋枯病	27.0	25.5	27.2	24.4	16.4
白絹病	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
ハダニ類	94.5	89.1	96.0	97.3	93.9
センチュウ類	2.2	2.1	2.4	1.0	0.8
ハスモンヨトウ	95.7	90.3	99.5	96.8	91.7
シロイチモジヨトウ	15.0	14.2	15.0	15.0	0.0
モジロアザミウマ	92.4	87.2	93.7	90.3	89.4

カンショ

(1) 最高発生面積・率

① カンショ（早掘）

栽培面積：19ha

病害虫名	R3		R2	H31	H30
	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)	発生面積率 (%)
帯状粗皮病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
立枯病	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0
黒斑病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
つる割病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
アブラムシ類	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0
ハスモンヨトウ	4.8	25.0	25.0	15.0	15.0
センチュウ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
コガネムシ類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ハダニ類	2.9	15.0	10.0	5.0	5.0
タバココナジラミ	1.9	10.0	15.0	15.0	15.0
イモキバガ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

特定点における調査

1 黄色水盤におけるアブラムシ類有翅虫の半旬別誘殺数調査

調査方法：水を張った黄色水盤(直径30cm)を畦畔上に設置し、3～7日おきに誘殺数を調査した。

東 部		調査地:安芸市川北						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	3	0	2	2	2	1	10
	平 年	2.4	2.1	1.8	1.1	1.1	1.2	9.7
2	本 年	1	1	0	6	5	2	15
	平 年	0.9	0.7	0.5	0.7	0.3	0.6	3.7
3	本 年	2	1	1	0	1	3	8
	平 年	0.3	0.8	0.6	0.6	2.0	1.6	5.8
4	本 年	2	1	4	6	10	21	44
	平 年	2.7	5.1	4.9	9.5	12.9	23.6	58.7
5	本 年	35	50	169	86	30	28	398
	平 年	18.7	15.4	24.7	30.4	16.7	15.6	121.5
6	本 年	22	26	26	13	16	22	125
	平 年	12.8	6.9	6.7	4.8	2.5	2.8	36.5
7	本 年	31	16	9	9	19	65	149
	平 年	2.3	3.0	3.2	5.8	6.1	11.6	32.0
8	本 年	39	16	2	7	37	88	189
	平 年	10.9	6.4	6.4	6.6	2.7	2.0	35.0
9	本 年	22	79	109	130	162	104	606
	平 年	10.7	7.5	19.6	15.9	12.7	17.8	84.2
10	本 年	63	49	20	10	5	9	156
	平 年	16.8	12.8	8.2	6.3	5.0	5.9	55.0
11	本 年	30	45	60	72	125	143	475
	平 年	5.0	6.1	9.2	7.4	5.8	6.1	39.6
12	本 年	72	113	93	46	69	40	433
	平 年	4.4	7.8	9.7	5.4	3.6	2.5	33.4

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

中央部(農業技術センター)		調査地:南国市廿枝						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	4	3	4	3	1	0	15
	平 年	4.7	3.9	1.2	1.6	1.5	1.4	14.3
2	本 年	1	3	4	7	6	3	24
	平 年	17.0	2.5	1.4	2.3	4.4	4.9	32.5
3	本 年	4	4	3	1	3	5	20
	平 年	4.4	2.8	5.4	7.7	6.0	12.1	38.4
4	本 年	5	23	24	22	4	16	94
	平 年	10.6	8.9	17.2	39.8	40.0	35.9	152.3
5	本 年	30	46	31	19	9	10	145
	平 年	52.3	68.3	103.8	80.1	89.8	143.9	538.2
6	本 年	4	15	21	23	21	19	103
	平 年	73.1	59.1	39.1	34.1	35.6	20.8	261.8
7	本 年	19	9	3	0	0	0	31
	平 年	20.9	33.3	20.9	26.5	43.2	93.7	238.5
8	本 年	0	1	3	0	2	6	12
	平 年	50.5	41.0	21.4	14.6	18.8	15.0	161.3
9	本 年	3	29	27	13	16	7	95
	平 年	13.0	22.6	34.9	31.2	61.3	56.6	219.6
10	本 年	1	2	2	3	3	3	14
	平 年	41.8	31.3	24.6	20.8	18.6	23.0	160.1
11	本 年	1	3	9	26	16	9	64
	平 年	23.3	24.6	29.9	30.2	28.1	26.1	162.2
12	本 年	4	3	1	0	0	0	8
	平 年	26.5	31.1	16.2	25.1	7.6	4.1	110.6

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均


中西部		調査地:須崎市押岡						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	2	0	1	1	1	0	5
	平 年	2.4	1.4	1.3	0.6	0.6	0.6	6.9
2	本 年	0	0	0	1	0	1	2
	平 年	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	0.0	1.7
3	本 年	1	0	0	6	5	9	21
	平 年	0.4	0.6	0.2	0.2	1.0	0.8	3.2
4	本 年	10	13	15	15	11	18	82
	平 年	1.5	0.9	1.4	2.5	5.3	9.1	20.7
5	本 年	29	44	66	55	47	62	303
	平 年	19.0	21.1	21.8	30.6	36.0	50.6	179.1
6	本 年	153	133	102	38	21	16	463
	平 年	48.0	31.7	20.1	24.5	10.7	6.1	141.1
7	本 年	15	16	9	5	5	7	57
	平 年	2.8	3.6	3.1	2.4	2.5	4.3	18.7
8	本 年	12	20	26	11	27	46	142
	平 年	5.1	6.1	4.5	6.0	4.3	3.3	29.3
9	本 年	38	90	101	98	36	34	397
	平 年	8.4	14.1	50.2	41.7	24.0	32.8	171.2
10	本 年	29	13	25	20	11	16	114
	平 年	30.3	14.8	13.7	9.5	8.9	13.2	90.4
11	本 年	25	31	33	38	39	31	197
	平 年	12.5	17.7	19.0	14.7	17.2	16.9	98.0
12	本 年	3	21	17	4	8	4	57
	平 年	12.4	7.9	5.1	5.1	4.7	2.7	37.9

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均


西 部		調査地:四万十市竹島						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	13	2	9	9	6	3	42
	平 年	0.6	0.6	0.4	0.1	0.7	0.6	3.0
2	本 年	4	7	13	2	2	1	29
	平 年	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.8
3	本 年	8	7	2	4	2	3	26
	平 年	0.3	0.9	1.2	1.1	1.5	1.8	6.8
4	本 年	3	2	2	3	6	6	22
	平 年	2.6	2.6	3.7	10.5	9.0	8.7	37.1
5	本 年	12	20	11	7	5	7	62
	平 年	10.5	14.5	13.9	13.8	14.4	17.3	84.4
6	本 年	3	10	14	3	3	3	36
	平 年	15.0	11.5	7.4	6.0	7.7	7.8	55.4
7	本 年	3	0	0	1	2	5	11
	平 年	6.7	5.1	5.7	7.3	6.3	7.3	38.4
8	本 年	4	2	1	1	5	18	31
	平 年	6.8	7.0	5.6	7.3	8.1	11.6	46.4
9	本 年	37	74	101	126	43	34	415
	平 年	8.8	9.0	10.2	12.8	15.3	16.0	72.1
10	本 年	30	33	11	7	11	13	105
	平 年	15.9	7.2	7.2	6.8	7.5	11.1	55.7
11	本 年	11	7	1	37	19	4	79
	平 年	8.7	9.5	13.6	47.1	39.9	19.1	137.9
12	本 年	6	15	12	4	7	4	48
	平 年	13.2	7.6	4.2	3.2	3.2	4.7	36.1

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均


東部／調査地:安芸市川北




中央部(農業技術センター)／調査地:南国市廿枝



中西部／調査地:須崎市押岡



西部／調査地:四万十市竹島



2 フェロモントラップによるハスモンヨトウ雄成虫の半旬別誘殺数調査

調査方法：箱形乾式トラップを約 50cm の高さに設置し、3～7 日おきに誘殺数を調査した。

東 部		調査地：安芸市川北						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	1	0	0	1	3	1	6
	平 年	3.2	1.3	0.4	0.2	0.5	0.4	6.0
2	本 年	1	2	3	0	1	1	8
	平 年	0.2	0.9	2.4	0.5	0.7	1.0	5.7
3	本 年	4	8	11	14	29	49	115
	平 年	2.5	3.1	3.6	3.5	5.4	9.0	27.1
4	本 年	41	8	18	27	36	22	152
	平 年	10.3	13.0	21.2	19.6	20.3	25.8	110.2
5	本 年	25	32	29	66	102	175	429
	平 年	31.8	30.7	31.9	42.4	36.7	38.7	212.2
6	本 年	39	31	27	28	30	30	185
	平 年	30.1	50.0	54.7	53.5	67.2	71.8	327.3
7	本 年	29	65	88	110	137	143	572
	平 年	99.1	100.8	96.0	87.0	72.7	98.9	554.5
8	本 年	114	142	184	152	148	184	924
	平 年	100.8	97.4	85.2	104.4	99.8	134.7	622.3
9	本 年	152	105	111	136	159	130	793
	平 年	152.0	149.5	131.5	124.3	124.2	199.5	881.0
10	本 年	97	48	76	114	159	100	594
	平 年	211.3	227.4	230.9	178.4	137.0	145.6	1,130.6
11	本 年	78	66	52	96	52	20	364
	平 年	113.3	121.1	91.6	79.3	55.9	57.0	518.2
12	本 年	3	6	6	6	4	2	27
	平 年	39.3	20.4	17.0	9.8	8.5	5.3	100.3

平年値：平成23年～令和2年の測定値の平均

中央部		調査地：香南市野市町深淵						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	0	0	1	1	1	2	5
	平 年	1.2	0.9	0.3	0.1	0.3	0.8	3.6
2	本 年	0	1	2	1	1	1	6
	平 年	1.8	0.3	0.4	0.3	0.8	1.4	5.0
3	本 年	8	13	18	23	29	35	126
	平 年	1.8	2.5	5.2	6.9	8.9	21.7	47.0
4	本 年	24	21	40	51	50	25	211
	平 年	24.7	31.1	36.3	39.1	39.2	41.2	211.6
5	本 年	30	45	55	52	56	97	335
	平 年	38.6	61.3	63.8	58.9	60.7	55.2	338.5
6	本 年	44	47	49	53	74	69	336
	平 年	46.6	32.3	46.1	66.5	67.6	62.7	321.8
7	本 年	54	55	52	49	42	60	312
	平 年	69.9	56.6	48.1	64.7	72.8	84.4	396.5
8	本 年	63	73	92	79	71	85	463
	平 年	81.2	84.3	92.2	110.2	106.0	143.1	617.0
9	本 年	95	79	75	76	85	157	567
	平 年	119.8	124.9	78.6	110.6	148.4	179.6	761.9
10	本 年	191	132	381	415	372	533	2024
	平 年	191.8	259.5	241.3	192.4	150.7	159.9	1,195.6
11	本 年	272	187	124	89	46	17	735
	平 年	101.8	122.7	113.7	102.3	68.7	60.2	569.4
12	本 年	10	7	6	5	4	1	33
	平 年	44.1	18.8	8.3	4.7	5.0	1.8	82.7

平年値：平成23年～令和2年の測定値の平均

中央部(農業技術センター)		調査地：南国市廿枝						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	1	0	1	0	0	1	3
	平 年	0.0	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0	1.4
2	本 年	0	0	1	0	1	0	2
	平 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5
3	本 年	3	5	4	13	19	25	69
	平 年	0.4	0.2	0.8	1.7	1.7	3.5	8.3
4	本 年	17	10	17	21	19	12	96
	平 年	6.7	5.3	12.1	10.7	10.2	11.6	56.6
5	本 年	16	24	26	55	73	87	281
	平 年	14.0	19.3	32.0	20.5	20.5	15.5	121.8
6	本 年	33	21	16	26	34	29	159
	平 年	11.6	11.2	16.2	21.7	25.3	28.2	114.2
7	本 年	18	46	72	86	78	55	355
	平 年	31.8	31.8	24.4	27.8	40.1	47.3	203.2
8	本 年	71	95	113	85	78	90	532
	平 年	34.3	41.5	52.9	64.3	60.2	91.4	344.6
9	本 年	54	38	48	70	39	64	313
	平 年	85.0	92.5	72.4	80.8	131.1	140.6	602.4
10	本 年	74	49	250	291	279	231	1174
	平 年	148.4	192.4	182.2	137.1	128.9	144.8	933.8
11	本 年	168	129	81	75	50	27	530
	平 年	111.6	105.3	100.0	91.6	65.7	68.8	543.0
12	本 年	4	12	9	4	4	1	34
	平 年	39.5	21.8	11.8	4.4	4.1	1.1	82.7

平年値：平成23年～令和2年の測定値の平均


中西部		調査地：須崎市押田						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	0	0	0	0	0	0	0
	平 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
2	本 年	0	0	0	0	0	0	0
	平 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	本 年	0	0	0	0	1	1	2
	平 年	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	1.2
4	本 年	1	1	1	2	6	7	18
	平 年	0.3	0.4	2.1	3.3	3.9	7.0	17.0
5	本 年	8	6	26	42	51	58	191
	平 年	4.8	6.1	8.3	10.2	12.4	13.3	55.1
6	本 年	36	27	24	33	21	19	160
	平 年	10.6	12.3	15.4	22.6	18.8	21.2	100.9
7	本 年	21	31	39	43	38	19	191
	平 年	22.3	21.6	21.5	19.0	22.3	36.2	142.9
8	本 年	48	118	192	75	60	70	563
	平 年	27.6	24.9	38.2	47.8	38.3	68.7	245.5
9	本 年	101	97	88	76	81	66	509
	平 年	85.0	72.4	57.6	61.5	66.0	82.0	424.5
10	本 年	52	42	151	143	133	49	570
	平 年	111.4	105.0	77.3	58.8	44.8	49.5	446.8
11	本 年	25	18	16	6	4	3	72
	平 年	39.5	39.3	23.1	15.8	9.7	8.4	135.8
12	本 年	3	0	0	0	1	0	4
	平 年	4.4	1.6	1.1	0.5	0.3	0.0	7.9

平年値：平成23年～令和2年の測定値の平均


西 部		調査地：四万十市竹島						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.1	本 年	1	0	0	0	0	1	2
	平 年	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7
2	本 年	1	2	1	1	0	0	5
	平 年	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4	0.8
3	本 年	1	1	3	5	5	11	26
	平 年	0.2	0.2	0.6	0.6	1.3	3.1	6.0
4	本 年	15	7	8	10	13	24	77
	平 年	2.3	3.1	7.8	7.6	11.5	11.1	43.4
5	本 年	29	34	42	66	81	93	345
	平 年	12.2	18.9	21.7	19.6	28.6	15.9	116.9
6	本 年	43	25	13	13	8	11	113
	平 年	15.2	28.6	22.4	24.9	19.3	21.7	132.1
7	本 年	19	11	13	15	16	17	91
	平 年	28.1	31.0	20.5	18.3	25.0	36.5	159.4
8	本 年	24	27	9	5	8	22	95
	平 年	34.1	33.1	29.4	27.8	28.9	50.4	203.7
9	本 年	51	48	42	34	13	20	208
	平 年	70.3	50.7	47.7	39.6	50.0	68.4	326.7
10	本 年	28	41	80	105	153	242	649
	平 年	103.9	110.7	101.0	109.6	134.5	166.4	726.1
11	本 年	222	163	64	101	63	35	648
	平 年	114.0	114.0	86.2	61.2	49.9	55.8	481.1
12	本 年	23	13	7	4	1	1	49
	平 年	47.1	18.2	10.4	6.7	4.8	1.3	88.5

平年値：平成23年～令和2年の測定値の平均


東部／調査地：安芸市川北




中央部／調査地：香南市野市町深淵




中央部（農業技術センター）／調査地：南国市廿枝



中西部／調査地：須崎市押岡



西部／調査地：四万十市竹島



3 フェロモントラップによるオオタバコガ雄成虫の半旬別誘殺数調査

調査方法：ジャクソン型トラップを高さ約50cmに設置し、3～7日おきに誘殺数を調査した。

東 部		調査地:安芸市川北						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	0	1	1	0	1	4	7
	平 年	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	1.2
5	本 年	3	2	0	1	3	9	18
	平 年	1.5	1.4	1.0	1.1	0.8	0.8	6.6
6	本 年	6	2	1	5	3	4	21
	平 年	0.9	0.5	0.8	0.7	2.8	2.5	8.1
7	本 年	6	0	0	0	1	7	14
	平 年	2.9	2.6	2.0	0.9	0.6	0.8	9.8
8	本 年	4	1	3	3	6	11	28
	平 年	1.5	1.7	0.8	0.8	0.7	1.2	6.7
9	本 年	8	2	3	9	11	19	52
	平 年	4.4	2.5	3.3	3.3	3.3	6.4	23.2
10	本 年	20	4	17	16	11	15	83
	平 年	6.5	6.1	4.1	2.6	1.2	4.7	25.2
11	本 年	3	2	5	18	7	1	36
	平 年	6.9	4.8	3.2	1.9	1.3	1.8	19.9
12	本 年	4	4	3	1	1	0	13
	平 年	3.3	0.7	0.5	0.5	0.6	0.0	5.6
計	本 年	54	18	33	53	44	70	272
	平 年	28.0	20.4	15.9	11.9	11.6	18.6	106.4

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

中央部		調査地:香南市野市町深淵						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	6	2	4	4	2	6	24
	平 年	0.3	0.5	1.2	2.0	1.7	1.3	7.0
5	本 年	6	6	1	2	3	3	21
	平 年	2.6	3.0	4.2	2.1	0.7	2.7	15.3
6	本 年	19	13	10	11	5	18	76
	平 年	2.2	2.9	3.9	9.1	9.1	10.9	38.1
7	本 年	39	1	1	3	8	6	58
	平 年	11.7	7.2	4.5	2.1	1.9	4.2	31.6
8	本 年	10	12	12	22	15	7	78
	平 年	7.6	3.5	4.1	4.7	4.4	10.2	34.5
9	本 年	29	6	1	1	26	26	89
	平 年	9.9	5.6	6.9	7.1	4.0	9.4	42.8
10	本 年	29	51	51	44	33	19	227
	平 年	18.7	13.5	9.4	16.1	10.5	12.5	80.7
11	本 年	4	2	1	1	2	3	13
	平 年	11.3	11.7	11.4	9.5	11.3	5.9	61.1
12	本 年	7	5	4	2	2	1	21
	平 年	7.6	3.7	3.4	1.4	1.9	3.2	21.2
計	本 年	149	98	85	90	96	89	607
	平 年	71.9	51.6	49.1	54.1	45.5	60.3	332.4

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

中央部(農業技術センター)		調査地:南国市廿枝						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	3	0	0	1	1	2	7
	平 年	0.2	0.3	0.9	0.4	0.4	1.0	3.2
5	本 年	1	0	0	0	1	0	2
	平 年	0.6	1.0	0.4	0.2	0.1	0.1	2.4
6	本 年	1	2	1	2	3	6	15
	平 年	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	1.5	2.7
7	本 年	9	7	8	7	3	8	42
	平 年	2.6	1.9	1.0	0.3	0.4	0.3	6.5
8	本 年	7	6	5	2	2	6	28
	平 年	1.2	0.6	0.8	0.8	0.7	2.3	6.4
9	本 年	16	6	3	2	1	6	34
	平 年	2.3	2.3	1.5	2.0	1.8	2.3	12.3
10	本 年	8	2	6	11	15	12	54
	平 年	5.7	7.4	4.9	1.3	1.9	3.0	24.2
11	本 年	6	4	2	1	1	1	15
	平 年	4.6	3.3	2.2	1.1	0.7	1.7	13.6
12	本 年	0	5	3	0	0	0	8
	平 年	2.3	1.2	0.7	0.5	0.5	0.5	5.7
計	本 年	51	32	28	26	27	41	205
	平 年	19.6	18.1	12.6	7.0	7.0	12.7	76.9

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

西部		調査地:四万十市竹島						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	9	4	5	6	4	9	37
	平 年	0.6	1.1	1.9	1.4	3.7	6.8	15.4
5	本 年	10	11	2	4	4	3	34
	平 年	16.6	3.0	7.1	3.4	3.5	4.8	38.4
6	本 年	12	9	7	13	5	4	50
	平 年	5.9	1.2	1.6	1.5	1.7	3.4	15.3
7	本 年	5	3	10	14	7	12	51
	平 年	5.0	5.7	1.4	1.1	1.0	2.9	17.1
8	本 年	9	7	2	2	2	0	22
	平 年	9.8	3.9	1.9	2.0	1.5	4.2	23.3
9	本 年	1	1	1	4	1	1	9
	平 年	6.9	4.7	5.6	3.9	2.8	8.4	32.3
10	本 年	8	24	13	7	4	15	71
	平 年	20.3	9.0	6.7	4.4	2.6	4.4	47.4
11	本 年	15	11	4	1	1	0	32
	平 年	5.5	6.7	3.7	1.9	1.4	1.1	20.3
12	本 年	2	1	1	1	0	0	5
	平 年	1.9	1.3	1.1	0.7	0.7	0.3	5.9
計	本 年	71	71	45	52	28	44	311
	平 年	72.4	36.6	31.0	20.3	18.8	36.2	215.4

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

4 フェロモントラップによるタバコガ雄成虫の半旬別誘殺数調査

調査方法：ジャクソン型トラップを高さ約50cmに設置し、3～7日おきに誘殺数を調査した。

東 部		調査地:安芸市川北						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	0	0	0	0	0	1	1
	平 年	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.5	1.0
5	本 年	1	1	8	5	4	4	23
	平 年	1.0	0.8	1.1	3.0	3.2	5.9	15.0
6	本 年	5	4	3	6	8	10	36
	平 年	4.6	5.4	4.2	3.7	3.5	3.7	25.1
7	本 年	10	6	5	5	8	8	42
	平 年	8.5	7.8	5.3	3.3	1.4	3.2	29.5
8	本 年	10	8	4	7	6	7	42
	平 年	7.8	6.3	4.4	3.6	2.1	3.9	28.1
9	本 年	3	6	7	9	7	10	42
	平 年	7.9	7.5	6.6	4.2	2.8	5.0	34.0
10	本 年	12	13	4	1	1	7	38
	平 年	8.3	7.1	5.0	2.2	2.0	2.8	27.4
11	本 年	8	6	1	3	1	1	20
	平 年	4.4	4.4	3.5	1.7	1.0	2.1	17.1
12	本 年	0	0	0	0	0	0	0
	平 年	1.3	0.6	0.3	0.7	0.4	0.0	3.3
計	本 年	49	44	32	36	35	48	244
	平 年	43.9	40.0	30.4	22.5	16.6	27.1	180.5

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

中央部		調査地:香南市野市町深淵						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	2	0	0	1	3	3	9
	平 年	0.2	0.3	0.0	0.4	0.7	1.8	3.4
5	本 年	4	4	6	4	2	5	25
	平 年	2.7	4.9	7.7	6.0	3.6	6.6	31.5
6	本 年	11	12	11	3	4	10	51
	平 年	6.1	9.1	5.5	6.2	4.6	6.6	38.1
7	本 年	16	8	5	6	18	20	73
	平 年	10.6	6.9	5.0	6.2	4.7	5.9	39.3
8	本 年	12	8	3	10	8	7	48
	平 年	24.2	21.6	16.3	10.2	13.0	18.0	103.3
9	本 年	18	8	6	4	25	13	74
	平 年	21.8	15.2	12.7	12.2	6.4	13.2	81.5
10	本 年	6	11	8	5	1	6	37
	平 年	20.0	10.6	8.2	16.5	10.4	11.6	77.3
11	本 年	2	1	1	2	1	1	8
	平 年	8.3	6.9	6.6	5.5	3.9	2.5	33.7
12	本 年	0	1	0	1	1	0	3
	平 年	2.9	1.6	1.6	0.9	1.1	0.4	8.4
計	本 年	71	53	40	36	63	65	328
	平 年	96.8	77.1	63.6	64.1	48.5	66.6	416.5

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

中央部(農業技術センター)		調査地:南国市廿枝						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	2	0	0	0	2	4	8
	平 年	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	1.1
5	本 年	3	3	4	2	1	0	13
	平 年	0.6	1.1	1.4	1.7	3.0	2.1	9.9
6	本 年	1	0	1	0	1	1	4
	平 年	1.3	1.5	2.1	1.3	1.8	3.2	11.2
7	本 年	2	5	2	0	0	4	13
	平 年	4.3	3.9	2.8	1.6	2.4	3.9	18.9
8	本 年	2	1	2	1	0	2	8
	平 年	13.0	8.1	9.3	10.5	10.5	9.0	60.4
9	本 年	8	2	1	2	5	7	25
	平 年	9.9	4.4	3.6	4.4	8.5	6.8	37.6
10	本 年	8	8	1	0	0	9	26
	平 年	11.2	6.6	4.0	3.4	2.6	3.1	30.9
11	本 年	5	5	5	1	0	1	17
	平 年	1.8	2.0	2.4	1.4	0.9	0.2	8.7
12	本 年	0	1	0	0	0	0	1
	平 年	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	1.2
計	本 年	31	25	16	6	9	28	115
	平 年	42.4	28.1	26.1	24.7	30.0	28.6	179.9

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

西部		調査地:四万十市竹島						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	0	0	0	0	1	1	2
	平 年	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.3	0.9
5	本 年	1	1	1	3	3	0	9
	平 年	0.9	1.2	1.0	0.9	1.1	1.3	6.4
6	本 年	1	1	1	1	1	2	7
	平 年	2.1	1.8	2.0	1.1	1.2	1.9	10.1
7	本 年	4	9	5	1	0	0	19
	平 年	2.2	2.2	3.5	1.2	1.8	2.4	13.3
8	本 年	0	0	1	0	0	1	2
	平 年	4.3	3.2	3.1	3.0	2.5	5.1	21.2
9	本 年	3	4	3	1	2	2	15
	平 年	8.1	6.3	3.6	2.5	3.3	4.9	28.7
10	本 年	4	3	3	2	1	2	15
	平 年	8.6	6.8	3.6	1.5	1.3	0.9	22.7
11	本 年	1	0	0	1	0	0	2
	平 年	1.7	1.2	1.3	0.7	0.6	0.1	5.6
12	本 年	0	0	0	0	0	0	0
	平 年	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.5
計	本 年	14	18	14	9	8	8	71
	平 年	27.9	22.7	18.5	11.2	12.1	16.9	109.3

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

5 サトイモにおけるハスモンヨトウの産卵数調査

調査方法：露地栽培のサトイモ50株に産下されたハスモンヨトウの卵塊数を調査した。

(1) 巡回調査

時期	調査年 調査地点	令和3年(2021)		令和2年(2020)		令和元年(2019)		平成30年(2018)	
		調査日	卵塊数	調査日	卵塊数	調査日	卵塊数	調査日	卵塊数
8月 上旬	安芸市 川北	8/11	4.0	8/7	4.0	8/1	1.0	8/3	0.0
	安芸市 井ノ口	8/11	0.0	8/7	0.0	8/1	1.0	8/3	1.0
	安芸市 僧津	8/11	1.0	8/7	11.0	8/1	2.0	8/3	0.0
	越知町 今成	8/4	2.0	8/11	5.5	8/5	2.5	8/9	0.5
	いの町 枝川	8/4	1.0	8/11	1.0	8/5	0.0	8/9	0.0
	須崎市 上分	8/6	0.0	8/3	7.0	8/2	0.5	8/8	1.0
	津野町 三間川	8/6	0.0	8/3	3.0	8/8	0.0	8/8	0.0
	中土佐町 上ノ加江	8/10	0.0	8/13	3.0	8/5	5.0	8/3	0.0
	四万十市 鍋島	8/11	0.5	8/7	0.0	8/8	1.5	8/1	0.0
	四万十市 間崎	8/11	0.5	8/7	0.0	8/8	0.5	8/1	1.5
卵塊数の数／調査地点			0.9		3.5		1.4		0.4
8月 中旬	安芸市 川北	8/30	11.0	8/31	5.0	8/21	1.0	8/20	0.0
	安芸市 伊尾木	8/30	0.0	8/31	7.0	8/21	2.0	8/20	2.0
	安芸市 土居	8/30	17.0	8/31	7.0	8/21	3.0	8/20	3.0
	越知町 今成	8/20	0.5	8/21	3.5	8/22	5.0	8/27	1.0
	いの町 枝川	8/23	0.5	8/21	0.5	8/22	3.0	8/27	1.0
	須崎市 上分	8/27	3.0	8/26	1.0	8/22	7.5	8/31	18.0
	津野町 三間川	8/27	0.0	8/26	1.5	8/19	0.0	8/27	0.0
	中土佐町 上ノ加江	8/27	3.0	8/26	16.0	8/30	0.0	8/31	1.5
	四万十市 鍋島	8/24	3.0	8/21	3.0	8/21	0.0	8/22	1.0
	四万十市 間崎	8/24	1.0	8/21	5.0	8/21	1.0	8/22	0.5
卵塊数の数／調査地点			3.9		5.0		2.3		2.8
9月 中・下旬	安芸市 川北	9/22	2.0	9/30	5.0				
	安芸市 伊尾木	9/22	2.0	9/30	4.0				
	安芸市 土居	9/22	0.0	9/30	8.0				
	越知町 今成	9/15	3.5	9/16	11.0	9/19	6.5	9/19	1.0
	いの町 枝川	9/16	3.5	9/18	4.5	9/18	4.5	9/19	4.0
	須崎市 上分	9/22	0.0	9/24	0.0	9/24	9.5	9/21	1.0
	津野町 三間川	9/22	0.0	9/24	0.0	9/26	0.0	9/25	1.0
	中土佐町 上ノ加江	9/27	0.0	9/24	11.5	9/24	0.5	9/26	0.0
	四万十市 鍋島	9/22	0.0	9/28	7.5	9/18	10.0	9/19	2.5
	四万十市 間崎	9/22	1.0	9/28	5.0	9/18	11.0	9/19	4.5
卵塊数の数／調査地点			1.2		5.7		6.0		2.0

安芸市僧津は令和2年以降、平成16年～令和元年：安芸市黒鳥、平成15年以前：芸西村和食で調査

越知町今成は平成16年以降、平成15年までは土佐市新居で調査

四万十市鍋島は平成25年以降、平成24年までは四万十町竹島で調査

注) 複数の調査地点における調査結果を調査時期ごとに平均し、調査地点あたりの卵塊数とした。なお、それぞれの調査地点において50株に満たない場合もしくは越える場合には、各調査地点ごとに50株に換算した。

(2) 定期調査


農業技術センター昆虫担当調べ

調査月日	6/2	6/9	6/16	6/23	6/30	7/7	7/14	7/20	7/27	8/5	8/10	8/19
令和3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.44	0.57	0.82	0.40	1.07	0.17	0.15
令和2年	0.00	0.00	0.24	0.86	0.63	0.17	0.86	1.00	1.86	2.00	0.50	0.86
平年値	0.00	0.01	0.07	0.44	0.51	0.52	0.88	1.01	1.33	1.95	0.98	1.25

調査月日	8/26	8/31	9/7	9/15	9/20	9/29	10/4	10/11	10/20	10/25	11/2
令和3年	0.00	0.98	1.82	1.06	0.00	0.07	0.50	1.83	0.88	0.38	0.38
令和2年	4.00	2.00	0.43	0.67	1.13	1.86	1.00	0.57	0.38	0.29	0.14
平年値	3.15	1.76	0.76	1.12	1.06	1.18	0.52	0.42	0.12	0.20	0.19

注1) 平年値：平成23年～令和2年の6月1半旬～11月1半旬に実施した調査結果より算出した。

調査地：南国市廿枝（農業技術センター）



6 フェロモントラップによる果樹カメムシ類の半旬別誘殺数調査

調査方法：黄色昆虫誘引器を高さ約100 c mに設置し、3～7日おきに誘殺数を調査した。

東 部		調査地:安芸市井ノ口						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	3	0	0	0	0	1	4
	平 年	0.2	0.3	0.4	0.3	0.5	0.9	2.6
5	本 年	2	5	17	20	23	23	90
	平 年	1.3	1.6	5.1	10.6	9.5	7.8	35.9
6	本 年	12	14	13	10	13	18	80
	平 年	8.1	7.1	4.3	8.8	12.4	18.1	58.8
7	本 年	23	24	17	15	29	10	118
	平 年	32.4	43.3	48.7	50.5	57.4	50.7	283.0
8	本 年	4	5	7	3	7	17	43
	平 年	46.2	27.0	16.8	8.8	3.5	5.6	107.9
9	本 年	31	14	9	8	6	8	76
	平 年	7.5	7.8	4.5	2.9	3.7	3.8	30.2
10	本 年	13	17	11	6	1	8	56
	平 年	3.5	3.1	2.4	2.7	1.7	2.2	15.6
11	本 年	6	4	0	0	0	0	10
	平 年	1.6	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	2.7

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均

中央部		調査地:香美市十佐山田町						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	0	0	0	0	1	1	2
	平 年	0.4	0.7	0.6	1.0	2.2	2.8	7.7
5	本 年	1	2	7	4	4	3	21
	平 年	11.5	34.9	28.9	35.2	4.0	3.0	117.5
6	本 年	6	8	10	7	6	4	41
	平 年	30.7	29.8	27.6	25.9	20.3	41.3	175.6
7	本 年	1	2	1	1	2	3	10
	平 年	50.6	53.0	50.6	43.5	42.6	119.6	359.9
8	本 年	3	3	0	0	2	8	16
	平 年	91.5	48.6	29.8	24.9	21.7	24.1	240.6
9	本 年	13	13	8	4	6	9	53
	平 年	23.0	17.2	12.9	13.9	14.1	21.6	102.7
10	本 年	10	6	14	9	5	5	49
	平 年	33.4	10.8	12.7	10.4	9.1	2.1	78.5
11	本 年	4	2	0	1	1	0	8
	平 年	2.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.1	4.7

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均


中西部		調査地:須崎市浦ノ内						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	34	4	3	8	26	13	88
	平 年	2.3	2.4	7.2	9.4	11.7	27.6	60.6
5	本 年	16	28	42	67	68	10	231
	平 年	68.5	49.2	39.6	39.7	36.6	27.2	260.8
6	本 年	5	4	8	5	2	4	28
	平 年	35.1	44.1	40.6	51.3	65.0	85.8	321.9
7	本 年	10	1	1	3	3	2	20
	平 年	80.5	106.8	98.6	113.1	79.3	143.0	621.3
8	本 年	2	3	9	7	13	25	59
	平 年	111.4	45.8	16.8	22.3	28.6	32.2	257.1
9	本 年	47	73	90	105	59	47	421
	平 年	26.9	27.3	42.2	38.0	36.2	72.8	243.4
10	本 年	36	35	35	21	0	6	133
	平 年	82.5	59.2	65.2	19.2	10.8	8.3	245.2
11	本 年	1	2	2	2	0	0	7
	平 年	4.6	2.2	1.3	0.6	0.4	0.0	9.1

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均


西部		調査地:四万十市竹島						
年月	半旬	1	2	3	4	5	6	計
R3.4	本 年	48	2	4	5	7	10	76
	平 年	1.9	2.1	1.5	5.4	6.5	7.0	24.4
5	本 年	15	21	67	65	50	4	222
	平 年	14.7	19.5	36.2	36.0	20.0	32.9	159.3
6	本 年	19	24	31	48	32	27	181
	平 年	18.7	28.5	51.4	36.8	35.1	54.8	225.3
7	本 年	26	2	0	0	2	0	30
	平 年	63.6	90.9	88.6	77.5	76.5	97.9	495.0
8	本 年	2	4	8	10	45	162	231
	平 年	79.1	54.8	15.6	14.2	11.8	6.9	182.4
9	本 年	319	144	82	56	353	151	1105
	平 年	10.8	17.5	7.9	8.9	11.8	19.5	76.4
10	本 年	19	18	135	101	2	49	324
	平 年	27.4	12.1	17.6	11.3	4.9	5.0	78.3
11	本 年	10	0	0	0	0	0	10
	平 年	2.5	1.6	1.2	0.7	0.3	0.1	6.4

平年値:平成23年～令和2年の測定値の平均


東部／調査地：安芸市井ノ口




中央部／調査地：香美市土佐山田町宮ノ口



中西部／調査地:須崎市浦ノ内



西部／調査地:四万十市竹島



特殊病害虫等侵入警戒調査結果

1 アリモドキシゾウムシ

調査時期

第1回調査 令和3年 8月2日～8月27日

第2回調査 令和3年 10月4日～11月2日

調査方法及び結果

県内27市町村181地点に誘引トラップを設置し誘殺状況を調査した結果、いずれの地点でも対象虫の誘殺は確認されなかった。

振興センター 普及所	調査市町村名（トラップ設置数）	設置数	誘殺数
安 芸	安芸市(10) 奈半利町(2) 田野町(5) 安田町(3) 芸西村(2)	24	0
	室戸支所 室戸市(35*)	35	0
中央東	香美市(5) 香南市(21) 南国市(17*)	43	0
嶺 北	本山町(2) 土佐町(2*)	4	0
中央西	土佐市(3) いの町(6)	9	0
高 知	高知市(15) (旧春野町(1)含む)	15	0
高 吾	仁淀川町(3) 越知町(2) 佐川町(2) 日高村(1)	8	0
須 崎	須崎市(7) 中土佐町(4) 津野町(5)	16	0
高 南	四万十町(5)	5	0
幡 多	四万十市(5) 宿毛市(2) 土佐清水市(5) 黒潮町(4) 大月町(6)	22	0
計	27 市町村	181	0

*：欠測等により、第1回調査と第2回調査で調査数が異なる。

2 ミバエ類

調査対象

チチュウカイミバエ、ミカンコミバエ種群、ウリミバエ

調査地点

①安芸郡北川村野友 ②安芸郡奈半利町奈半利 ③南国市日章 ④高知市五台山
⑤須崎市浦ノ内 ⑥四万十市名鹿 ⑦宿毛市片島

調査期間

令和3年4月～令和3年12月

調査方法及び結果

誘引剤を入れたスタイナー型トラップを各調査地点に1箇所ずつ設置し、4月、11月及び12月は月1回、それ以外の月は2回、誘引されたミバエ類の種類及び虫数を調査した。

結果は下表のとおりで、在来ミバエ類は誘引されたが、侵入警戒の調査対象であるチチュウカイミバエ、ミカンコミバエ種群、ウリミバエは確認されなかった。

北川村野友						奈半利町奈半利					
月 日	チチュウカイミバエ	ミカンコミバエ	ウリミバエ	その他のミバエ	備考	月 日	チチュウカイミバエ	ミカンコミバエ	ウリミバエ	その他のミバエ	備考
4月26日	0	0	0	0		4月26日	0	0	0	0	
5月17日	0	0	0	0		5月17日	0	0	0	0	
5月31日	0	0	0	0		5月31日	0	0	0	0	
6月14日	0	0	0	0		6月14日	0	0	0	0	
6月28日	0	0	0	0		6月28日	0	0	0	0	
7月12日	0	0	0	0		7月12日	0	0	0	0	
7月26日	0	0	0	0		7月26日	0	0	0	ミスジミバエ	1
8月16日	0	0	0	0		8月16日	0	0	0	0	
8月30日	0	0	0	ミスジミバエ	2	8月30日	0	0	0	0	
9月13日	0	0	0	0		9月13日	0	0	0	0	
9月27日	0	0	0	0		9月27日	0	0	0	0	
10月11日	0	0	0	0		10月11日	0	0	0	0	
10月25日	0	0	0	0		10月25日	0	0	0	0	
11月29日	0	0	0	0		11月29日	0	0	0	0	
12月27日	0	0	0	0		12月27日	0	0	0	0	

南国市日章						高知市五台山					
月 日	チチュウカイミバエ	ミカンコミバエ	ウリミバエ	その他のミバエ	備考	月 日	チチュウカイミバエ	ミカンコミバエ	ウリミバエ	その他のミバエ	備考
4月26日	0	0	0	ミスジミバエ	2	4月26日	0	0	0	ミスジミバエ	419
5月17日	0	0	0	0		5月17日	0	0	0	ミスジミバエ	81
5月31日	0	0	0	0		5月31日	0	0	0	ミスジミバエ	3
6月14日	0	0	0	0		6月14日	0	0	0	0	
6月28日	0	0	0	ミスジミバエ	3	6月28日	0	0	0	ミスジミバエ	2
7月12日	0	0	0	ミスジミバエ	24	7月12日	0	0	0	ミスジミバエ	1
7月26日	0	0	0	ミスジミバエ	51	7月26日	0	0	0	ミスジミバエ	3
8月16日	0	0	0	ミスジミバエ	41	8月16日	0	0	0	ミスジミバエ	5
8月30日	0	0	0	ミスジミバエ	20	8月30日	0	0	0	ミスジミバエ	63
9月13日	0	0	0	ミスジミバエ	14	9月13日	0	0	0	ミスジミバエ	3
9月27日	0	0	0	ミスジミバエ	2	9月27日	0	0	0	ミスジミバエ	2
10月11日	0	0	0	ミスジミバエ	1	10月11日	0	0	0	0	
10月25日	0	0	0	0		10月25日	0	0	0	0	
11月29日	0	0	0	サタミバエ?	1	11月29日	0	0	0	0	
12月27日	0	0	0	0		12月27日	0	0	0	0	

須崎市浦ノ内

月 日	チチュウカイ ミバエ	ミカン コミバエ	ウリ ミバエ	その他のミバエ	備考
4月26日	0	0	0	ミスジミバエ 76	
5月17日	0	0	0	ミスジミバエ 6	
5月31日	0	0	0	0	
6月14日	0	0	0	0	
6月28日	0	0	0	ミスジミバエ 1	
7月12日	0	0	0	0	
7月26日	0	0	0	ミスジミバエ 6	
8月15日	0	0	0	ミスジミバエ 1	
8月30日	0	0	0	ミスジミバエ 8	
9月13日	0	0	0	ミスジミバエ 6	
9月27日	0	0	0	0	
10月10日	0	0	0	0	
10月25日	0	0	0	0	
11月29日	0	0	0	0	
12月27日	0	0	0	0	

四万十市名鹿

月 日	チチュウカイ ミバエ	ミカン コミバエ	ウリ ミバエ	その他のミバエ	備考
4月26日	0	0	0	ミスジミバエ 57	
5月10日	0	0	0	ミスジミバエ 10	
5月31日	0	0	0	ミスジミバエ 4	
6月14日	0	0	0	0	
6月28日	0	0	0	0	
7月12日	0	0	0	ミスジミバエ 1	
7月26日	0	0	0	ミスジミバエ 1	
8月16日	0	0	0	ミスジミバエ 1	
8月30日	0	0	0	ミスジミバエ 1	
9月13日	0	0	0	0	
9月27日	0	0	0	0	
10月11日	0	0	0	0	
10月25日	0	0	0	0	
11月29日	0	0	0	0	
12月27日	0	0	0	0	

宿毛市片島

月 日	チチュウカイ ミバエ	ミカン コミバエ	ウリ ミバエ	その他のミバエ	備考
4月26日	0	0	0	ミスジミバエ 1	
5月10日	0	0	0	ミスジミバエ 5	
5月31日	0	0	0	0	
6月14日	0	0	0	0	
6月28日	0	0	0	0	
7月12日	0	0	0	ミスジミバエ 3	
7月26日	0	0	0	ミスジミバエ 18	
8月16日	0	0	0	ミスジミバエ 23	
8月30日	0	0	0	ミスジミバエ 21	
9月13日	0	0	0	ミスジミバエ 3	
9月27日	0	0	0	ミスジミバエ 3	
10月11日	0	0	0	ミスジミバエ 1	
10月25日	0	0	0	0	
11月29日	0	0	0	0	
12月27日	0	0	0	0	

3 プラムポックスウイルス（PPV）

調査時期：令和3年6月2～8日

調査方法：県内3市村、9ほ場において、目視により発生の有無を調査した。また、各調査地点においておおむね5葉をサンプリングし、神戸植物防疫所にウイルス検定を委託した。

結果は下表のとおりで、いずれの地点でもPPVは確認されなかった。

調査年月日	市町村名	場所	調査植物	調査本数	症状が確認された本数	ウイルス検定結果
6月2日	香南市	夜須町	ウメ、スモモ	36	0	－
6月4日	北川村	モネの庭	ウメ、チェリープラム	4	0	－
6月4日	北川村	モネの庭	ウメ	1	0	－
6月4日	北川村	モネの庭	スモモ、ハナモモ、チェリープラム	5	0	－
6月8日	高知市	牧野植物園	スモモ	5	0	－
6月8日	高知市	牧野植物園	ウメ、扁桃	8	0	－
6月8日	高知市	牧野植物園	ウメ	6	0	－
6月8日	高知市	牧野植物園	ウメ	1	0	－
6月8日	高知市	高知城	ウメ	60	0	－

Ⅷ 各種情報の提供状況

病害虫発生予察情報

情報の種類 (名称)		発令月日	対象作物	対象病害虫	情 報 内 容
月報・予報		各月上旬	水稻、柑橘、野菜類等	全般	各作物における主な病害虫の発生状況とそれに対応する防除対策
警 報		本年度の発表はなし			
注意報	第 1 号	8 月 3 日	普通期稲	いもち病(穂いもち)	巡回調査結果、BLASTAM による葉いもち感染好適条件の判定結果および防除対策
特殊報	第 1 号	6 月 8 日	ナス	フタテンミドリヒメヨコバイ	本県での発生確認と防除対策
技術情報	第 1 号	6 月 4 日	普通期稲	スクミリンゴガイ	巡回調査結果と防除対策
	第 2 号	6 月 4 日	早期稲	いもち病(葉いもち)	巡回調査結果、BLASTAM による葉いもち感染好適条件の判定結果および防除対策
	第 3 号	6 月 28 日	早期稲	アザミウマ類	すくい取り調査結果等と防除対策
	第 4 号	7 月 1 日	カンショ	サツマイモ基腐病	発生確認と防除対策
	第 5 号	7 月 16 日	早期稲	斑点米カメムシ類	すくい取り調査結果等と防除対策
	第 6 号	8 月 5 日	普通期稲	トビイロウンカ	巡回調査結果と防除対策
	第 7 号	8 月 31 日	普通期稲	トビイロウンカ	巡回調査結果と防除対策
	第 8 号	8 月 31 日	普通期稲	斑点米カメムシ類	すくい取り調査結果等と防除対策
	第 9 号	9 月 22 日	果樹類	果樹カメムシ類	フェロモントラップ調査結果と防除対策

3 高農セ第 208 号
令和 3 年 8 月 3 日

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について
病虫害発生予察注意報第 1 号を送付します。

令和 3 年度病虫害発生予察注意報第 1 号

病虫害名 イネいもち病（穂いもち）

1. 対象作物 水稻（普通期稲）
2. 発生地域 県内全域
3. 発生時期 8 月中旬以降
4. 発生状況と注意報の根拠
 - 1) 7 月中、下旬に実施した普通期稲の病虫害発生予察巡回調査では、葉いもちの発生面積が平年に比べて約 1.7～19.5 倍とかなり多く、ずり込み症状を呈するような発生程度の高い圃場も多い（写真 1、表 1）。
 - 2) 高知県版 BLASTAM（アメダスデータを用いた葉いもち感染予測システム）では、7 月上、中旬までに県内の広い範囲で感染好適日が複数回出現しており（表 2）、葉いもちの多発生につながったと考えられる。7 月 19 日の梅雨明け以降には、感染好適日の出現は見られていないが、高松地方気象台が 7 月 29 日に発表した 1 か月予報では、晴れの日が多いものの、降水量はほぼ平年並と予想されており、出穂期と曇雨天が重なった場合には、葉いもちから多量の病原菌の胞子が飛散して穂いもちが多発すると予想される。
5. 防除対策
 - 1) 穂いもちの防除適期は出穂直前および穂揃期で、薬剤の使用時期（収穫前日数）に注意して薬剤を選定する。
 - 2) 薬剤防除に関しては、県の「病虫害防除指針」を参照し、農薬の使用基準を遵守するとともに、周辺作物への薬剤の飛散に十分気をつける。
(<http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/haishinfile/list/kochi>)



写真 1 葉いもちの多発生によるずり込み症状

表 1 普通期稲における 7 月の葉いもちの発生面積

	本年発生面積 (ha)	平年発生面積 (ha)	作付面積 (ha)	備 考
東 部	89.6	4.6	395	
中央部	665.1	346.5	1,247	ずり込み症状が見られる
中西部	1,485.7	855.5	2,381	ずり込み症状が見られる
西 部	674.0	317.5	917	ずり込み症状が見られる
県合計	2,914.4	1,524.1	4,940	

注) 調査日は 7 月 14 日～7 月 27 日

表 2 BLASTAM による葉いもち感染好適条件の判定結果 (令和 3 年 7 月 1 日～31 日)

日 付	本 川	本 山	大 栃	高 知	後 免	日 章	安 芸	梶 原	須 崎	窪 川	室 戸 岬	江 川 崎	佐 賀	宿 毛	中 村	清 水
7/1	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—
7/2	1	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	—
7/3	—	●	—	3	—	3	—	●	—	●	—	—	—	●	3	—
7/4	●	●	—	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
7/5	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
7/6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/8	—	—	2	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—
7/10	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
7/11	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
7/12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/13	—	●	—	—	—	—	—	●	2	—	—	—	—	—	—	—
7/14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
7/15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	2	—	—	—
7/16	●	●	●	2	2	—	2	●	●	●	—	2	—	2	2	—
7/17	●	4	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—
7/18	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/19	4	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	3	—	●	—
7/20	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7/31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<BLASTAM の判定表示説明>

感染好適条件 (●) : 葉面湿潤条件がいもち病菌の感染に十分な 10 時間以上を満たしており、湿潤時間中の平均気温が 15～25℃、かつ前 5 日間の平均気温が 20～25℃で、これらの条件がすべて満たされるとき、葉いもちの大量感染に好適な気象条件が出現したものと判断して「感染好適日」とし、●印で表示しています。

準感染好適条件 (1～4) : 葉面湿潤時間は充分であるが、その他の条件が一部不足している場合を「準感染好適日」としています。その際、判定の条件の違いを数字で示しています。1 は前 5 日間の平均気温が 20℃未満であるが、湿潤時間は条件を満たす場合、2 は前 5 日間の平均気温は 25℃を超えているが、湿潤時間は条件を満たす場合、3 は湿潤時間中の平均気温は 15～25℃でないが、湿潤時間は条件を満たす場合、4 は湿潤時間中の平均気温は 15～25℃であるが湿潤継続時間が不足している場合にあたります。これらの準感染好適日が続いても発病が始まるので注意が必要です。

詳細および上記の期間以外の判定結果につきましては、病害虫防除所のホームページに掲載していますのでご参照下さい (<https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/info/dtl.php?ID=9210>)。

お問合せは、病害虫防除所 (TEL : 088-863-1132) または環境農業推進課 (TEL : 088-821-4861) まで

関係各位

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について

令和 3 年度病虫害発生予察特殊報第 1 号を送付します。

令和 3 年度病虫害発生予察特殊報第 1 号

1 病虫害名 フタテンミドリヒメヨコバイ *Amrasca biguttula* (Ishida, 1913)

2 発生作物 ナス

3 発生確認の経過、発生状況

(1) 発生確認の経緯

令和 3 年 5 月、県東部の施設ナスほ場において、葉が黄化する症状が確認され、被害葉上にて翅末端に一对の黒点があるヨコバイが確認された（写真 1、2）。

ほ場から虫体を採集し、農林水産省神戸植物防疫所に同定依頼したところ、本県ではこれまで未確認のフタテンミドリヒメヨコバイであることが判明した。

(2) 他府県等での発生状況

国外では、台湾、中国、インドなどに分布し、ナス、トマト、ジャガイモのほかオクラ、ワタ、ハイビスカスの害虫とされている。

国内では、沖縄県のオクラで発生が確認されているほか、平成 17 年（2005 年）に東京都のナス、オクラ、ハイビスカスで本種による被害が報告されている。また、令和 2 年には熊本県のオクラでの発生の報告がある。

4 形態・生態

(1) 形態

成虫の体長は 2.7～3.2 mm。複眼は白色、頭胸部は黄緑色、上翅は半透明白色で翅の末端に一对の黒点がある（写真 3）。終齢幼虫の体長は 2.4～3.2 mm。全身がほぼ黄緑色で複眼は白色（写真 4）。

(2) 生態

雌成虫は、葉脈に黄白色の卵を一度に 15 卵ほど産卵する。卵は孵化直前には灰色がかった黄色になる。卵は 4～11 日で孵化し、幼虫期間は 7～21 日、成虫の寿命は 35～50 日である。

5 被害の特徴

幼虫・成虫とも新葉や茎から吸汁する。葉の黄化・奇形を呈し、生育が抑制される（写真 1）。

6 防除対策

- (1) 現時点で、ナスにおいて本種に適用登録のある農薬はない。
- (2) 成虫の侵入を防ぐために、開口部に 2mm 目以下の防虫ネットを設置する。
- (3) 栽培終了時には、近隣の作物へ本種が移動しないように、蒸し込み処理を行った後に残渣処理を行う。

お問合せは、病害虫防除所（TEL：088-863-1132）または環境農業推進課（TEL:088-821-4861）まで



写真1 被害状況



写真2 寄生状況



写真3 成虫



写真4 幼虫

ホームページにおける情報発信（令和３年１月～令和３年１２月末）

１ 目 的

農家および関係機関への迅速かつ正確な情報提供に資するため、インターネットを活用し、ホームページを運営した。

２ 利用状況

月	アクセス数		延べアクセス件数 (月末現在)	更新回数	更新内容
	件／月	件／日			
1	1,590	51.3	1,590	4	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報
2	1,422	50.8	3,012	4	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報
3	1,272	41.0	4,284	5	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報、新しい病害虫
4	1,690	56.3	5,974	4	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報
5	2,759	89.0	8,733	10	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報、BLASTAM
6	5,037	167.9	13,770	24	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報、BLASTAM、技術情報第１号、第２号、第３号、特殊報第１号
7	4,545	146.6	18,315	18	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報、BLASTAM、技術情報第４号、第５号
8	3,107	100.2	21,422	9	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報、BLASTAM、注意報第１号、技術情報第６号、第７号、第８号
9	2,813	93.8	24,235	9	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報、技術情報第９号
10	2,874	92.7	27,109	8	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報
11	2,062	68.7	29,171	6	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報
12	1,919	61.9	31,090	4	月報、予報、病害虫発生状況速報、気象情報

注）環境農業推進課調べ

注)アクセス数のカウントは、Google Analytics による計測である。

Ⅸ 病虫害診断実施状況（令和３年１月～令和３年１２月末）

原因別診断 依頼件数	病 害 虫				その他 不 明	合計
	病 害			虫 害		
	糸状菌病	細菌病	ウイルス病			
	28	6	11			
作物別診断 依頼件数	普通作物	野菜	果樹	花き	その他	合計
	6	87	12	10	0	115

病虫害診断システムへの入力件数の集計（農業技術センター病理担当・昆虫担当の診断件数を含む）

X 令和3年の気象

気象概況（令和3年1月～令和3年12月）

1 月

（上旬）冬型の気圧配置となることが多く、7日は強い冬型の気圧配置の影響で雪やみぞれが降った。
（中旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、低気圧や前線の影響で雪や雨の降った日があった。
（下旬）期間の前半は前線や低気圧の影響で雨の降った日が多かった。後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、冬型の気圧配置が強まった28日はみぞれが降った。

平均気温：平年並から高かった（平年差 $\pm 0.0^{\circ}\text{C}$ ～ $+0.7^{\circ}\text{C}$ ：アメダス値）。

降水量：平年並から多かった（平年の88%～146%：アメダス値）。

日照時間：多かった（平年の107%～142%：アメダス値）。

2 月

（上旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、雨の降った日もあり、8日は寒気の影響でみぞれが降った。

（中旬）期間の前半は曇や雨の降った日が多く、14日から15日にかけては低気圧の影響で大雨となった。後半は晴れた日が多かったが、冬型の気圧配置が強まった17日から18日にかけてはみぞれや雪が降った。

（下旬）期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、後半は湿った空気や前線を伴った低気圧の影響で雨の降った日が多かった。

平均気温：高かった（平年差 $+1.5^{\circ}\text{C}$ ～ $+2.3^{\circ}\text{C}$ ：アメダス値）。

降水量：平年並だった（平年の67%～170%：アメダス値）。

日照時間：東部でかなり多く、中部は山間部でかなり多く沿岸部で多く、西部は高幡の山間部でかなり多く、その他は平年並だった（平年の104%～135%：アメダス値）。

3 月

（上旬）高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や湿った空気の影響で雨の降った日が多かった。3日は寒気の影響でみぞれが降った。

（中旬）天気は周期的に変化した。20日は前線を伴った低気圧の影響で大雨となった。

（下旬）天気は周期的に変わり、28日は前線を伴った低気圧が四国付近を通過し大雨となった。

平均気温：かなり高かった（平年差 $+2.6^{\circ}\text{C}$ ～ $+3.5^{\circ}\text{C}$ ：アメダス値）。

降水量：全域の沿岸部でかなり多く、その他は多いところが多かった。（平年の82%～274%：アメダス値）。

日照時間：平年並だった（平年の96%～109%：アメダス値）。

4 月

（上旬）天気は周期的に変わり、高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、4日は前線が西日本を通過したため大雨となった。

（中旬）12日から13日にかけて前線を伴った低気圧の影響で大雨となった。期間の終わりは、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

（下旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、27日から気圧の谷や前線の影響で雨となり、29日は

大雨となった。

平均気温：平年並だった（平年差 $-0.3^{\circ}\text{C}\sim+0.6^{\circ}\text{C}$ ：アメダス値）。

降水量：中部や東部は平年並、西部では平年並か少なかった（平年の71%～157%：アメダス値）。

日照時間：中部や西部では多く、東部では平年並だった（平年の102%～115%：推計値）。

5 月

（上旬）天気は周期的に変わり、5日は前線が西日本を通過したため大雨となった。

（中旬）梅雨前線や湿った空気の影響で雨の日が多く、15日と20日は梅雨前線の影響で大雨となった。

（下旬）期間の中頃にかけて、梅雨前線や湿った空気の影響で雨の日が多く、26日から27日は大雨となった。後半は梅雨前線が四国の南まで南下したため晴れた。

四国地方は15日ごろ梅雨入りした。

平均気温：東部と西部は低く、中部では平年並か低かった（平年差 $-0.9^{\circ}\text{C}\sim+0.1^{\circ}\text{C}$ ）。

降水量：かなり多かった（平年の129%～218%）。

日照時間：東部と西部は少なく、中部はかなり少なかった（平年の69%～80%）。

6 月

（上旬）3日夜から4日朝にかけて梅雨前線や湿った空気の影響で大雨となったが、その他の期間は、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

（中旬）梅雨前線や湿った空気の影響で雨の日が多く、16日と19日は大雨となった。

（下旬）期間の初めと終わりは高気圧に覆われて晴れる日があったが、前線や湿った空気の影響で雨の日が多く、24日から26日は大雨となった。

平均気温：西部では平年並、中部と東部は低かった（平年差 $-0.4^{\circ}\text{C}\sim+0.3^{\circ}\text{C}$ ）。

降水量：中部と西部は少なく、東部はかなり少なかった（平年の43%～103%）。

日照時間：平年並だった（平年の84%～106%）。

7 月

（上旬）梅雨前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多かった。

（中旬）上空の寒気や湿った空気の影響で雨の日が多く、16日から18日にかけては、太平洋高気圧の縁をまわり南東から湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が非常に不安定となり、東部や西部を中心に猛烈な雨が降り大雨となった。

（下旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

四国地方は19日ごろ梅雨明けした。

平均気温：平年並だった（平年差 $-0.5^{\circ}\text{C}\sim+0.3^{\circ}\text{C}$ ）。

降水量：西部の幡多では多く、高幡は平年並、東部は平年並、中部は少なかった（平年の45%～260%）。

日照時間：西部と東部は平年並、中部は多かった（平年の98%～123%）。

8 月

（上旬）期間の前半は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、後半は雨や曇りの日が多く8日から9日にかけては台風第9号の影響で大雨となった。

（中旬）高知県では、西日本付近に長く停滞した前線や太平洋高気圧の縁を回って持続的に流れ込む湿った空気の影響で断続的に雨が降り続き、記録的な大雨となった。

（下旬）期間の前半は、湿った空気の影響で雨や曇りの日が多く、21日から22日にかけては大雨となった。後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

平均気温：低かった（平年差 -1.2°C ～ -0.4°C ）。

降水量：東部ではかなり多く、中部と西部では多かった（平年の103%～361%）。

日照時間：少なかった（平年の69%～80%）。

9月

（上旬）前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。8日から9日にかけて東部を中心に大雨となった。

（中旬）前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、16日から17日にかけては前線や台風第14号の影響で大雨となった。台風通過後は、高気圧に覆われて概ね晴れた。

（下旬）期間の前半は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、後半は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。

平均気温：西部で高く、中部と東部では平年並だった（平年差 0°C ～ $+0.8^{\circ}\text{C}$ ）。

降水量：中部と西部では少なく、東部は平年並だった（平年の42%～109%）。

日照時間：西部と東部は少なく、中部はかなり少なかった（平年の63%～89%）。

10月

（上旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

（中旬）天気は周期的に変わり、晴れや曇りの日が多かったが、11日は前線の影響で大雨となった。気温について、前半は平年よりかなり高く、後半は寒気の影響により平年より低い日が多かった。

（下旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、25日は気圧の谷や湿った空気の影響で大雨となった。

平均気温：高かった（平年差 $+0.2^{\circ}\text{C}$ ～ $+1.0^{\circ}\text{C}$ ）。

降水量：少なかった（平年の24%～67%）※鳥形山を除く（計画停電により欠測あり）。

日照時間：かなり多かった（平年の121%～146%）。

11月

（上旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、8日は寒冷前線の通過で大雨となった。鳥形山アメダスでは、8日の日降水量が統計開始以来11月では1位となる161.5ミリを観測するなど、その他のアメダスでも日最大1時間降水量や日最大10分間降水量が11月の1位を更新したところがあった。

（中旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

（下旬）冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、22日と30日は寒冷前線の通過により大雨となった。

平均気温：中部と西部は低く、東部は平年並だった（平年差 -1.0°C ～ 0°C ）。

降水量：中部と西部は多く、東部は平年並だった（平年の75%～233%）。

日照時間：多かった（平年の108%～146%）。

12月

（上旬）冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

（中旬）高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、16日は前線を伴った低気圧の影響で雨が降った。17日は強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まり、山間部を中心に雪が降った。

（下旬）冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

平均気温：平年並だった（平年差 -0.4°C ～ 0.1°C ）。

降水量：少なかった（平年の23%～75%）。

日照時間：かなり多かった（平年の121%～147%）。

半旬別気象表

(1) 高知地点

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
1	1	5.3	7.1	11.4	12.7	0.8	2.4	0.0	6.6	31.4	31.7
	2	2.0	6.9	7.2	12.4	-2.4	2.2	0.0	8.1	37.9	31.1
	3	6.4	6.8	13.0	12.2	1.2	2.2	4.5	10.2	30.4	30.6
	4	7.3	6.7	13.2	12.1	2.2	2.2	0.5	11.4	41.6	29.9
	5	11.7	6.5	15.9	11.9	7.7	2.0	40.5	11.5	20.8	29.7
	6	8.4	6.4	14.0	11.9	3.1	1.8	30.5	13.3	44.0	37.1
月計(平均)		6.9	6.7	12.5	12.2	2.1	2.1	76.0	61.1	206.1	190.1

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
2	1	7.7	6.6	13.5	12.1	1.9	2.0	2.5	10.6	37.3	31.9
	2	8.8	7.0	15.5	12.5	3.4	2.3	0.0	12.3	47.0	32.0
	3	12.7	7.6	18.6	12.9	8.1	2.8	52.5	17.3	20.3	31.5
	4	5.6	8.1	12.0	13.4	0.1	3.4	0.0	22.2	45.7	31.1
	5	12.3	8.8	18.7	14.1	6.3	4.1	0.0	24.8	44.4	31.0
	6	10.5	9.4	14.8	14.6	7.6	4.7	27.0	15.0	6.5	18.4
月計(平均)		9.6	7.9	15.6	13.3	4.4	3.2	82.0	102.2	201.2	175.9

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
3	1	12.3	9.8	17.4	15.0	7.7	5.0	73.0	24.8	16.2	30.8
	2	13.3	10.2	18.1	15.4	9.0	5.3	0.0	26.0	25.4	31.8
	3	12.7	10.7	18.6	16.0	7.2	5.8	33.0	29.5	32.0	31.6
	4	15.3	11.4	20.1	16.5	10.6	6.6	88.0	31.4	32.6	30.6
	5	13.2	12.0	18.4	17.0	8.3	7.2	32.0	30.1	32.3	30.5
	6	16.2	12.8	21.7	17.9	10.5	8.0	60.0	35.0	43.6	37.5
月計(平均)		13.9	11.2	19.1	16.3	9.0	6.3	286.0	176.8	182.1	192.8

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
4	1	17.4	13.8	21.1	19.0	14.6	9.0	34.5	31.7	25.9	32.0
	2	13.9	14.7	20.0	19.9	8.3	9.9	2.0	37.3	39.7	32.2
	3	14.4	15.5	19.3	20.7	9.6	10.7	140.5	39.5	31.2	32.5
	4	14.9	16.3	20.1	21.4	9.6	11.5	10.0	39.3	40.6	32.6
	5	18.4	17.0	24.4	22.0	13.1	12.1	0.0	41.4	45.1	33.3
	6	16.2	17.7	20.8	22.7	11.2	12.9	65.5	42.4	31.6	33.5
月計(平均)		15.9	15.8	20.9	21.0	11.1	11.0	252.5	231.6	214.1	196.1

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
5	1	16.0	18.5	21.8	23.4	10.3	13.8	77.5	42.5	34.4	32.7
	2	18.4	19.2	23.4	24.1	13.3	14.6	4.0	45.9	39.7	32.0
	3	20.2	19.7	23.5	24.5	17.6	15.2	37.5	49.9	6.7	32.0
	4	22.1	20.1	24.6	25.0	20.6	15.6	182.5	46.9	2.7	32.5
	5	20.0	20.7	24.9	25.5	15.7	16.2	27.5	40.3	23.6	32.4
	6	20.5	21.2	25.4	25.8	16.2	16.9	82.0	45.3	42.4	35.8
月計(平均)		19.6	19.9	24.0	24.7	15.6	15.4	411.0	270.8	149.5	197.4

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
6	1	21.6	21.7	25.6	26.1	18.0	17.7	74.5	39.7	17.3	27.3
	2	23.2	22.3	28.2	26.6	18.9	18.6	0.5	44.6	44.5	25.3
	3	23.4	22.9	27.0	27.0	20.7	19.4	6.5	52.9	8.3	23.5
	4	22.9	23.4	27.1	27.2	19.9	20.1	129.5	65.7	15.0	21.4
	5	23.8	23.9	28.0	27.6	20.1	20.9	112.0	76.5	33.5	18.9
	6	23.0	24.6	26.9	28.2	20.8	21.8	46.5	78.4	8.0	18.4
月計(平均)		23.0	23.1	27.1	27.1	19.7	19.8	369.5	357.8	126.6	134.8

高知地点

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
7	1	26.5	25.4	30.0	29.0	24.2	22.6	22.5	73.4	14.1	20.0
	2	27.1	26.1	30.4	29.8	25.0	23.2	5.0	63.0	5.9	22.9
	3	25.9	26.8	31.1	30.6	22.5	23.7	59.0	51.5	38.9	27.1
	4	25.4	27.3	29.3	31.3	22.5	24.1	121.5	47.9	28.7	30.7
	5	27.3	27.7	31.8	31.7	23.0	24.4	0.0	53.7	53.5	32.6
	6	28.4	28.0	33.7	32.1	23.9	24.7	0.0	73.2	73.1	40.3
月計(平均)		26.8	26.9	31.1	30.8	23.5	23.8	208.0	362.7	214.2	173.6

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
8	1	28.7	28.2	33.7	32.4	24.5	24.8	0.0	58.7	47.3	34.5
	2	28.7	28.2	33.8	32.4	24.8	24.8	72.5	53.2	31.5	34.1
	3	25.6	28.1	27.6	32.3	23.7	24.8	203.5	49.7	0.7	32.9
	4	24.3	27.9	26.8	32.1	22.7	24.5	394.0	44.4	2.5	32.3
	5	27.0	27.6	30.2	31.9	24.4	24.2	171.0	38.5	14.2	31.9
	6	28.5	27.2	33.1	31.5	24.6	23.7	0.0	54.8	61.1	36.5
月計(平均)		27.2	27.9	31.0	32.1	24.1	24.5	841.0	299.3	157.3	202.2

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
9	1	27.0	26.7	30.8	31.1	24.8	23.2	11.0	63.2	13.0	28.9
	2	26.4	26.2	30.7	30.6	23.2	22.7	49.0	67.8	28.1	28.2
	3	24.6	25.5	27.9	30.0	22.5	22.0	30.0	62.7	5.9	27.2
	4	25.5	24.7	29.8	29.2	22.6	21.1	151.0	60.2	23.3	26.6
	5	24.5	23.8	30.4	28.5	19.0	20.1	5.5	61.0	41.2	26.7
	6	24.4	23.0	28.5	27.7	21.5	19.2	0.0	58.8	7.0	26.4
月計(平均)		25.4	25.0	29.7	29.5	22.3	21.4	246.5	373.7	118.5	164.0

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
10	1	24.4	22.3	30.2	27.0	19.0	18.4	0.0	48.4	53.0	26.1
	2	24.4	21.5	29.8	26.3	19.7	17.4	0.0	36.6	48.4	27.2
	3	24.6	20.6	28.6	25.6	21.6	16.3	38.5	31.6	30.9	29.1
	4	19.1	19.5	22.9	24.8	15.8	15.1	1.5	33.3	20.0	30.0
	5	15.2	18.5	19.3	23.8	11.6	14.0	39.5	33.8	19.9	30.0
	6	17.6	17.3	24.0	22.7	12.4	12.8	9.0	33.4	49.0	35.4
月計(平均)		20.8	20.0	25.8	25.0	16.5	15.7	88.5	217.1	221.2	177.8

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
11	1	17.1	16.4	23.6	21.8	11.8	11.9	0.0	22.4	39.9	28.9
	2	16.1	15.8	21.2	21.1	11.6	11.3	78.0	23.7	22.6	28.3
	3	12.6	14.8	18.6	20.1	8.0	10.4	0.0	25.7	26.0	28.0
	4	14.1	13.6	20.8	18.9	9.1	9.1	0.0	22.5	41.1	28.2
	5	12.1	12.6	17.9	18.0	7.7	8.1	40.0	18.6	26.2	28.4
	6	10.8	11.8	17.3	17.3	5.5	7.3	111.5	18.4	35.8	28.0
月計(平均)		13.8	14.2	19.9	19.5	8.9	9.7	229.5	131.3	191.6	169.8

月	半旬	平均気温 [°C]	(平年)	最高気温 [°C]	(平年)	最低気温 [°C]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
12	1	8.7	10.8	14.3	16.3	3.3	6.3	1.5	19.2	44.8	28.4
	2	12.2	9.8	17.9	15.3	7.4	5.2	0.0	17.7	39.5	29.3
	3	10.7	8.9	17.1	14.5	5.6	4.4	0.0	14.1	39.8	29.5
	4	7.3	8.4	13.3	13.9	2.1	3.9	27.0	11.1	32.1	29.5
	5	9.7	8.0	15.5	13.5	4.7	3.4	2.0	9.3	28.2	30.1
	6	4.9	7.5	10.3	13.1	0.6	2.8	0.0	8.6	44.6	38.0
月計(平均)		8.8	8.9	14.6	14.4	3.8	4.3	30.5	80.0	229.0	184.8

(2) 安芸地点

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
1	1	6.3	8.0	11.3	12.7	2.3	3.7	0.5	6.2	31.2	32.3
	2	2.7	7.8	7.5	12.5	-1.8	3.6	0.0	8.0	37.7	31.5
	3	7.4	7.7	12.6	12.3	2.8	3.5	5.0	10.4	30.3	30.9
	4	7.8	7.5	12.6	12.0	3.0	3.3	0.0	11.8	39.3	30.2
	5	12.7	7.2	16.0	11.7	9.5	3.1	40.5	11.6	19.9	30.4
	6	9.4	7.1	14.4	11.7	4.3	2.9	27.0	13.2	42.3	37.8
月計(平均)		7.8	7.6	12.5	12.2	3.4	3.4	73.0	61.2	200.7	193.1

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
2	1	8.8	7.3	14.0	11.9	2.9	3.0	7.5	10.9	36.5	32.5
	2	9.6	7.7	15.1	12.3	4.8	3.3	0.0	12.5	45.3	32.5
	3	13.4	8.2	17.8	12.8	9.1	3.8	50.5	15.6	20.6	32.1
	4	6.5	8.7	11.9	13.3	1.4	4.3	0.0	18.2	44.9	32.0
	5	13.2	9.3	17.7	13.8	7.9	4.9	0.0	19.8	44.3	32.0
	6	10.4	9.8	13.4	14.3	7.5	5.4	15.0	12.4	5.9	18.9
月計(平均)		10.3	8.5	15.1	13.1	5.5	4.1	73.0	89.4	197.5	180.0

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
3	1	13.0	10.2	17.1	14.7	7.9	5.8	37.0	21.4	20.3	32.0
	2	13.4	10.6	17.9	15.0	9.9	6.0	1.0	22.8	28.6	32.9
	3	13.2	11.1	18.4	15.5	7.6	6.5	28.5	25.9	38.1	32.8
	4	15.5	11.7	19.4	16.1	11.1	7.2	61.0	27.4	34.4	31.4
	5	13.5	12.3	17.5	16.6	8.9	7.9	57.5	24.5	31.0	31.0
	6	16.4	13.1	21.0	17.4	11.8	8.6	80.0	26.2	45.3	38.4
月計(平均)		14.2	11.5	18.6	15.9	9.6	7.0	265.0	148.2	197.7	198.5

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
4	1	18.0	14.0	21.4	18.3	14.2	9.6	17.5	24.1	18.9	33.1
	2	13.7	14.9	18.1	19.1	8.9	10.5	5.0	28.2	42.6	33.5
	3	15.5	15.6	19.9	19.7	10.1	11.3	42.5	29.7	30.9	33.6
	4	14.9	16.3	19.5	20.3	9.9	12.0	9.0	30.3	37.1	33.5
	5	17.7	16.9	22.4	20.9	12.8	12.7	0.0	31.5	47.7	33.8
	6	16.2	17.6	19.9	21.6	11.7	13.4	96.0	31.0	35.0	34.0
月計(平均)		16.0	15.9	20.2	20.0	11.3	11.6	170.0	174.8	212.2	201.5

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
5	1	16.2	18.4	20.6	22.3	11.4	14.3	79.5	31.1	27.6	33.5
	2	18.1	19.0	22.2	22.9	14.0	15.1	3.5	34.3	41.6	33.0
	3	20.2	19.5	22.8	23.4	18.1	15.6	12.5	36.0	8.4	33.0
	4	22.0	19.9	24.1	23.8	20.2	16.0	111.5	31.4	3.2	33.8
	5	19.7	20.4	23.2	24.3	16.4	16.5	54.5	26.1	24.4	33.7
	6	19.9	20.9	23.8	24.7	16.6	17.2	75.5	31.8	39.3	37.3
月計(平均)		19.4	19.7	22.8	23.6	16.1	15.8	337.0	190.7	144.5	204.3

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
6	1	21.1	21.4	24.1	25.0	18.1	17.8	32.5	32.4	16.8	28.0
	2	22.2	21.9	26.1	25.4	18.6	18.6	1.5	39.2	47.7	25.8
	3	23.3	22.5	26.9	25.8	20.6	19.4	2.5	47.0	11.7	24.3
	4	22.4	23.0	25.6	26.1	19.7	20.1	64.5	58.2	14.4	22.0
	5	23.3	23.5	27.2	26.6	19.8	20.9	48.5	64.1	39.7	19.8
	6	23.1	24.3	25.7	27.3	20.6	21.7	14.5	62.1	15.7	20.0
月計(平均)		22.6	22.8	25.9	26.0	19.6	19.8	164.0	303.0	146.0	139.9

安芸地点

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
7	1	26.0	25.0	28.5	28.0	24.0	22.5	46.0	58.8	15.2	22.4
	2	26.7	25.6	30.0	28.8	24.7	23.1	0.5	51.7	9.1	25.6
	3	25.5	26.2	29.7	29.5	22.3	23.5	14.5	45.2	36.2	29.8
	4	25.3	26.6	28.6	30.0	22.8	23.8	106.0	42.4	28.3	33.8
	5	27.1	27.0	32.1	30.4	22.7	24.1	0.0	38.1	48.3	36.5
	6	27.5	27.4	31.3	30.9	23.9	24.4	0.0	40.0	70.2	46.2
月計(平均)		26.4	26.3	30.1	29.6	23.4	23.6	167.0	276.2	207.3	194.3

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
8	1	28.0	27.6	32.3	31.2	24.4	24.6	0.0	34.2	54.2	39.9
	2	28.1	27.6	32.3	31.3	24.6	24.6	61.0	40.3	30.4	38.9
	3	26.0	27.6	27.5	31.3	23.7	24.6	145.5	43.2	1.2	36.9
	4	24.4	27.5	27.0	31.2	22.4	24.4	397.5	38.5	2.9	36.6
	5	27.0	27.2	29.5	31.0	25.0	24.1	60.0	31.4	7.4	36.8
	6	27.6	26.9	31.3	30.7	24.5	23.7	0.0	39.6	66.4	41.7
月計(平均)		26.9	27.4	30.0	31.1	24.1	24.3	664.0	227.2	162.5	230.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
9	1	27.1	26.4	30.6	30.3	24.5	23.3	0.5	46.3	15.2	31.9
	2	26.2	25.9	30.2	29.8	23.2	22.8	154.0	53.6	30.5	30.4
	3	24.3	25.3	27.0	29.2	22.3	22.1	22.5	51.5	7.4	29.1
	4	25.0	24.5	28.7	28.5	22.3	21.1	66.5	46.3	21.3	28.0
	5	24.5	23.7	29.1	27.8	20.4	20.2	0.0	41.8	44.4	27.3
	6	24.5	23.0	28.2	27.1	21.9	19.4	0.0	40.2	7.3	27.0
月計(平均)		25.3	24.8	29.0	28.8	22.4	21.5	243.5	279.7	126.1	173.7

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
10	1	23.8	22.3	29.1	26.4	19.3	18.7	0.0	36.9	52.9	27.2
	2	24.2	21.5	29.3	25.8	20.1	17.9	0.0	30.7	49.2	28.1
	3	24.6	20.7	28.1	25.1	21.7	17.0	12.5	27.9	33.1	29.5
	4	19.2	19.7	23.5	24.2	15.0	15.9	0.0	28.3	24.6	30.2
	5	15.2	18.8	19.9	23.3	11.5	14.9	39.0	25.0	22.7	30.5
	6	17.7	17.8	23.1	22.3	13.5	13.8	7.0	21.8	46.9	36.3
月計(平均)		20.7	20.1	25.4	24.5	16.7	16.4	58.5	170.6	229.4	181.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
11	1	17.4	17.0	22.9	21.6	13.0	13.0	0.0	15.7	39.2	30.0
	2	16.9	16.4	21.9	20.9	12.9	12.4	43.5	17.6	17.9	29.5
	3	13.6	15.5	18.6	20.0	9.1	11.4	0.0	19.0	33.3	29.1
	4	15.5	14.3	20.7	18.9	11.8	10.2	0.0	18.4	37.3	29.4
	5	13.3	13.5	18.5	18.1	9.0	9.4	49.5	17.5	28.9	29.1
	6	11.7	12.8	17.4	17.4	7.0	8.6	53.0	17.5	35.9	28.5
月計(平均)		14.7	14.9	20.0	19.5	10.5	10.8	146.0	105.7	192.5	175.6

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
12	1	9.4	11.8	14.1	16.4	5.0	7.6	1.0	17.1	42.1	28.7
	2	12.0	10.8	17.8	15.4	7.2	6.6	0.0	15.4	41.7	29.5
	3	11.8	9.9	16.9	14.6	7.6	5.8	0.0	12.9	43.1	30.0
	4	8.4	9.3	13.4	14.0	3.0	5.2	19.0	10.5	35.2	30.5
	5	11.3	9.0	16.1	13.6	6.9	4.8	9.0	9.0	29.9	31.2
	6	5.8	8.5	9.9	13.2	1.3	4.2	0.0	8.5	45.3	39.1
月計(平均)		9.6	9.9	14.5	14.5	5.0	5.7	29.0	73.4	237.3	189.0

(3)後免地点

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
1	1	4.6	6.3	11.0	12.1	-0.8	1.0	0.0	5.9	30.6	30.6
	2	1.1	6.2	7.0	11.8	-4.2	0.9	0.0	7.4	41.5	29.9
	3	5.3	6.1	12.5	11.6	-0.9	0.9	5.0	9.1	31.2	29.4
	4	6.5	6.0	12.5	11.4	0.6	0.9	0.5	10.0	41.7	28.8
	5	11.3	5.8	15.3	11.1	7.6	0.7	1.5	9.9	21.7	28.6
	6	7.8	5.7	13.1	11.1	2.0	0.6	-	11.4	44.4	35.7
月計(平均)		6.2	6.0	11.9	11.5	0.7	0.8	7.0	53.7	211.1	183.0

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
2	1	6.8	5.9	13.2	11.3	0.2	0.8	-	9.5	38.5	30.8
	2	7.7	6.3	15.1	11.7	1.3	1.1	-	11.7	48.2	31.0
	3	11.8	6.8	18.2	12.1	6.2	1.7	-	15.9	20.0	30.5
	4	4.7	7.4	10.9	12.6	-1.1	2.4	-	19.5	43.3	30.5
	5	11.3	8.1	17.6	13.2	4.5	3.2	-	21.0	45.1	30.5
	6	9.6	8.7	13.3	13.7	6.5	3.7	-	12.6	6.4	18.3
月計(平均)		8.6	7.2	14.8	12.4	2.7	2.2	-	90.2	201.5	171.6

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
3	1	11.5	9.1	16.8	14.2	6.9	4.0	66.5	21.1	16.7	30.7
	2	12.8	9.4	17.4	14.6	8.4	4.3	0.0	22.7	25.5	31.7
	3	11.9	10.0	17.5	15.2	5.5	4.8	25.0	26.0	33.8	31.7
	4	14.4	10.7	19.7	15.7	8.3	5.6	62.0	27.9	34.5	30.7
	5	12.4	11.3	17.5	16.2	6.9	6.3	30.0	26.6	29.7	30.2
	6	15.3	12.2	20.9	17.0	9.5	7.1	52.0	30.1	44.3	37.3
月計(平均)		13.1	10.5	18.4	15.5	7.6	5.4	235.5	154.4	184.5	192.3

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
4	1	16.8	13.2	20.0	18.1	13.9	8.2	37.0	26.9	22.9	32.2
	2	13.4	14.1	18.9	18.9	7.9	9.2	0.5	31.4	41.1	32.8
	3	14.1	14.9	18.3	19.7	9.4	10.0	75.5	33.8	32.2	33.1
	4	14.3	15.7	19.3	20.4	8.9	10.8	6.0	34.7	37.1	33.5
	5	17.5	16.4	23.0	21.1	12.0	11.6	0.0	36.3	47.5	34.0
	6	15.6	17.1	20.0	21.8	10.6	12.3	65.5	35.8	34.5	34.2
月計(平均)		15.3	15.2	19.9	20.0	10.5	10.4	184.5	198.9	215.3	199.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
5	1	15.4	18.0	20.8	22.5	9.6	13.2	72.5	35.3	31.0	33.4
	2	17.8	18.7	22.5	23.1	12.8	14.0	4.0	39.0	40.7	32.7
	3	19.8	19.1	23.1	23.5	17.0	14.5	22.5	43.4	6.1	32.6
	4	21.8	19.5	23.7	24.0	20.3	14.9	144.0	41.2	0.7	33.4
	5	19.4	20.0	23.9	24.5	15.4	15.4	25.5	35.2	21.8	33.7
	6	19.8	20.5	24.2	24.8	15.5	16.1	68.5	39.3	42.5	37.5
月計(平均)		19.0	19.3	23.1	23.7	15.1	14.7	337.0	233.4	142.8	203.3

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
6	1	21.0	21.0	25.1	25.1	17.0	16.9	56.0	35.1	17.6	28.5
	2	22.3	21.6	26.9	25.6	17.8	17.8	0.5	40.6	44.0	26.2
	3	22.9	22.2	26.7	26.1	20.3	18.7	2.5	48.7	8.2	24.3
	4	22.3	22.8	25.9	26.4	19.2	19.5	103.5	59.6	14.6	21.9
	5	23.1	23.4	27.2	26.8	19.0	20.3	29.5	67.6	34.9	19.2
	6	22.7	24.1	26.2	27.5	20.3	21.2	12.0	68.9	10.7	18.7
月計(平均)		22.4	22.5	26.3	26.3	18.9	19.1	204.0	320.5	130.0	138.8

後免地点

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
7	1	26.0	24.8	29.3	28.2	23.8	21.9	26.0	66.3	12.7	20.2
	2	26.5	25.5	29.8	29.0	24.1	22.5	5.5	57.5	5.8	23.2
	3	25.2	26.1	30.1	29.7	21.7	22.9	46.5	46.4	37.7	27.3
	4	24.9	26.5	28.6	30.2	21.8	23.2	97.0	41.7	28.0	31.1
	5	26.3	26.9	31.2	30.7	21.6	23.5	0.0	46.0	49.2	33.3
	6	27.4	27.2	32.3	31.1	22.6	23.7	0.0	65.2	71.9	42.0
月計(平均)		26.1	26.2	30.3	29.8	22.6	23.0	175.0	323.1	205.3	177.1

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
8	1	27.9	27.4	32.7	31.5	23.2	23.9	0.0	53.9	51.0	35.8
	2	28.0	27.5	33.0	31.7	23.6	23.9	44.0	49.6	29.5	34.8
	3	25.4	27.4	27.4	31.7	23.3	23.9	205.0	48.9	0.3	33.2
	4	24.1	27.2	26.7	31.5	22.6	23.7	418.5	46.0	1.4	32.7
	5	26.6	26.9	29.5	31.3	24.2	23.3	195.0	38.9	8.7	32.9
	6	27.7	26.5	32.1	30.9	23.6	22.9	0.0	49.1	61.3	37.8
月計(平均)		26.7	27.2	30.3	31.4	23.4	23.6	862.5	286.4	152.2	207.2

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
9	1	26.4	26.0	30.3	30.5	23.7	22.5	27.0	53.0	9.5	30.0
	2	25.8	25.6	30.0	30.0	22.2	21.9	60.0	55.2	27.0	29.1
	3	24.2	25.0	27.7	29.4	22.0	21.3	24.0	50.9	6.3	27.9
	4	24.9	24.1	29.1	28.6	22.1	20.3	105.5	51.0	21.4	27.1
	5	23.5	23.2	29.6	27.9	17.8	19.3	17.5	54.6	41.3	27.0
	6	23.7	22.4	28.1	27.1	20.2	18.4	0.0	51.9	6.1	26.9
月計(平均)		24.7	24.4	29.1	28.9	21.4	20.6	234.0	316.6	111.6	168.0

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
10	1	23.7	21.7	29.6	26.4	17.7	17.5	0.0	40.8	53.2	26.5
	2	23.4	20.9	29.6	25.7	18.0	16.6	0.0	31.3	50.7	27.4
	3	23.9	20.0	28.0	25.0	20.7	15.4	47.0	27.9	33.0	29.3
	4	18.3	18.9	22.3	24.2	14.4	14.1	2.5	29.5	17.0	30.3
	5	15.0	17.8	19.0	23.2	12.0	12.9	33.5	29.9	20.7	30.1
	6	17.2	16.7	22.9	22.1	11.1	11.7	4.5	29.9	48.2	35.4
月計(平均)		20.2	19.3	25.2	24.4	15.5	14.7	87.5	189.3	222.8	179.0

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
11	1	16.6	15.8	23.0	21.3	10.2	10.7	0.0	20.9	41.9	28.8
	2	15.6	15.1	20.9	20.6	10.7	10.1	32.0	22.6	20.2	28.1
	3	11.5	14.2	18.5	19.5	5.9	9.2	0.0	23.7	26.4	27.5
	4	13.2	12.9	20.9	18.4	6.9	7.9	0.0	19.7	40.1	27.7
	5	11.2	11.9	17.7	17.5	5.9	6.8	34.5	15.6	26.6	27.6
	6	9.9	11.1	16.7	16.7	3.3	6.0	110.5	16.0	34.8	27.1
月計(平均)		13.0	13.5	19.6	19.0	7.1	8.5	177.0	118.5	190.0	166.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
12	1	8.0	10.1	13.5	15.7	2.3	5.0	1.5	17.9	43.3	27.2
	2	11.8	9.1	17.1	14.7	6.9	3.9	0.0	16.7	39.7	28.0
	3	9.6	8.2	16.6	13.8	3.5	3.1	0.0	13.3	40.7	28.4
	4	6.4	7.6	12.8	13.3	0.4	2.5	27.5	10.2	32.7	28.1
	5	9.0	7.2	15.7	12.9	2.6	2.1	2.5	8.3	28.1	29.0
	6	4.2	6.8	9.7	12.5	-1.0	1.5	0.0	7.7	45.7	36.7
月計(平均)		8.0	8.2	14.1	13.8	2.4	3.0	31.5	74.1	230.2	177.4

(4) 須崎地点

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
1	1	5.3	7.1	11.1	12.9	0.7	2.3	0.0	7.1	25.7	31.1
	2	1.7	6.9	6.6	12.6	-1.9	2.2	0.0	8.8	32.7	30.6
	3	6.0	6.8	13.1	12.4	1.0	2.2	4.0	11.5	27.8	30.3
	4	7.4	6.7	13.0	12.1	1.5	2.2	0.0	13.1	37.6	29.6
	5	11.4	6.5	15.5	11.9	7.3	1.9	48.5	13.5	20.2	29.6
	6	7.9	6.4	13.5	11.8	3.0	1.7	24.5	15.9	39.6	36.9
月計(平均)		6.7	6.7	12.2	12.3	2.0	2.1	77.0	69.9	183.6	188.1

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
2	1	7.4	6.6	13.5	12.1	1.5	1.8	4.0	11.8	33.8	31.8
	2	7.9	6.9	14.7	12.5	2.2	2.1	0.0	12.4	41.5	31.9
	3	12.1	7.4	17.7	12.9	7.7	2.6	60.0	16.3	19.2	31.5
	4	4.9	7.9	11.4	13.3	-0.3	3.1	2.5	20.2	35.2	31.5
	5	12.2	8.6	18.8	13.9	5.9	3.6	1.5	22.3	40.6	32.0
	6	9.3	9.1	13.5	14.5	6.1	4.1	29.5	14.1	5.8	19.0
月計(平均)		9.0	7.8	15.0	13.2	3.7	2.9	97.5	97.1	176.1	177.7

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
3	1	11.3	9.5	15.4	14.8	6.2	4.4	89.5	25.7	13.7	31.7
	2	12.5	9.8	17.5	15.2	8.5	4.7	0.0	29.6	21.6	32.4
	3	12.1	10.3	17.2	15.8	7.0	5.2	36.0	32.7	36.1	32.3
	4	14.6	11.1	19.1	16.4	10.3	5.9	64.5	33.2	29.9	31.5
	5	12.7	11.6	17.8	16.9	7.9	6.6	28.5	31.0	38.1	31.3
	6	15.3	12.4	21.0	17.7	9.6	7.3	55.5	35.2	43.0	38.3
月計(平均)		13.2	10.8	18.1	16.1	8.3	5.7	274.0	187.4	182.4	197.5

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
4	1	16.7	13.4	20.1	18.7	13.5	8.3	37.0	31.2	20.3	32.3
	2	12.8	14.3	18.3	19.5	7.0	9.3	1.0	36.7	42.1	32.5
	3	13.9	15.0	18.7	20.1	9.0	10.1	112.0	39.3	29.3	32.5
	4	13.7	15.7	18.2	20.7	8.7	10.8	20.5	38.6	35.9	32.6
	5	17.0	16.4	21.9	21.3	11.9	11.5	0.0	39.9	43.2	33.3
	6	15.3	17.1	19.9	21.9	10.1	12.2	50.0	40.2	31.6	33.9
月計(平均)		14.9	15.3	19.5	20.4	10.0	10.4	220.5	225.9	202.4	197.1

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
5	1	15.5	17.9	20.8	22.7	9.5	13.2	106.0	40.1	37.6	33.3
	2	17.1	18.6	21.8	23.3	12.3	14.0	4.0	43.6	36.8	33.0
	3	19.0	19.0	21.9	23.7	16.6	14.5	80.0	47.7	11.0	33.0
	4	21.1	19.5	23.3	24.2	19.8	15.0	123.0	45.4	2.3	33.8
	5	19.0	20.0	23.7	24.7	14.8	15.5	23.5	41.2	25.1	33.7
	6	19.2	20.5	23.8	25.0	15.1	16.3	112.5	52.1	40.8	37.1
月計(平均)		18.5	19.3	22.6	23.9	14.7	14.8	449.0	270.1	153.6	203.9

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
6	1	20.4	21.0	24.3	25.2	16.9	17.1	53.5	49.0	14.7	28.0
	2	21.8	21.6	25.7	25.7	17.8	17.9	0.5	53.7	44.2	26.1
	3	22.5	22.2	25.6	26.1	20.3	18.8	7.0	59.9	8.0	24.5
	4	21.8	22.7	25.0	26.5	19.0	19.5	101.5	69.0	19.6	22.5
	5	22.9	23.3	26.4	26.9	19.4	20.3	0.0	73.8	28.8	20.1
	6	22.3	24.0	25.9	27.6	20.1	21.1	80.0	73.4	13.8	19.8
月計(平均)		22.0	22.5	25.5	26.3	18.9	19.1	242.5	378.8	129.1	141.0

須崎地点

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
7	1	25.6	24.7	29.0	28.4	23.2	21.9	26.0	71.1	19.4	21.8
	2	26.1	25.4	29.2	29.2	23.9	22.5	1.0	61.6	6.9	24.7
	3	24.9	26.1	29.1	29.9	22.0	23.0	26.0	48.2	35.5	28.4
	4	24.5	26.5	27.6	30.5	22.0	23.3	206.5	43.9	23.6	31.9
	5	25.9	26.9	30.5	30.8	22.0	23.6	0.5	50.4	50.6	34.5
	6	26.7	27.2	31.0	31.2	22.5	23.9	0.0	71.7	70.9	43.5
月計(平均)		25.7	26.1	29.5	30.0	22.6	23.0	260.0	346.9	206.9	184.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
8	1	27.2	27.4	31.7	31.5	23.4	24.1	8.0	63.4	49.3	36.9
	2	27.5	27.5	32.5	31.6	23.4	24.1	52.5	61.4	30.8	36.1
	3	24.6	27.4	26.9	31.6	22.7	24.1	146.5	56.0	0.2	34.6
	4	23.7	27.2	26.0	31.4	22.3	23.8	208.5	49.4	2.1	33.7
	5	25.9	26.9	29.0	31.2	23.6	23.5	16.5	43.9	14.3	33.0
	6	27.0	26.5	31.2	30.9	23.4	23.1	0.0	56.3	61.3	37.5
月計(平均)		26.0	27.2	29.6	31.4	23.1	23.8	432.0	330.4	158.0	211.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
9	1	26.5	26.0	30.3	30.5	23.8	22.6	0.0	60.4	19.4	29.4
	2	25.4	25.5	29.8	30.1	22.6	22.1	47.0	69.7	23.5	27.9
	3	23.7	24.9	26.6	29.4	21.6	21.4	44.0	72.6	4.5	26.7
	4	24.3	24.1	28.8	28.8	21.0	20.4	230.0	71.6	26.8	26.5
	5	23.5	23.3	28.7	28.1	18.5	19.4	0.5	69.5	34.8	26.9
	6	23.2	22.5	28.0	27.4	20.6	18.6	2.0	65.5	15.1	26.9
月計(平均)		24.4	24.4	28.7	29.1	21.4	20.8	323.5	409.3	124.1	164.3

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
10	1	23.1	21.7	29.2	26.7	18.0	17.8	0.0	55.8	54.4	26.7
	2	23.5	20.9	29.0	26.1	19.1	16.8	5.5	42.9	48.2	27.6
	3	23.5	20.0	27.0	25.4	21.0	15.7	70.0	34.5	26.9	29.1
	4	18.2	19.1	23.1	24.6	14.5	14.6	4.0	34.2	21.2	29.9
	5	13.7	18.1	19.1	23.6	9.9	13.6	34.5	34.4	22.1	29.4
	6	16.1	17.0	23.2	22.6	11.0	12.4	8.5	35.2	47.8	34.6
月計(平均)		19.6	19.5	25.0	24.8	15.4	15.2	122.5	237.0	220.6	177.3

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
11	1	15.8	16.1	22.6	21.8	10.5	11.5	0.0	24.8	40.0	28.5
	2	15.1	15.5	19.9	21.2	10.8	10.9	91.5	26.2	23.8	28.4
	3	11.7	14.5	17.9	20.2	7.1	10.0	0.0	27.6	31.9	28.1
	4	13.5	13.3	20.2	19.1	9.2	8.7	0.0	23.2	39.6	28.5
	5	11.6	12.4	16.8	18.2	7.3	7.8	23.5	20.1	17.9	28.2
	6	10.1	11.7	17.1	17.4	5.0	7.1	88.0	21.0	37.1	27.5
月計(平均)		13.0	13.9	19.1	19.7	8.3	9.3	203.0	142.9	190.3	169.2

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
12	1	7.9	10.7	13.4	16.4	3.2	6.1	0.5	20.8	44.1	27.7
	2	11.0	9.7	17.4	15.4	5.7	5.1	0.0	17.6	40.3	28.8
	3	10.2	8.9	16.8	14.6	4.8	4.3	0.0	13.7	43.7	29.0
	4	6.9	8.3	12.5	14.1	1.6	3.8	27.5	11.6	31.4	29.0
	5	9.9	7.9	15.4	13.8	5.2	3.3	2.0	10.6	27.2	29.9
	6	5.0	7.5	9.2	13.3	0.9	2.8	0.0	10.0	44.8	37.3
月計(平均)		8.3	8.8	14.0	14.6	3.5	4.2	30.0	84.3	231.5	181.7

(5) 中村地点

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
1	1	4.5	6.2	10.0	12.2	-0.3	0.9	0.5	10.4	25.9	28.3
	2	0.4	6.1	4.2	11.9	-4.2	0.9	11.0	12.0	17.0	27.5
	3	4.2	6.0	12.4	11.6	-1.8	0.9	6.0	14.3	32.1	27.0
	4	6.5	5.9	12.3	11.4	0.0	0.8	1.5	16.0	37.0	26.5
	5	11.4	5.7	16.4	11.3	7.1	0.7	54.0	17.5	20.9	27.0
	6	7.3	5.7	13.6	11.5	1.8	0.5	14.0	21.8	38.2	34.2
月計(平均)		5.8	5.9	11.5	11.7	0.5	0.8	87.0	92.0	171.1	170.5

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
2	1	7.4	5.9	13.9	11.8	0.3	0.6	8.5	16.1	35.4	29.4
	2	8.1	6.3	15.0	12.3	2.3	0.9	2.5	16.1	44.5	29.5
	3	11.9	6.9	16.7	12.7	7.4	1.4	66.5	19.5	11.2	29.5
	4	4.6	7.4	10.6	13.2	-0.4	2.0	4.0	23.4	35.5	29.2
	5	11.6	8.1	18.9	14.0	4.7	2.7	12.0	24.5	40.9	29.5
	6	9.9	8.7	12.9	14.5	6.6	3.3	29.5	14.9	5.1	17.7
月計(平均)		8.8	7.2	14.8	13.1	3.3	1.8	123.0	114.5	172.6	164.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
3	1	11.5	9.1	15.8	14.9	6.6	3.6	197.5	26.8	15.0	30.0
	2	12.4	9.4	18.0	15.3	7.5	3.8	0.0	30.4	18.2	30.8
	3	12.3	10.0	18.2	16.0	6.6	4.2	10.5	32.3	33.2	30.6
	4	15.1	10.7	20.9	16.7	9.6	5.0	44.5	33.0	30.2	29.5
	5	12.4	11.4	18.5	17.2	6.4	5.7	26.5	31.7	36.6	29.3
	6	15.6	12.2	22.3	18.0	9.5	6.5	49.5	35.0	39.1	36.5
月計(平均)		13.3	10.5	19.1	16.4	7.8	4.8	328.5	189.2	172.3	186.7

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
4	1	17.1	13.2	20.7	19.2	13.1	7.4	33.5	30.7	19.7	31.6
	2	12.7	14.1	20.1	20.1	6.1	8.4	0.0	35.8	42.4	32.4
	3	14.1	14.9	18.9	20.9	8.4	9.2	58.0	37.9	32.0	32.3
	4	14.2	15.7	20.0	21.5	8.2	10.1	49.0	36.9	37.4	31.6
	5	17.1	16.4	24.5	22.2	10.1	10.8	0.0	37.1	41.7	32.3
	6	15.7	17.1	21.1	23.0	9.8	11.6	55.5	37.5	34.1	32.9
月計(平均)		15.2	15.2	20.9	21.2	9.3	9.6	196.0	215.9	207.3	193.1

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
5	1	16.1	18.0	22.7	23.8	8.8	12.6	49.5	37.7	33.5	31.9
	2	17.5	18.7	23.3	24.4	11.5	13.4	7.0	39.0	39.1	31.0
	3	19.4	19.2	22.3	24.8	16.9	13.9	112.5	40.8	8.8	31.0
	4	22.0	19.6	25.4	25.3	19.6	14.4	145.5	40.4	4.0	31.5
	5	19.6	20.1	24.5	25.8	15.1	14.9	50.5	42.2	23.2	31.1
	6	19.4	20.6	25.2	26.0	14.3	15.7	110.5	59.9	36.9	34.5
月計(平均)		19.0	19.4	24.0	25.0	14.3	14.2	475.5	260.0	145.5	191.0

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
6	1	20.8	21.1	24.4	26.1	17.2	16.6	58.5	57.0	12.0	26.0
	2	22.3	21.7	28.3	26.5	17.2	17.5	2.5	61.4	33.9	23.5
	3	22.9	22.3	26.3	26.9	20.6	18.4	14.5	68.0	2.9	21.5
	4	22.5	22.8	26.3	27.2	19.0	19.1	81.5	78.7	22.8	19.8
	5	23.4	23.4	28.1	27.8	19.3	20.0	20.0	80.8	30.8	18.5
	6	22.6	24.3	26.7	28.6	20.0	20.8	60.5	72.1	16.0	19.5
月計(平均)		22.4	22.6	26.7	27.2	18.9	18.7	237.5	418.0	118.4	128.8

中村地点

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
7	1	26.3	25.1	30.5	29.6	23.5	21.7	37.0	64.6	14.7	22.0
	2	26.8	25.8	32.0	30.5	23.2	22.3	0.5	56.6	13.5	25.2
	3	26.1	26.4	32.8	31.3	21.5	22.7	15.0	47.8	39.3	28.6
	4	24.8	26.9	28.5	31.9	22.2	23.0	358.5	45.0	19.1	31.9
	5	27.0	27.2	31.2	32.3	23.5	23.3	0.0	48.5	34.3	33.9
	6	28.1	27.5	34.8	32.6	22.5	23.5	0.0	64.2	73.1	42.6
月計(平均)		26.6	26.5	31.8	31.4	22.7	22.8	411.0	326.7	194.0	184.2

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
8	1	27.3	27.6	32.8	32.8	22.8	23.7	50.0	57.6	44.6	35.9
	2	27.0	27.6	32.2	32.8	23.0	23.7	167.5	59.0	23.1	34.8
	3	24.5	27.5	26.8	32.7	22.7	23.7	178.5	57.5	0.0	33.4
	4	23.7	27.3	26.9	32.4	22.5	23.4	298.0	53.5	1.6	32.5
	5	26.8	26.9	31.2	32.1	23.6	23.0	26.0	48.0	17.0	31.9
	6	28.0	26.4	35.2	31.7	22.7	22.6	0.0	60.7	64.3	36.1
月計(平均)		26.3	27.2	31.0	32.4	22.9	23.4	720.0	336.3	150.6	204.6

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
9	1	26.7	25.9	32.4	31.1	22.9	22.1	0.0	64.3	23.2	27.7
	2	25.6	25.3	30.9	30.6	22.2	21.6	6.0	73.1	23.5	26.7
	3	23.7	24.7	27.0	29.9	21.3	20.8	26.5	75.4	5.5	26.0
	4	24.4	23.8	28.7	29.1	21.3	19.8	305.5	73.9	19.8	26.0
	5	24.2	22.9	30.1	28.3	19.2	18.8	0.5	69.2	36.5	26.4
	6	23.7	22.1	27.9	27.5	20.5	17.9	30.5	65.0	12.6	26.0
月計(平均)		24.7	24.1	29.5	29.4	21.2	20.2	369.0	420.9	121.1	158.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
10	1	22.7	21.3	30.2	26.8	16.8	17.1	0.0	57.6	53.2	25.6
	2	23.4	20.4	29.5	26.1	18.5	16.0	1.0	46.1	45.1	26.5
	3	23.8	19.4	28.6	25.4	20.8	14.7	71.0	39.1	27.6	28.3
	4	18.0	18.4	23.4	24.5	13.3	13.5	3.5	41.5	27.1	29.0
	5	13.2	17.3	18.5	23.4	9.1	12.4	35.5	42.5	17.6	28.8
	6	15.1	16.2	23.3	22.4	9.2	11.1	3.0	39.6	47.0	34.2
月計(平均)		19.2	18.8	25.5	24.8	14.4	14.1	114.0	266.4	217.6	172.4

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
11	1	15.4	15.4	22.8	21.6	9.4	10.2	0.0	23.9	42.4	28.0
	2	15.0	14.7	19.8	20.9	10.2	9.6	77.5	23.4	21.1	27.8
	3	11.2	13.7	18.8	19.8	5.2	8.6	0.0	24.4	33.5	27.3
	4	12.0	12.5	20.9	18.5	6.0	7.3	0.0	22.6	38.4	27.0
	5	11.5	11.5	16.9	17.6	7.1	6.3	25.5	22.4	20.0	26.7
	6	9.0	10.7	16.9	16.8	2.2	5.5	72.5	23.8	37.5	26.0
月計(平均)		12.4	13.1	19.4	19.2	6.7	7.9	175.5	140.5	192.9	162.8

月	半旬	平均気温 [℃]	(平年)	最高気温 [℃]	(平年)	最低気温 [℃]	(平年)	降水量 [mm]	(平年)	日照時間 [時間]	(平年)
12	1	7.4	9.8	13.2	15.8	1.8	4.6	1.0	22.3	38.6	26.4
	2	9.9	8.8	17.8	14.7	3.2	3.6	0.0	19.0	39.6	27.0
	3	9.2	8.0	16.6	13.8	2.7	2.9	0.0	16.0	42.3	26.7
	4	6.6	7.4	12.2	13.2	0.6	2.4	35.0	14.1	24.0	26.5
	5	8.7	7.1	15.6	13.0	2.9	1.9	5.5	12.8	29.1	27.4
	6	4.2	6.6	7.9	12.6	0.3	1.3	4.0	13.0	31.5	34.4
月計(平均)		7.5	8.0	13.7	13.9	1.9	2.8	45.5	97.2	205.1	168.4

XI 試験調査成績の概要

課題名：露地ねぎのシロイチモジヨトウに対する薬剤防除試験（令和3年度受託）

実施機関：農業技術センター

1 供試薬剤

展示薬剤：ブロフレア SC（ブロフラニリド 5.0%）

対照薬剤：ベネビア OD（シアントラニリプロール 10.3%）

2 試験方法

（1）試験実施場所 香美市土佐山田町新改 一般現地ほ場（露地）

（2）対象病害虫の発生状況 中発生

（3）耕種概要

品種：合黒（長系・中系）

定植日：令和3年9月1日

栽植距離：畝幅 150cm×株間 20cm×条間 20cm 4条植え

（4）区制、面積

1区：40.9 m² (17.4 m² + 23.5 m²)

試験ほ場（面積：81.8 m²）には、①長系（面積：34.8 m²）、②中系（47.0 m²）の2系統が栽培されており、それぞれの系統の栽培区画を2等分しブロフレア SC 区、ベネビア OD 区とした。

（5）処理方法

令和3年9月13日にそれぞれブロフレア SC 2,000 倍液（クミテン 5,000 倍加用）を 151.2ℓ/10a、ベネビア OD 2,000 倍液（クミテン 5,000 倍加用）を 195ℓ/10a、背負式電動噴霧器を用いて散布した。

（6）調査方法

処理直前（9/13）、処理3日後（9/16）、処理8日後（9/21）、処理14日後（9/27）に、各区60株（30株×2ヶ所）について、各株の全葉に寄生するシロイチモジヨトウの幼虫数、卵塊数を調査した。

（7）試験期間中の降雨

薬剤散布から4日目の9/17に、85.5mmの降雨があったが、試験への影響は小さかったと考えられる。

日付	9/14	9/15	9/17	9/18	9/22
降水量(mm)	16.0	6.5	85.5	20.0	17.5

（南国市後免 アメダスデータ）

（8）その他

ベネビア OD 区では、処理8日後（9/21）の調査でシロイチモジヨトウによる被害葉が多く見られたため、9/24にコテツフロアブル 2,000 倍を散布した。

3 結果

表 ネギのシロイチモジヨトウに対するプロフレア SC の防除効果

薬 剤 名	希釈倍数	調査カ所	処理前 (9/13)		処理3日後 (9/16)		処理8日後 (9/21)		処理14日後 (9/27)	
			虫数	卵塊数	虫数	卵塊数	虫数	卵塊数	虫数	卵塊数
プロフレア SC (プロフエリト 5.0%)	2,000倍	①	5	0	0	0	0	0	3	5
		②	0	0	0	0	0	3	1	6
		合計	5	0	0	0	0	3	4	11
ベネビア OD (シアントラニプロール 10.3%)	2,000倍	①	5	0	7	0	3	3	0	7
		②	2	0	6	2	5	3	2	4
		合計	7	0	13	2	8	6	2	11

注) 各調査カ所の数字は 60 株当たりを示す。

4 結果の概要及び考察

対照薬剤のベネビア OD 区では、処理 3 日後、8 日後に幼虫、卵塊が見られたのに対し、展示薬剤のプロフレア SC 区では幼虫の寄生は見られず、卵塊数も少なかった。処理 14 日後にはプロフレア SC 区でも虫数、卵塊の増加が見られ始めたものの、処理 11 日後 (9/24) にコテツフロアブルを散布したベネビア OD 区と同程度であった(表)。

以上の結果から、プロフレア SC 2,000 倍液散布のシロイチモジヨトウに対する防除効果はベネビア OD に比べて高いと考えられた。

なお、薬害は見られなかった。

課題名：かんきつのミカンハダニに対する薬剤防除試験（令和3年度受託）

実施機関：農業技術センター

1 供試薬剤

展示薬剤：サフオイル乳剤（調合油：サフラワー油及び綿実油の含量として 97.0%）

対照薬剤：トモノールS（高度製剤マシン油 97.0%）

2 試験方法

（1）試験実施場所 香南市香我美町下分 一般現地ほ場（露地）

（2）対象病害虫の発生状況 少発生

（3）耕種概要

品種：南柑 20 号（15 年生）

栽植距離：畝幅 270cm×株間 200cm

（4）区制、面積

サフオイル乳剤区および対照としてトモノールS区：各区4樹 反復無し

（5）処理方法

区	散布量 (L/10a)	使用薬剤(希釈倍率)			
		サフオイル乳剤	トモノールS	トランスフォーム	ジマンダイセン
サフオイル乳剤区	237	500	-	2,000	500
トモノールS区	217	-	200	2,000	500

令和3年6月7日に、サフオイル乳剤、トモノールSをそれぞれトランスフォームフロアブルおよびジマンダイセン水和剤と混合し、動力式噴霧器を用いて散布した。

（6）調査方法

処理直前(6/7)、処理3日後(6/10)、処理7日後(6/14)、処理14日後(6/21)に、任意の100葉/1樹（合計400葉）について、寄生するミカンハダニ雌成虫数を調査した。

（7）試験期間中の降雨

薬剤散布から12日目の6/19に、69mmの降雨があり試験に影響した可能性がある。

日付	6/14	6/16	6/18	6/19
降水量(mm)	2.5	23.0	11.5	69.0

(南国市後免アメダスデータ)

3 結果

表 カンキツのミカンハダニに対するサフオイル乳剤の防除効果

区	処理前 (6/7)	処理3日後 (6/10)	処理7日後 (6/14)	処理14日後 (6/21)
サフオイル乳剤区	128 (100)	24 (18.8)	30 (23.4)	15 (11.7)
トモノールS区	59 (100)	27 (45.8)	34 (57.6)	7 (11.9)

注) 数字は400葉(100葉×4株)当たりの雌成虫数、()は密度指数を示す

4 結果の概要及び考察

サフオイル乳剤区におけるミカンハダニ雌成虫数は、処理3、7日後の密度指数でそれぞれ18.8、23.4であり、対照のトモノールS区に比べて少なく推移した。処理14日後には密度指数で11.7とトモノールS区と同様に減少した(表)。

以上より、サフオイル乳剤500倍液のミカンハダニに対する防除効果は、この時期の慣行防除剤であるマシン油乳剤と同等以上であると考えられた。また、慣行で使用される剤との混用条件でも薬害は見られなかったことから、梅雨時に実施するミカンハダニ防除剤として組み込み可能であると考えられた。

作物名	トマト	県名	高知県	所属	高知県病害虫防除所
調査・研究課題名		担当者	宗石佳奈・下元満喜・矢野和孝		
		トマト葉かび病菌の薬剤感受性検定			

1. 目的

高知県においてトマトは主要品目の1つであり、各地で様々なブランドトマトが栽培されている。しかし、近年葉かび病による被害が急増しており、2015年にはそれまで主に利用されていた葉かび病抵抗性品種を侵すレースの発生も確認された。さらに、他県からは葉かび病の薬剤感受性の低下事例が多数報告されており、本県においても主要薬剤の効果の低下が懸念されている。

令和2年度に本県の施設トマト3ほ場から採取した葉かび病菌株を用いて感受性検定を実施したところ、供試した薬剤に対してすべての菌株の感受性低下が疑われた。

本年はさらに広い範囲から葉かび病菌株を採取して感受性検定を実施し、本県のトマト主要産地における葉かび病菌の薬剤感受性の実態をより詳しく調査した。

2. 試験方法

(1)対象地域:高知県香南市、須崎市、日高村、四万十町

(2)対象作物:トマト(施設栽培)

(3)栽培様式:施設加温栽培

(4)試験方法

試験には、2020年から2021年に県内の11ほ場(表2, A~K)で採取した菌株を用いた。単孢子分離してPDA斜面培地に保存していた各菌株をPDA平板培地に移し、25℃で2週間培養した。伸長した菌叢を約5mm×5mmに切り出し、800μlの滅菌水にけん濁して分生子けん濁液を作成した。それらを、表1に示す濃度になるように殺菌剤を添加したPDAまたはYB培地に10μlずつ滴下し、25℃、暗黒下で培養して10日後に菌叢の生育の有無を確認した。

なお、試験方法および評価方法は「植物防疫基礎講座:植物病原菌の薬剤感受性検定マニュアル2016(13) トマト葉かび病菌」に準じた。

表1 供試薬剤、検定培地および判定基準

供試薬剤	FRAC コード	検定培地		判定基準 ¹⁾
		基本培地	薬剤濃度 (ppm)	
チオファネートメチル	1	PDA	1、10	1ppmで生育しない: 感受性 1ppmで生育、10ppmで生育なし: 中等度耐性 10ppmで生育: 高度耐性
ペンチオピラド	7	YB	0.5	生育なし: 感受性 生育あり: 耐性
ボスカリド			1	
ピラジフルミド			0.5、1、5	—
アゾキシストロビン	11	PDA (代替酸化酵素 阻害剤添加)	1	生育なし: 感受性 生育あり: 耐性
ピリベンカルブ			0.5、1、5	—

注1) —: 判定基準なし

3. 結果の概要および考察

チオファネートメチル添加培地では、1ppmでは供試した107菌株すべての生育が確認され、そのうち97菌株は10ppmでも生育が確認された。

ペンチオピラド添加培地では供試した107菌株中99菌株の生育が確認され、また、それらの菌株はボスカリド添加培地においても生育が確認された。

ピラジフルミド添加培地では、供試した98菌株中0.5ppmでは90菌株、1ppmでは81菌株の生育が確認されたが、5ppmで生育した菌株は確認されなかった。

アゾキシストロビン添加培地では、供試した107菌株中100菌株で生育が確認された。

ピリベンカルブ添加培地では、0.5、1ppmともに供試した107菌株中96菌株の生育が確認されたが、5ppmで生育した菌株は確認されなかった。

以上より、対象地域内ではチオファネートメチル、ペンチオピラド、ボスカリドおよびアゾキシストロビンに対する耐性菌が多く発生していると考えられた。また、ピラジフルミドとピリベンカルブについても感受性低下の可能性が示唆されており、実用濃度で使用情况の場合の防除価を明らかにする必要がある。

4. 主要成果の具体的数字

表2 培養10日後の供試菌株の生育状況

成分名	濃度	香南市					須崎市	日高村		四万十町			合計
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
チオファネートメチル	1ppm	10/10	10/10	10/10	10/10	8/8	10/10	10/10	10/10	9/9	10/10	10/10	107/107
	10ppm	10/10	10/10	10/10	10/10	8/8	10/10	10/10	10/10	9/9	10/10	0/10	97/107
ペンチオピラド	0.5ppm	10/10	10/10	10/10	10/10	1/8	10/10	10/10	10/10	8/9	10/10	10/10	99/107
ボスカリド	1ppm	10/10	10/10	10/10	10/10	1/8	10/10	10/10	10/10	8/9	10/10	10/10	99/107
ピラジフルミド	0.5ppm	9/9	7/7	9/9	9/9	1/8	10/10	10/10	9/9	6/7	10/10	10/10	90/98
	1ppm	6/9	7/7	9/9	9/9	1/8	10/10	7/10	9/9	6/7	7/10	10/10	81/98
	5ppm	—	0/7	0/9	0/9	0/8	0/10	—	—	0/7	0/10	0/10	0/70
アゾキシストロビン	1ppm	10/10	10/10	10/10	10/10	1/8	10/10	10/10	10/10	9/9	10/10	10/10	100/107
ピリベンカルブ	0.5ppm	10/10	9/10	8/10	10/10	1/8	10/10	10/10	10/10	9/9	9/10	10/10	96/107
	1ppm	10/10	9/10	8/10	10/10	1/8	10/10	10/10	10/10	9/9	9/10	10/10	96/107
	5ppm	0/10	0/10	0/10	0/10	0/8	0/10	0/10	0/10	0/9	0/10	0/10	0/107

注)数字は 生育菌株数/供試菌株数を示す。—は未実施を示す。