

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について

令和6年度病虫害発生予察2月月報及び令和6年度予報第12号(令和7年3月)を送付します。

令和6年度病虫害発生予察2月月報

I. 気象概況 (2月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	6.0	6.6	11.4	12.1	2.0	2.0	14.0	10.6	23.5	31.9
2	2.8	7.0	8.9	12.5	-2.0	2.3	0.0	12.3	41.4	32.0
3	6.4	7.6	11.7	12.9	0.5	2.8	10.0	17.3	29.4	31.5
4	6.6	8.1	12.2	13.4	2.4	3.4	2.5	22.2	41.1	31.1
5	4.2	8.8	9.9	14.1	-0.7	4.1	0.0	24.8	42.7	31.0
6	10.0	9.4	16.5	14.6	4.8	4.7	2.0	15.0	19.9	18.4
合計及び平均	6.0	7.9	11.8	13.3	1.2	3.2	28.5	102.2	198.0	175.9

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	かなり低い	平年並	平年並
中旬	低い	少ない	多い
下旬	低い	かなり少ない	多い
月平均	かなり低い	かなり少ない	多い

気象分布図(高知地方気象台提供)から抜粋

II. 作物生育概況

- 促成キュウリ 収穫期 時期:並 生育:並
一部産地で草勢の低下や曲がり果等の発生が見られるが、日射量の増加とともに回復傾向にあり、生育は概ね順調である。
- 促成ナス 収穫期 時期:並 生育:並
一部で着果負担による草勢の低下が見られるが、好天に恵まれたことから生育は概ね順調であり、収穫量も増加傾向にある。
- 促成ピーマン・シシトウ 収穫期 時期:並 生育:並
生育は概ね順調で、収穫量も平年並で推移している。
- 促成トマト 収穫期 時期:並 生育:並
生育は概ね順調である。開花数も平年並であり、今後、気温の上昇とともに収穫量は増加する見込み。

Ⅲ. 病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般	東 部		中央部		中西部		西 部	
			面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
促成キュウリ	べと病	やや多			やや多	平年並	やや多	平年並	やや少	高
	灰色かび病	少			少	低	平年並	平年並	少	低
	菌核病	多			多	高	少	低	少	低
	うどんこ病	やや少			少	高	平年並	平年並	少	やや低
	つる枯病	やや少			平年並	平年並	平年並	平年並	少	低
	黄化えそ病	平年並			少	やや低	多	高	やや多	高
	退緑黄化病	多			多	高	多	平年並	多	高
	アブラムシ類	平年並			平年並	高	少	低	少	低
	ミナミキイロアザミウマ	やや少			少	平年並	やや多	やや高	やや多	高
	タバココナジラミ	多			やや多	高	やや多	高	多	高
	ホコリダニ類	平年並			少	平年並	少	低	多	高
促成ナス	青枯病	やや少	やや少	低	平年並	低			少	低
	灰色かび病	平年並	平年並	低	少	低			少	低
	菌核病	少	少	低	少	低			少	低
	うどんこ病	多	多	高	少	低			少	低
	黒枯病	やや少	やや少	やや低	やや少	やや低			やや少	低
	すすかび病	少	少	低	少	低			やや少	平年並
	ミナミキイロアザミウマ	少	少	低	少	低			少	低
	ヒラズハナアザミウマ	多	少	低	多	低			少	低
	タバココナジラミ	平年並	平年並	低	多	高			多	高
	ハモグリバエ類	多	多	高	多	高			多	高
促成ピーマン・シシトウ	青枯病	少	多	平年並	少	平年並	少	低		
	菌核病	平年並	少	低	多	高	少	低		
	うどんこ病	平年並	多	高	やや少	やや低	少	低		
	斑点病	平年並	少	低	やや多	平年並	平年並	高		
	黒枯病	多	多	平年並	多	高	少	低		
	アブラムシ類	多	多	高	多	低	少	低		
	ハスモンヨトウ	多	平年並	平年並	多	高	少	低		
	ミナミキイロアザミウマ	多	少	低	多	高	平年並	平年並		
	ヒラズハナアザミウマ	多	やや多	低	多	高	平年並	低		
	チャノキイロアザミウマ	少	少	低	やや少	平年並	少	低		
	タバココナジラミ	平年並	やや少	平年並	平年並	低	多	やや高		
	ホコリダニ類	多	少	低	多	高	少	低		
	コナカイガラムシ類	多	多	高	少	低	多	高		
促成トマト	青枯病	多			多	高				
	灰色かび病	少			少	低				
	菌核病	平年並			平年並	平年並				
	うどんこ病	少			少	低				
	葉かび病	やや少			やや少	低				
	すすかび病	少			少	低				
	黄化葉巻病	多			多	高				
	タバココナジラミ	多			多	高				

トラップ調査※	害虫名	東 部	中央部	中西部	西 部
	ハスモンヨトウ	少	少	少	少
	アブラムシ類	少	多	少	少

※各害虫の詳細な発生推移については、病虫害防除所のホームページに随時掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 促成キュウリ

主要病害虫の発生面積(ha)

		べと病		灰色かび病		菌核病		うどんこ病		つる枯病	
		発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病率率(%)
中央部	本年	47.5	14.8	0.0	0.0	13.6	0.2	20.8	11.8	13.6	0.6
	平年	34.7	13.8	0.7	0.1	0.8	0.1	36.5	8.1	16.5	0.7
中西部	本年	12.0	11.1	0.5	0.2	0.0	0.0	7.0	2.0	3.7	2.2
	平年	9.2	10.3	0.5	0.2	0.9	0.1	6.0	1.9	4.5	2.5
西 部	本年	5.1	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.1	1.7	0.3
	平年	7.0	7.1	0.3	0.1	0.9	0.2	6.6	5.6	3.4	1.7
合 計	本年	64.6	13.3	0.5	0.1	13.6	0.1	31.2	8.0	19.0	1.0
	平年	50.9	11.8	1.5	0.1	2.6	0.1	49.1	6.1	24.4	1.3

		褐斑病		黄化えそ病		退緑黄化病		アブラムシ類		ハスモンヨトウ	
		発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)
中央部	本年	0.0	0.0	13.6	1.7	61.0	5.2	3.5	5.8	0.0	0.0
	平年	2.4	0.6	31.8	2.5	14.1	2.0	3.0	0.1	1.2	0.1
中西部	本年	0.1	0.1	15.5	4.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	1.6	0.5	8.5	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
西 部	本年	0.0	0.0	8.5	2.2	3.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	1.3	1.7	6.7	1.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
合 計	本年	0.1	0.1	37.6	2.4	65.2	3.4	3.5	3.4	0.0	0.0
	平年	5.3	0.8	47.0	2.2	14.4	1.2	3.3	0.1	1.3	0.1

		ミナミキイロアザミウマ		タバココナジラミ		ホコリダニ類		ワタヘリクロノメイガ	
		発生面積(ha)	寄生率率(%)	発生面積(ha)	寄生率率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)
中央部	本年	27.1	10.6	20.4	4.4	0.7	0.1	0.0	0.0
	平年	47.0	10.0	16.5	1.5	1.4	0.1	0.0	0.0
中西部	本年	14.9	6.9	5.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	11.9	5.0	3.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
西 部	本年	8.5	13.8	6.8	2.7	1.7	0.2	1.7	0.2
	平年	6.9	4.7	1.4	1.2	0.6	0.1	0.1	0.1
合 計	本年	50.5	10.2	32.4	3.5	2.4	0.1	1.7	0.1
	平年	65.8	7.9	21.7	1.3	2.0	0.1	0.1	0.1

栽培面積 中央部61ha 中西部26ha 西部 17ha 合計105ha

2. 促成ナス

主要病害虫の発生面積(ha)

		青枯病		灰色かび病		菌核病		うどんこ病		黒枯病	
		発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	発病度
東 部	本年	12.6	0.1	21.1	0.1	0.0	0.0	63.3	2.1	105.5	4.5
	平年	19.7	0.4	18.3	0.3	0.7	0.1	29.0	0.4	139.6	6.5
中央部	本年	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.6
	平年	0.6	0.2	0.8	0.2	0.1	0.1	1.1	0.2	5.7	2.6
西 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.9
	平年	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	3.6	6.6
合 計	本年	13.2	0.1	21.1	0.1	0.0	0.0	63.3	2.0	112.1	4.3
	平年	20.4	0.4	19.2	0.3	0.9	0.1	30.3	0.4	148.9	6.3

		すすかび病		フザリウム立枯病		アブラムシ類		ハスモンヨトウ		ミナミキイロアザミウマ	
		発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	発病率率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)	発生面積(ha)	寄生率率(%)
東 部	本年	63.3	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	122.2	3.5	0.6	0.1	1.5	0.1	0.5	0.1	8.3	0.3
中央部	本年	4.1	3.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	7.7	7.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.3
西 部	本年	2.5	13.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	4.0	17.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.5
合 計	本年	69.9	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	133.9	3.9	0.9	0.1	1.7	0.1	0.6	0.1	9.4	0.3

		ヒラズハナアザミウマ		タバココナジラミ		ハモグリバエ類	
		発生面積(ha)	寄生率率(%)	発生面積(ha)	寄生率率(%)	発生面積(ha)	被害率率(%)
東 部	本年	0.0	0.0	189.8	2.7	126.5	7.3
	平年	0.2	0.1	173.5	6.5	5.1	0.1
中央部	本年	2.8	0.3	11.0	11.0	4.1	2.3
	平年	0.1	0.9	7.4	3.9	0.8	1.0
西 部	本年	0.0	0.0	3.8	11.0	1.3	3.0
	平年	0.0	0.0	2.5	6.5	0.1	0.1
合 計	本年	2.8	0.1	204.6	3.2	131.9	7.0
	平年	0.3	0.1	183.4	6.4	6.0	0.1

栽培面積 東部 253ha 中央部11ha 西部5ha 合計269ha

3. 促成ピーマン・シシトウ

主要病害虫の発生面積(ha)

		青枯病		菌核病		うどんこ病		斑点病		黒枯病	
		発生面積(ha)	発病株率(%)	発生面積(ha)	発病株率(%)	発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	発病度
東 部	本年	0.2	0.1	0.0	0.0	18.4	9.2	2.6	0.1	2.6	0.1
	平年	0.1	0.1	0.1	0.1	12.2	5.9	4.6	1.2	0.8	0.1
中央部	本年	0.6	0.1	0.3	0.1	34.3	6.5	34.4	3.2	24.5	0.7
	平年	2.5	0.1	0.0	0.0	44.2	10.1	28.3	2.7	7.9	0.3
中西部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.3	4.8	13.9	0.0	0.0
	平年	0.3	0.1	0.2	0.2	5.4	7.1	5.2	3.2	2.9	1.1
合 計	本年	0.8	0.1	0.3	0.1	55.9	6.9	41.8	3.4	27.1	0.5
	平年	2.9	0.1	0.3	0.1	61.8	8.7	38.1	2.4	11.6	0.3

		アブラムシ類		ハスモンヨトウ		ミナミキイロアザミウマ		ヒラズハナアザミウマ		チャノキイロアザミウマ	
		発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)	発生面積(ha)	寄生花率(%)	発生面積(ha)	寄生花率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)
東 部	本年	5.3	1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	5.3	0.8	0.0	0.0
	平年	1.7	0.2	0.7	0.1	3.3	0.9	3.8	3.0	0.6	0.3
中央部	本年	19.6	1.5	9.8	2.7	44.2	13.4	44.1	27.3	1.0	0.1
	平年	13.9	2.7	5.9	1.9	16.4	3.5	18.4	10.7	1.3	0.1
中西部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.6	1.6	0.6	0.0	0.0
	平年	1.2	1.4	0.1	0.1	1.7	0.6	1.9	4.3	0.0	0.0
合 計	本年	24.9	1.2	10.5	1.8	45.8	8.8	51.0	18.0	1.0	0.1
	平年	16.8	1.9	6.7	1.3	21.4	2.6	24.1	8.1	1.9	0.1

		タバコナジラミ		ホコリダニ類		ハダニ類		コナカイガラムシ類		ハモグリバエ類	
		発生面積(ha)	寄生葉率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害葉率(%)
東 部	本年	7.9	2.9	0.0	0.0	1.0	0.1	13.1	2.0	0.0	0.0
	平年	10.5	2.8	0.1	0.1	1.0	0.1	1.5	0.6	0.0	0.0
中央部	本年	34.4	2.3	4.9	0.1	0.0	0.0	4.9	0.4	0.0	0.0
	平年	35.3	9.5	0.0	0.0	5.7	0.7	11.3	0.9	0.5	0.1
中西部	本年	8.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.4	0.0	0.0
	平年	3.7	7.0	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
合 計	本年	50.3	3.2	4.9	0.1	1.0	0.1	19.6	0.8	0.0	0.0
	平年	49.5	7.6	0.6	0.1	6.9	0.5	12.9	0.7	0.6	0.1

栽培面積 東部 21ha 中央部 54ha 中西部 8ha 合計83ha

4. 促成トマト

主要病害虫の発生面積(ha)





		青枯病		灰色かび病		菌核病		うどんこ病		葉かび病	
		発生面積(ha)	発病株率(%)	発生面積(ha)	発病果率(%)	発生面積(ha)	発病果率(%)	発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	発病度
中央部	本年	1.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.1	0.5	0.1	6.7	1.0
	平年	1.0	0.1	3.4	0.2	0.3	0.1	6.1	0.6	10.6	4.7

		すすかび病		黄化葉巻病		タバコナジラミ	
		発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	発病株率(%)	発生面積(ha)	寄生葉率(%)
中央部	本年	0.0	0.0	16.7	1.8	16.7	2.0
	平年	10.1	1.6	5.7	0.4	3.8	0.2

栽培面積 中央部 30ha

V. トラップ調査

1. ハスモンヨトウ



2. アブラムシ類

