

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について

令和6年度病虫害発生予察6月月報及び令和6年度予報第4号(7月)を送付します。

令和6年度病虫害発生予察6月月報

I. 気象概況 (6月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	21.2	21.7	26.6	26.1	16.1	17.7	1.0	39.7	54.5	27.3
2	21.1	22.3	25.0	26.6	17.8	18.6	114.5	44.6	20.9	25.3
3	24.1	22.9	28.3	27.0	20.0	19.4	0.0	52.9	46.2	23.5
4	24.1	23.4	28.7	27.2	20.2	20.1	95.0	65.7	30.3	21.4
5	24.1	23.9	27.8	27.6	21.6	20.9	86.0	76.5	8.8	18.9
6	24.8	24.6	27.6	28.2	22.6	21.8	70.0	78.4	1.3	18.4
合計及び平均	23.2	23.1	27.3	27.1	19.7	19.8	366.5	357.8	162.0	134.8

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	低い	多い	かなり多い
中旬	高い	平年並	かなり多い
下旬	平年並	平年並	かなり少ない
月平均	平年並	平年並	多い

気象分布図(高知地方気象台提供)から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稻

早期稲 穂孕期～出穂期 時期:やや早 生育:並
生育ステージは例年に比べやや早いものの、草丈および分けつ数は概ね平年並で推移している。出穂時期は極早生品種で平年より1週間ほど早く、コシヒカリでは平年並～やや早いと見込まれている。出穂前のほ場において斑点米カメムシ類の発生が確認されており、斑点米等への影響が懸念される。
普通期稲 活着期～分けつ期 時期:並 生育:並
概ね順調に生育している。

2. カンキツ

生理落果～果実肥大初期 時期:並 生育:並
例年に比べ着花数がやや少なかったため、着果数は平年並～やや少ない。果実肥大は良好で生育も順調。地域差はあるものの、依然として果樹カメムシ類の発生が多く、被害も確認されている。

3. 新高ナシ

果実肥大期 時期:並 生育:並
暖冬の影響で開花が遅れたため、生育もやや遅れている。着果数はやや少なく、果実肥大は平年並～やや遅れ気味である。

4. 青ネギ

生育期 時期:並 生育:並
概ね順調に生育している。

Ⅲ. 病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般 (面積)	東 部		中央部		中西部		西 部	
			面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜早期稲＞	葉いもち	多	やや少	平年並	やや多	やや低	多	やや低	多	低
	紋枯病	多	少	低	少	低	少	低	多	高
	ツマグロヨコバイ	平年並	少	低	やや少	やや低	少	平年並	やや多	やや低
	ヒメビウンカ	少	少	低	やや少	やや低	少	やや低	少	やや低
	セジロウンカ	平年並	少	低	多	やや低	やや少	平年並	平年並	平年並
	トビイロウンカ	少	少	低	少	低	少	低	少	低
	イチモンジセセリ	少	少	低	少	平年並	少	低	少	低
	アザミウマ類	平年並	平年並	平年並	平年並	やや高	多	平年並	多	やや低
	イネクロカメムシ	多	多	高	平年並	平年並	少	低	多	平年並
水稲 ＜普通期稲＞	スクミリンゴガイ	平年並	やや少	やや高	平年並	平年並	やや多	やや低	やや少	やや低
	葉いもち	やや多	少	平年並	多	平年並	やや少	やや低	多	やや低
	ごま葉枯病	多	少	低	少	低	多	高	少	低
	ツマグロヨコバイ	やや少	やや少	やや低	やや多	低	少	低	少	やや低
	ヒメビウンカ	少	少	低	少	平年並	少	低	少	低
	セジロウンカ	少	少	低	少	平年並	少	低	多	平年並
	イネミズゾウムシ	少	少	平年並	少	やや低	少	平年並	少	平年並
	イネゾウムシ	多	多	平年並	やや少	平年並	少	平年並	多	平年並
カンキツ ＜温州ミカン＞	スクミリンゴガイ	やや多	平年並	やや低	やや多	やや低	多	やや低	少	低
	そうか病	多			多	やや高				
	黒点病	平年並			平年並	平年並				
	かいよう病	少			少	低				
	ミカンハダニ	やや多			やや多	低				
	アブラムシ類	少			少	低				
	ミカンハモグリガ	平年並			平年並	平年並				
カンキツ ＜中晩柑類＞	アザミウマ類	少			少	低				
	カメムシ類	多			多	やや高				
	そうか病	少	少	平年並	少	低	少	低	少	平年並
	黒点病	やや少	平年並	平年並	やや少	低	少	低	少	低
	かいよう病	少	平年並	平年並	少	低	少	低	少	低
	ミカンハダニ	平年並	やや少	低	平年並	低	平年並	やや高	多	高
	アブラムシ類	やや少	少	やや低	多	平年並	少	低	少	低
ナシ	ミカンハモグリガ	やや多	少	やや低	多	平年並	多	やや高	少	平年並
	アザミウマ類	多	少	低	多	高	多	高	少	低
	カメムシ類	多	多	高	多	やや高	多	やや高	多	高
	炭疽病	少			少	低				
青ネギ	カメムシ類	多			多	高				
	黒斑病	多			多	平年並				
	さび病	平年並			平年並	高				
	べと病	平年並			平年並	低				
	ネギアザミウマ	多			多	やや低				
	シロイチモジヨトウ	少			少	低				
トラップ調査※	アブラムシ類	平年並			平年並	平年並				
	害 虫 名	東 部	中央部 (香美)	中央部 (南国)	中西部	西 部				
	ハスモンヨトウ	平年並		やや多	平年並	多				
	アブラムシ	やや少		少	少	少				
	果樹カメムシ類	多	多		多	多				
	オオタバコガ	多		多		やや多				
トラップ調査※	タバコガ	やや少		平年並		少				

※各害虫の詳細な発生推移については、病虫害防除所のホームページに掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 早期稲

早期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

	葉いもち		ばか苗病		紋枯病		ツマグロヨコバイ		ヒメビウンカ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	18.6	27.3	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	33.7	0.0	24.0
中央部	658.1	520.3	0.1	0.0	0.0	2.0	206.1	311.4	73.1	103.9
中西部	101.9	71.0	0.0	0.1	0.0	0.0	7.3	14.3	3.6	11.2
西 部	647.5	260.6	3.0	0.1	11.9	0.0	172.3	124.5	5.9	22.0
計	1,426.1	879.2	3.1	0.2	11.9	2.5	387.8	483.9	82.6	161.1

	セジロウンカ		トビイロウンカ		イチモンジセセリ		フタオビコヤガ		アザミウマ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	414.0	403.6
中央部	126.3	85.7	0.0	0.0	3.3	10.4	0.0	1.9	1,412.7	1,596.7
中西部	18.2	27.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	182.0	129.2
西 部	89.1	92.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	3.0	519.8	342.1
計	233.6	225.2	0.0	0.0	3.3	11.6	0.0	5.3	2,528.5	2,471.6

	イネクロカメムシ		スクミリンゴガイ	
	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	51.8	0.0	155.3	201.8
中央部	20.8	25.4	1,495.8	1,594.6
中西部	0.0	0.6	318.5	251.9
西 部	56.4	20.3	136.6	197.1
計	129.0	46.3	2,106.2	2,245.4

栽培面積 東部 621ha 中央部 3,324ha 中西部 637ha 西部 1,188ha 合計 5,770ha

(2) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

	葉いもち		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ		ヒメビウンカ		セジロウンカ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	2.4	10.2	0.0	0.0	1.2	1.8	0.0	0.4	0.0	0.2
中央部	50.5	28.9	0.0	0.0	29.2	22.6	3.0	8.0	5.0	14.1
中西部	110.9	147.4	15.0	0.0	3.0	17.2	0.0	2.5	0.0	25.4
西 部	148.7	48.6	0.0	0.4	8.3	23.8	0.0	2.1	12.4	8.4
計	312.5	235.1	15.0	0.4	41.7	65.4	3.0	13.0	17.4	48.1

	トビイロウンカ		イネミズゾウムシ		イネゾウムシ		フタオビコヤガ		イチモンジセセリ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
東 部	0.0	0.0	2.0	9.1	1.2	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0
中央部	0.0	0.0	132.8	399.7	66.4	110.5	0.0	1.2	0.0	0.0
中西部	0.0	0.0	74.9	375.8	3.0	34.9	0.0	3.3	0.0	2.0
西 部	0.0	0.0	37.2	175.7	260.2	29.5	0.0	0.8	0.0	0.0
計	0.0	0.0	246.9	960.3	330.8	175.5	0.0	5.5	0.0	2.0

	スクミリンゴガイ	
	本 年	平 年
東 部	148.3	137.2
中央部	199.2	146.9
中西部	599.4	236.8
西 部	90.9	221.3
計	1,037.8	742.2

栽培面積 東部 356ha 中央部 1,195ha 中西部 2,173ha 西部 826ha 合計 4,550ha

2. カンキツ(温州ミカン,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

	そうか病		黒点病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部(温州)	71.3	37.6	71.3	66.0	0.0	1.9	118.8	98.3	6.5	17.8
東 部(中晩柑類)	40.0	88.6	60.0	59.3	10.0	9.8	134.0	170.3	10.0	37.2
中央部(中晩柑類)	0.0	4.1	157.7	214.4	0.0	38.6	210.2	260.9	52.6	23.3
中西部(中晩柑類)	2.0	12.9	73.3	146.6	0.0	56.1	345.0	293.1	13.0	34.5
西 部(中晩柑類)	1.7	5.5	0.0	43.6	0.0	7.5	79.1	15.6	0.0	17.2
中晩柑類計	43.7	111.1	291.0	463.9	10.0	112.0	768.3	739.9	75.6	112.2
カンキツ計	115.0	148.7	362.3	529.9	10.0	113.9	887.1	838.2	82.1	130.0

	ミカンハモグリガ		アザミウマ類		カメムシ類		その他カイガラムシ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	前 年
中央部(温州)	71.3	61.0	0.0	0.0	23.8	0.8	0.0	0.0
東 部(中晩柑類)	20.0	102.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
中央部(中晩柑類)	157.7	35.6	105.1	0.0	105.1	0.5	8.1	16.3
中西部(中晩柑類)	172.5	86.2	43.1	0.0	86.3	0.5	0.1	0.1
西 部(中晩柑類)	20.0	44.2	0.0	0.0	52.3	0.2	0.0	0.0
中晩柑類計	370.2	268.0	148.2	0.0	283.7	1.2	8.2	16.4
カンキツ計	441.5	329.0	148.2	0.0	307.5	2.0	8.2	16.4

温州ミカン:栽培面積 中央部 190ha

中晩柑類:栽培面積 東部 452ha 中央部 368ha 中西部 345ha 西部 333ha 合計 1,498ha

3. ナシ

主要病害虫の発生面積(ha)

	黒星病		炭疽病		カメムシ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部	2.0	3.7	12.2	20.7	3.0	0.0

栽培面積 55ha

4. 青ネギ

主要病害虫の発生面積(ha)





	黒斑病		さび病		べと病		軟腐病		ネギアザミウマ	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部	15.8	10.1	31.6	32.5	15.0	18.4	0.0	1.3	63.0	62.0

	ネギハモグリバエ		シロイチモジヨトウ		アブラムシ類	
	本 年	平 年	本 年	平 年	本 年	平 年
中央部	0.0	12.0	0.0	15.0	1.5	1.3





栽培面積 63ha

V. トラップ調査





1. ハスモンヨトウ






2. アブラムシ



3. 果樹カメムシ



4. オオタバコガ



5. タバコガ

