

各関係機関長 様

高知県病害虫防除所長

病害虫発生予察情報について

令和7年度病害虫発生予察8月月報及び令和7年度予報第6号(9月)を送付します。

令和7年度病害虫発生予察8月月報

I. 気象概況 (8月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	30.0	28.2	35.0	32.4	26.4	24.8	2.5	58.7	42.9	34.5
2	28.2	28.2	31.7	32.4	25.4	24.8	72.5	53.2	18.7	34.1
3	28.7	28.1	32.5	32.3	26.1	24.8	10.0	49.7	28.9	32.9
4	28.8	27.9	33.3	32.1	25.7	24.5	9.0	44.4	45.6	32.3
5	29.2	27.6	33.6	31.9	26.1	24.2	0.0	38.5	39.1	31.9
6	28.9	27.2	33.7	31.5	25.4	23.7	21.5	54.8	60.9	36.5
合計及び平均	29.0	27.9	33.3	32.1	25.9	24.5	115.5	299.3	236.1	202.2

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	高い	平年並	少ない
中旬	高い	少ない	多い
下旬	かなり高い	少ない	多い
月平均	かなり高い	少ない	多い

気象分布図(高知地方気象台提供)から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稻

普通期稲 幼穂形成期～糊熟期 時期:並～やや早 生育:並～やや早い

高温少雨による生育への影響は特になく、やや早めながら概ね順調に生育している。出穂時期は、ヒノヒカリと吟の夢で8月第2～3半旬頃、にこまるで8月第3～4半旬頃、収穫時期は9月中旬以降と見込まれており、平年並かやや早くなる見込みである。

2. カンキツ類

果実肥大期

時期:並

生育:並

温州ミカンは果実肥大、着果量ともに平年並である。文旦の肥大は順調であるが、平年よりやや小玉となっている。ユズは着果量は少なく推移しているが、肥大は平年より良く順調である。いずれも、高温による日焼け果の発生が見られるが、昨年より発生量は少ない。

3. 新高ナシ

果実肥大期

時期:並

生育:並

高温少雨ではあるが、果実肥大は順調で大きな遅れはなく、品質の低下も少ない。

4. 青ネギ

生育期

時期:並

生育:並

高温による葉先枯れなど、生育への影響が懸念されたが、概ね順調に生育している。

Ⅲ. 病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般 (面積)	東 部		中央部		中西部		西 部	
			面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜普通期稲＞	葉いもち	やや多	やや少	やや低	少	平年並	多	やや高	平年並	低
	穂いもち	多	少	低	少	低	多	平年並	少	低
	紋枯病	多	少	低	多	平年並	多	平年並	平年並	平年並
	もみ枯細菌病	多	少	低	少	低	多	高	少	低
	ごま葉枯病	平年並	多	平年並	やや多	平年並	少	やや低	やや多	平年並
	稲こうじ病	多	少	低	少	低	多	低	少	低
	ツマグロヨコバイ	平年並	多	平年並	少	やや低	やや少	平年並	やや少	やや低
	ヒメビウンカ	少	平年並	平年並	少	低	少	やや低	少	低
	セジロウンカ	少	平年並	低	少	やや低	少	やや低	少	やや低
	トビイロウンカ	少	少	低	少	低	平年並	やや低	少	やや低
	ニカメイガ	多	少	低	少	低	多	平年並	少	低
	コブノメイガ	少	平年並	低	少	低	少	低	少	低
	斑点米カメムシ類	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	やや多	平年並	平年並	やや低
カンキツ ＜温州ミカン＞	そうか病	少			少	低				
	黒点病	少			少	低				
	かいよう病	多			多	高				
	ミカンハダニ	平年並			平年並	平年並				
	その他カイガラムシ	多			多	高				
	コナジラミ類	多			多	平年並				
	ミカンハモグリガ	少			少	低				
カンキツ ＜中晩柑類＞	カメムシ類	少			少	低				
	そうか病	やや多	多	平年並	多	平年並	少	低	少	低
	黒点病	やや多	やや多	やや低	多	低	多	低	多	やや低
	かいよう病	多	少	平年並	多	平年並	少	低	少	低
	ミカンハダニ	多	多	やや低	やや多	やや低	平年並	平年並	多	平年並
	その他カイガラムシ	少	やや少	平年並	少	低	少	低	少	低
	ミカンハモグリガ	多	多	やや高	少	低	少	低	多	やや低
	アブラムシ類	多	多	低	少	低	少	低	少	低
ナシ	カメムシ類	少			少	低	少	低	少	低
	アザミウマ類	少			少	低	少	低	少	低
青ネギ	炭疽病	やや多			やや多	低				
	カメムシ類	少			少	低				
	黒斑病	少			少	低				
	さび病	少			少	低				
	ネギアザミウマ	高			高	平年並				
	シロイチモジヨトウ	少			少	低				

トラップ調査※	害虫名	全般	東 部	中央部 (香美)	中央部 (南国)	中西部	西 部
	ハスモンヨトウ	やや少	平年並		少	やや少	やや少
	アブラムシ	少	多		少	少	少
	果樹カメムシ類	少	少	少		少	少
	オオタバコガ	多	多		多		少
	タバコガ	多	多		多		少

※各害虫の詳細な発生推移については、病虫害防除所のホームページに掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		葉いもち	穂いもち	紋枯病	もみ枯細菌病	ごま葉枯病
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
東 部	本年	37.8	0.0	0.0	0.0	101.0
	平年	51.0	0.9	15.4	0.0	12.2
中央部	本年	93.4	0.0	96.1	0.0	814.7
	平年	162.4	5.4	22.2	0.0	617.8
中西部	本年	639.2	162.6	208.3	59.9	701.9
	平年	319.1	1.9	12.5	0.0	1,258.4
西 部	本年	189.6	0.0	81.3	0.0	576.7
	平年	222.9	0.1	69.8	0.0	436.2
合 計	本年	960.0	162.6	385.7	59.9	2,194.3
	平年	755.4	8.3	119.9	0.0	2,324.6

		稲こうじ病	ツマグロヨコバイ	ヒメトビウンカ	セジロウンカ	トビイロウンカ
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
東 部	本年	0.0	108.3	17.0	57.2	0.0
	平年	0.0	52.1	17.1	70.2	3.8
中央部	本年	0.0	8.0	0.0	13.4	0.0
	平年	43.4	40.7	77.2	88.5	41.6
中西部	本年	570.7	57.1	22.8	134.1	62.8
	平年	25.7	75.0	89.0	353.3	62.8
西 部	本年	0.0	65.8	0.0	123.8	11.6
	平年	0.0	106.7	68.5	290.7	40.4
合 計	本年	570.7	239.2	39.8	328.5	74.4
	平年	69.1	274.5	251.8	802.7	148.6

		ニカメイガ	コブノメイガ	斑点米カメムシ類
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
東 部	本年	0.0	28.0	331.8
	平年	0.9	26.2	344.6
中央部	本年	0.0	0.0	1,135.2
	平年	12.7	91.7	1,155.2
中西部	本年	642.0	0.0	2,068.6
	平年	42.8	112.2	1,706.5
西 部	本年	0.0	19.4	774.0
	平年	1.6	97.9	696.6
合 計	本年	642.0	47.4	4,309.6
	平年	58.0	328.0	3,902.9

栽培面積 東部 365ha 中央部 1,202ha 中西部 2,140ha 西部 774ha 合計 4,481ha

2. カンキツ(温州ミカン,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

		そうか病	黒点病	かいよう病	ミカンハダニ	その他カイガラムシ
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
中央部 (温州)	本年	0.0	46.5	116.3	139.6	23.3
	平年	43.7	162.9	0.0	125.6	0.0
東 部 (中晩柑類)	本年	67.7	308.3	4.7	270.6	0.3
	平年	39.8	248.5	24.8	104.1	0.5
中央部 (中晩柑類)	本年	53.1	372.0	212.6	318.8	0.0
	平年	4.1	367.9	33.7	241.0	12.2
中西部 (中晩柑類)	本年	0.0	342.0	0.0	213.8	0.0
	平年	31.6	307.8	47.1	252.1	1.3
西 部 (中晩柑類)	本年	0.0	249.0	0.0	166.0	0.0
	平年	13.7	104.9	26.8	54.3	0.0
中晩柑類計	本年	120.8	1,271.3	217.3	969.2	0.3
	平年	89.2	1,029.1	132.4	651.5	14.0
カンキツ計	本年	120.8	1,317.8	333.6	1,108.8	23.6
	平年	132.9	1,192.0	132.4	777.1	14.0

		コナジラミ類	ミカンハモグリガ	アブラムシ類	カメムシ類	アザミウマ類
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
中央部 (温州)	本年	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0
	平年	0.3	62.8	23.4	0.4	13.1
東 部 (中晩柑類)	本年	0.0	435.2	280.0	0.0	0.0
	平年	0.0	185.3	45.8	3.3	1.0
中央部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.8	74.4	5.3	5.3	0.0
中西部 (中晩柑類)	本年	0.0	42.8	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	124.9	12.8	4.3	64.1
西 部 (中晩柑類)	本年	0.0	166.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	62.6	6.8	2.2	6.2
中晩柑類計	本年	0.0	644.0	280.0	0.0	0.0
	平年	0.8	447.2	70.7	15.1	71.3
カンキツ計	本年	23.3	667.3	280.0	0.0	0.0
	平年	1.1	510.0	94.1	15.5	84.4

温州ミカン:栽培面積 中央部 186ha

中晩柑類:栽培面積 東部 453ha 中央部 372ha 中西部 342ha 西部 332ha 合計 1,499ha

3. ナシ 主要病害虫の発生面積(ha)

		炭疽病	カメムシ類
		発生面積(ha)	発生面積(ha)
中央部	本年	40.4	0.0
	平年	30.5	0.6

栽培面積 52ha

4. 青ネギ





主要病害虫の発生面積(ha)

		黒斑病	さび病	ネギアザミウマ	シロイチモジヨトウ
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
中央部	本年	0.0	0.0	57.0	0.0
	平年	1.4	0.0	51.0	23.9





栽培面積 57ha

V. トラップ調査





1. ハスモンヨトウ






2. アブラムシ



3. 果樹カメムシ類



4. オオタバコガ



5. タバコガ

