

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所長

病虫害発生予察情報について

令和7年度病虫害発生予察9月月報及び令和7年度予報第7号(10月)を送付します。

令和7年度病虫害発生予察9月月報

I. 気象概況 (9月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	28.7	26.7	33.2	31.1	25.4	23.2	142.0	63.2	37.8	28.9
2	28.9	26.2	33.4	30.6	25.0	22.7	30.5	67.8	43.0	28.2
3	27.9	25.5	31.9	30.0	24.8	22.0	24.5	62.7	32.0	27.2
4	28.2	24.7	32.6	29.2	25.3	21.1	10.5	60.2	31.4	26.6
5	25.4	23.8	29.3	28.5	23.1	20.1	46.0	61.0	11.4	26.7
6	25.2	23.0	29.7	27.7	22.0	19.2	0.0	58.8	25.4	26.4
合計及び平均	27.4	25.0	31.7	29.5	24.3	21.4	253.5	373.7	181.0	164.0

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	かなり高い	平年並	多い
中旬	かなり高い	少ない	多い
下旬	かなり高い	少ない	少ない
月平均	かなり高い	少ない	多い

気象分布図(高知地方気象台提供)から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稲

普通期稲 黄熟期～収穫期 時期:並～やや早 生育:並
収穫は9月中旬頃から始まっており、収穫のピークは9月下旬～10月上旬となる見込み。地域によっては高温による不稔が懸念されるが、全体的には収量への影響は少ないと予想される。

2. カンキツ類

温州ミカン 果実肥大期 時期:並 生育:並
果実肥大は平年並～やや大きい。高温・強日射の影響で日焼け果や裂果が発生しているものの、カメムシ類による吸汁被害はほとんどなく、収量は平年並と予想される。

中晩柑類 果実肥大期 時期:並 生育:並
着果は平年並であり、肥大は9月に入ってから降雨で増進された。中晩柑類でも日焼け果や裂果が発生しているほ場がある。収量は平年並～やや少ないと予想される。

3. 促成ナス

定植期～収穫開始期 時期:並 生育:並
定植のピークは8月下旬頃であったが、地域によっては苗の搬入遅れで定植時期を遅らせたほ場も見られた。主要品種は「PCお竜」、台木は「台太郎」、「トナシム」である。生育は特に遅れもなく概ね順調である。

4. 促成ピーマン・シシトウ 生育初期

時期:並 生育:並
ピーマンの定植時期は、南国市で8月中旬～9月中旬、土佐市では8月上旬～9月中旬頃であった。主要品種は「みおぎ」、台木は「台助」、「みやざき台木」等。高温の影響により、活着が悪く徒長気味なほ場が見られたが、昨年よりは軽度であった。シシトウの定植時期は、南国市で8月中旬、土佐市で9月上旬であった。主要品種は「土佐じしスリム」、「高育交15号」で、いずれも生育は概ね順調である。

5. 促成トマト

生育初期 時期:並 生育:並
定植時期は8月中下旬で平年並。品種は「CF桃太郎ファイト」が主体で「エンペラーシリーズ」、「麗妃」等も栽培されている。高温の影響により一部で生育のばらつきが見られる。

6. 青ネギ

生育期 時期:並 生育:並
昨年同様に高温による生育不良が認められる。

7. 新高ナシ

収穫期 時期:やや遅 生育:並
カメムシの影響はなく収量や品質は平年並と予想されている。高温によるみつ症も平年と同様に見られる。糖度は平年並～高い傾向であるが、このところの高温により品質の維持向上の難度が上がっている。

Ⅲ. 病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般 (面積)	東 部		中央部		中西部		西 部	
			面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜普通期稲＞	葉いもち	少	平年並	やや低	少	低	少	低	少	低
	穂いもち	少	少	低	少	低	少	低	少	低
	紋枯病	多	やや少	やや低	多	やや低	平年並	やや低	多	平年並
	ごま葉枯病	平年並	多	やや高	平年並	低	やや少	高	平年並	やや高
	稲こじ病	少	平年並	低	少	低	少	低	少	低
	ツマグロヨコバイ	やや少	多	平年並	少	低	少	低	平年並	やや低
	ヒメビウンカ	少	多	やや低	少	低	少	低	少	やや低
	セジロウンカ	少	多	平年並	少	低	少	低	少	平年並
	トビロウンカ	少	少	低	少	低	少	低	少	低
	コブノメイガ	少	少	低	少	低	少	低	多	やや低
	イネヨトウ	多	多	高	少	低	少	低	少	低
カンキツ類 ＜温州ミカン＞	そうか病	低			低	低				
	黒点病	平年並			平年並	低				
	かいよう病	多			多	平年並				
	ミカンハダニ	多			多	高				
	その他カイガラムシ	平年並			平年並	平年並				
	アブラムシ類	低			低	低				
	ミカンハモグリガ	少			少	低				
	カメムシ類	低			低	低				
カンキツ類 ＜中晩柑類＞	そうか病	平年並	多	平年並	少	低	少	低	少	低
	黒点病	平年並	多	やや低	多	低	多	低	やや多	平年並
	かいよう病	多	少	低	多	平年並	多	やや低	少	低
	ミカンハダニ	平年並	多	やや高	やや多	やや高	平年並	低	少	低
	カメムシ類	少	少	低	少	低	少	低	平年並	平年並
	ミカンサビダニ	多	少	低	少	低	多	高	少	低
	その他カイガラムシ	多	平年並	平年並	少	やや低	多	平年並	少	低
	ミカンハモグリガ	やや多	多	やや高	少	低	少	低	やや少	低
促成ナス	アブラムシ類	多	多	やや高	少	低	少	低	少	低
	青枯病	やや少	平年並	平年並	少	低				
	うどんこ病	少	少	低	少	低				
	黒枯病	多	少	低	少	低				
	ミナミキイロアザミウマ	平年並	平年並	低	少	低				
	アブラムシ類	少	少	低	少	低				
	ハスモンヨトウ	やや多	やや多	平年並	少	低				
	タバココナジラミ	平年並	多	やや低	多	やや高				
	ホコリダニ類	少	少	平年並	少	低				
	ハダニ類	多	多	高	少	低				
	ハモグリバエ類	多	多	高	多	やや低				
青ネギ	コナカイガラムシ類	多	少	低	多	平年並				
	黒斑病	少			少	低				
	軟腐病	少			少	平年並				
	ネギアザミウマ	多			多	やや高				
	シロイチモジヨトウ	少			少	低				
	ハスモンヨトウ	少			少	低				

トラップ調査※	害虫名	東 部	中央部 (香美)	中央部 (南国)	中西部	西 部
	ハスモンヨトウ	並		やや少	少	やや少
	アブラムシ	少		少	少	少
	果樹カメムシ類	並	少		少	並
	オオタバコガ	多		多		少
	タバコガ	多		多		少

※各害虫の詳細な発生推移については、病虫害防除所のホームページに掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		葉いもち	穂いもち	紋枯病	ごま葉枯病	稲こうじ病
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
東 部	本年	25.6	4.9	43.8	152.1	1.2
	平年	23.9	57.4	61.2	68.1	1.4
中央部	本年	0.0	0.0	194.9	1,028.4	0.0
	平年	43.7	184.5	45.4	930.0	447.1
中西部	本年	0.0	88.5	97.0	1,252.6	142.7
	平年	48.1	385.9	109.6	1,653.0	629.0
西 部	本年	0.0	15.5	325.0	708.3	0.0
	平年	66.2	119.5	148.3	664.7	71.2
合 計	本年	25.6	108.9	660.7	3,141.4	143.9
	平年	181.9	747.3	364.5	3,315.8	1,148.7

		ツマグロヨコバイ	ヒメビウンカ	セジロウンカ	トビイロウンカ	コブノメイガ
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
東 部	本年	59.6	14.6	36.5	0.0	29.2
	平年	17.5	4.5	22.1	31.7	51.0
中央部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	30.3	76.2	13.1	74.8	26.1
中西部	本年	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0
	平年	40.7	66.5	108.9	136.0	50.1
西 部	本年	61.9	11.6	19.4	0.0	69.7
	平年	69.4	63.4	76.3	56.4	38.4
合 計	本年	121.5	26.2	55.9	11.4	98.9
	平年	157.9	210.6	220.4	298.9	165.6

		イネヨトウ	フタオビコヤガ	イネクロカメムシ
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
東 部	本年	0.2	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	15.2
中央部	本年	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	7.5
中西部	本年	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.3	0.0
西 部	本年	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	30.2
合 計	本年	0.2	0.0	0.0
	平年	0.0	0.3	52.9

栽培面積 東部 365ha 中央部 1,202ha 中西部 2,140ha 西部 774ha 合計 4,481ha

2. カンキツ類(温州ミカン,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

		そうか病	黒点病	かいよう病	ミカンハダニ	カメムシ類
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
中央部 (温州)	本年	0.0	162.8	116.3	162.9	0.0
	平年	48.4	169.7	4.7	80.4	1.2
東 部 (中晩柑類)	本年	67.7	453.0	0.0	289.4	0.0
	平年	43.3	299.9	45.2	143.4	3.6
中央部 (中晩柑類)	本年	0.0	372.0	212.6	265.7	0.0
	平年	0.0	372.0	59.1	208.1	0.1
中西部 (中晩柑類)	本年	0.0	342.0	171.0	256.5	0.0
	平年	25.7	320.6	72.7	269.4	4.3
西 部 (中晩柑類)	本年	0.0	165.2	0.0	0.0	0.1
	平年	14.6	127.2	23.2	67.7	0.1
中晩柑類計	本年	67.7	1,332.2	383.6	811.6	0.1
	平年	83.6	1,119.7	200.2	688.6	8.1
カンキツ計	本年	67.7	1,495.0	499.9	974.5	0.1
	平年	132.0	1,289.4	204.9	769.0	9.3

2. カンキツ類(温州ミカン,中晩柑類)(続き)

主要病害虫の発生面積(ha)

		ミカンサビダニ	その他カイガラムシ	ミカンハモグリガ	アブラムシ類
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
中央部 (温州)	本年	0.0	0.1	46.5	0.0
	平年	0.0	0.1	94.2	80.1
東 部 (中晩柑類)	本年	0.0	1.0	434.2	280.0
	平年	5.7	1.1	118.9	37.6
中央部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.1	0.0	0.0
	平年	0.0	17.5	95.6	74.3
中西部 (中晩柑類)	本年	42.8	85.5	0.0	0.0
	平年	0.0	6.8	124.0	34.2
西 部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	29.9	0.0
	平年	0.6	0.1	40.9	3.5
中晩柑類計	本年	42.8	86.6	464.1	280.0
	平年	6.3	25.5	379.4	149.6
カンキツ計	本年	42.8	86.7	510.6	280.0
	平年	6.3	25.6	473.6	229.7

温州ミカン:栽培面積 中央部 186ha

中晩柑類:栽培面積 東部 453ha 中央部 372ha 中西部 342ha 西部 332ha 合計 1,499ha

3. 促成ナス

主要病害虫の発生面積(ha)

		青枯病		うどんこ病		黒枯病		疫病		ミナミキイロアザミウマ	
		発生面積(ha)	発病株率(%)	発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	発病度	発生面積(ha)	発病株率(%)	発生面積(ha)	寄生葉率(%)
東 部	本年	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	2.9
	平年	0.7	0.1	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	112.1	5.6
中央部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.5
	平年	0.3	0.1	0.8	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	8.7	6.2
西 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9
合 計	本年	0.6	0.1	0.0	0.0	1.3	0.1	0.0	0.0	109.1	2.8
	平年	1.0	0.1	1.4	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	121.2	5.5

		ヒラズハナアザミウマ		アブラムシ類		ハスモンヨトウ		タバコナジラミ		オンシツコナジラミ	
		発生面積(ha)	寄生花率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害株率(%)	発生面積(ha)	寄生葉率(%)	発生面積(ha)	寄生葉率(%)
東 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	2.7	252.0	17.8	0.0	0.0
	平年	25.2	0.5	14.2	0.4	75.1	2.9	231.0	23.7	0.0	0.0
中央部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.5	11.0	46.9	0.0	0.0
	平年	2.8	1.3	2.3	0.9	4.3	3.0	10.8	36.6	0.1	0.1
西 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	19.5	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	3.1	0.0	0.0
合 計	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	2.6	265.5	19.0	0.0	0.0
	平年	28.0	0.5	16.5	0.4	79.5	2.9	242.7	23.8	0.1	0.1

		ホコリダニ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		コナカイガラムシ類	
		発生面積(ha)	被害株率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)	発生面積(ha)	被害葉率(%)	発生面積(ha)	寄生株率(%)
東 部	本年	2.1	0.1	105.0	1.8	63.0	1.3	0.0	0.0
	平年	12.6	0.1	33.3	0.9	7.7	0.1	0.1	0.1
中央部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.6	1.4	0.3
	平年	0.7	0.1	2.5	2.8	2.7	0.8	0.8	0.3
西 部	本年	0.5	0.7	2.5	1.0	1.3	0.8	0.0	0.0
	平年	0.3	1.4	0.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	本年	2.6	0.1	107.5	1.7	69.8	1.3	1.4	0.1
	平年	13.6	0.1	36.2	1.0	10.4	0.1	0.9	0.1

栽培面積 東部 252ha 中央部 11ha 西部 5ha 合計 268ha

4. 青ネギ





主要病害虫の発生面積(ha)

		黒班病	軟腐病	ネギアザミウマ	シロイチモジヨトウ	ハスモンヨトウ
		発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)	発生面積(ha)
中央部	本年	0.0	1.0	57.0	21.4	0.0
	平年	2.4	8.1	55.8	39.1	13.4





栽培面積 中央部 57ha

V. トラップ調査





1. ハスモンヨトウ






2. アブラムシ



3. 果樹カメムシ



4. オオタバコガ



5. タバコガ

