

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所

病虫害発生予察情報について

令和8年度病虫害発生予察6月月報及び令和8年度予報第4号(7月)を送付します。

令和8年度病虫害発生予察6月月報

I. 気象概況 (6月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	23.6	21.7	27.2	26.1	20.8	17.7	248.0	39.7	13.4	27.3
2	21.1	22.3	24.9	26.6	18.5	18.6	84.0	44.6	13.8	25.3
3	23.0	22.9	28.1	27.0	18.7	19.4	0.0	52.9	28.1	23.5
4	23.7	23.4	26.9	27.2	20.6	20.1	20.5	65.7	9.6	21.4
5	22.8	23.9	25.8	27.6	20.5	20.9	159.0	76.5	9.4	18.9
6	24.7	24.6	29.1	28.2	22.1	21.8	109.0	78.4	14.5	18.4
合計及び平均	23.2	23.1	27.0	27.1	20.2	19.8	620.5	357.8	88.8	134.8

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	高い	かなり多い	かなり少ない
中旬	平年並	かなり少ない	少ない
下旬	低い	多い	少ない
月平均	平年並	かなり多い	かなり少ない

気象分布図(高知地方気象台提供)から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稻

早期稲 穂ばらみ期～糊熟期 時期:並～やや早 生育:並
5月後半～6月始めが高温かつ気温の日較差が小さい気象条件であり、生育は草丈は高く、茎数はやや少なめ、出穂時期は極早生品種・コシヒカリともにやや早い傾向であった。6月の台風による影響で、葉の裂傷や葉先枯れが広範囲で発生したが、その後は回復傾向にある。出穂したほ場の多くで斑点米カメムシ類の発生が確認されている。

普通期稲 田植期～分けつ期 時期:並 生育:並
一部地域で苗いもちやごま葉枯病の発生が確認されているが、移植後は概ね順調に生育している。曇雨天や台風により移植が遅れたほ場が見られており、老化苗の移植となったほ場では生育にも遅れが見られている。曇雨天が続いていることから、今後いもち病の発生拡大が懸念される。一部ほ場では、すでに斑点米カメムシ類の発生が確認され始めている。

2. カンキツ 生理落果期～幼果肥大期 時期:並 生育:並
着果量は、ユズ、ブンタン、ポンカンで平年と比べやや少～平年並、温州ミカンでは平年並となっている。また、品目関係なく生理落果が多いほ場が散見される。果実肥大は概ね順調に推移している。

3. 新高ナシ 果実肥大期 時期:並 生育:並
着果数は平年よりやや少なく、果実肥大は平年並で推移している。

4. 青ネギ 生育期 時期:並 生育:並
概ね順調に生育している。

Ⅲ. 病害虫発生概況

作物名	病害虫名	全 般		東 部		中央部		中西部		西 部	
		面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜早期稲＞	葉いもち	平年並	平年並	少	低	平年並	平年並	—	—	多	高
	紋枯病	多	平年並	多	平年並	多	平年並	—	—	多	高
	ごま葉枯病	多	高	多	高	多	高	やや少	低	多	高
	ツマグロヨコバイ	少	低	少	低	少	低	—	—	少	低
	ヒメトビウンカ	少	低	—	—	少	低	少	低	やや少	やや低
	セジロウンカ	多	高	やや多	やや高	平年並	平年並	—	—	多	高
	トビイロウンカ	多	高	多	高	—	—	—	—	—	—
	コブノメイガ	多	平年並	—	—	—	—	—	—	多	平年並
	アザミウマ類	少	低	平年並	やや低	少	低	—	—	平年並	やや高
水稲 ＜普通期稲＞	イネクロカメムシ	多	高	平年並	平年並	少	低	多	高	多	高
	スクミリンゴガイ	やや少	平年並	少	低	やや少	平年並	平年並	平年並	多	高
	苗いもち	やや少	平年並	—	—	多	平年並	—	—	平年並	平年並
	葉いもち	多	高	—	—	平年並	平年並	多	高	多	高
	ばか苗病	少	平年並	—	—	多	高	—	—	—	—
	ごま葉枯病	多	高	多	高	多	高	多	平年並	多	高
	ツマグロヨコバイ	多	高	多	高	多	高	—	—	多	高
	ヒメトビウンカ	多	平年並	—	—	—	—	—	—	多	高
	セジロウンカ	平年並	平年並	—	—	—	—	—	—	多	高
カンキツ ＜温州ミカン＞	コブノメイガ	多	高	多	高	—	—	—	—	—	—
	イネミズゾウムシ	少	低	—	—	少	低	平年並	平年並	—	—
	イネゾウムシ	やや多	高	—	—	多	高	—	—	多	高
	スクミリンゴガイ	やや多	高	少	低	多	高	やや少	平年並	多	高
	そうか病	平年並	高			平年並	高				
	黒点病	少	低			少	低				
	ミカンハダニ	多	高			多	高				
	その他カイガラムシ	平年並	平年並			平年並	平年並				
	ミカンハモグリガ	多	高			多	高				
	アザミウマ類	平年並	平年並			平年並	平年並				
	カメムシ類	—	—			—	—				
	アブラムシ類	—	—			—	—				
カンキツ ＜中晩柑類＞	そうか病	少	低	少	低	—	—	—	—	—	—
	黒点病	平年並	やや高	少	低	平年並	平年並	多	高	—	—
	かいよう病	少	低	やや多	やや高	—	—	—	—	—	—
	ミカンハダニ	やや少	平年並	—	—	平年並	高	平年並	平年並	—	—
	ミカンハモグリガ	やや多	平年並	多	高	平年並	平年並	少	平年並	—	—
	アザミウマ類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	カメムシ類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナシ	アブラムシ類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	炭疽病	多	平年並			多	平年並				
	カメムシ類	—	—			—	—				
青ネギ	黒斑病	少	低			少	低				
	べと病	少	低			少	低				
	軟腐病	平年並	平年並			平年並	平年並				
	ネギアザミウマ	多	やや高			多	やや高				
	シロイチモジトウ	やや少	低			やや少	低				
トラップ調査※	アブラムシ類	—	—			—	—				
	黒斑病	少	低			少	低				
	べと病	少	低			少	低				
	軟腐病	平年並	平年並			平年並	平年並				
	ネギアザミウマ	多	やや高			多	やや高				
	シロイチモジトウ	やや少	低			やや少	低				

※各害虫の詳細な発生推移については、病害虫防除所のホームページに掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 早期稲

早期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		葉いもち		紋枯病		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ		ヒメビウンカ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	6.5	0.3	2.2	0.1	21.6	0.8	6.5	0.3	0.0	0.0
	平年	24.5	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	31.1	1.4	25.4	1.1
中央部	本年	473.9	3.9	3.3	0.1	341.3	2.6	63.0	0.5	19.9	0.2
	平年	552.4	4.6	2.0	0.1	0.0	0.0	295.2	2.3	107.8	0.8
中西部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.1	0.0	0.0	1.9	0.1
	平年	64.6	2.5	0.0	0.0	5.3	0.2	14.7	0.6	8.0	0.3
西 部	本年	691.0	12.1	18.4	0.3	14.7	0.3	33.1	0.6	18.4	0.3
	平年	397.8	6.8	1.8	0.1	7.0	0.1	161.1	2.9	25.7	0.5
合 計	本年	1,171.4	5.1	23.9	0.1	381.4	1.6	102.6	0.4	40.2	0.2
	平年	1,039.3	4.5	4.3	0.1	12.3	0.1	502.1	2.2	166.9	0.7

		セジロウンカ		トビイロウンカ		コブノメイガ		フタオビコヤガ		アザミウマ類	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	17.3	0.7	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	433.7	16.7
	平年	12.5	0.5	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	448.9	22.7
中央部	本年	96.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	580.0	4.4
	平年	80.5	0.6	0.0	0.0	0.3	0.1	1.6	0.1	1,661.0	17.7
中西部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	25.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	175.4	7.9
西 部	本年	249.9	4.3	0.0	0.0	7.4	0.1	0.0	0.0	459.4	12.5
	平年	105.1	1.8	0.0	0.0	0.4	0.1	2.6	0.1	478.4	9.2
合 計	本年	363.3	1.5	2.2	0.1	7.4	0.1	0.0	0.0	1,473.1	7.2
	平年	223.4	0.9	0.0	0.0	0.9	0.1	4.5	0.1	2,763.7	15.2

		イネクロカメムシ		スクミリンゴガイ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	5.0	0.2	54.1	2.1
	平年	5.4	0.2	259.6	12.5
中央部	本年	1.0	0.1	1,077.1	15.6
	平年	27.4	0.2	1,506.3	18.4
中西部	本年	46.9	1.8	234.6	14.3
	平年	0.7	0.1	254.2	13.7
西 部	本年	551.3	10.9	367.5	7.8
	平年	16.7	0.3	206.4	3.8
合 計	本年	604.2	2.9	1,733.3	12.2
	平年	50.2	0.2	2,226.5	13.7

栽培面積 東部 649ha 中央部 3,314ha 中西部 657ha 西部 1,470ha 合計 6,090ha

(2) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		苗いもち		葉いもち		ばか苗病		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.4	6.0	0.4
	平年	0.1	0.1	10.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.1
中央部	本年	0.5	0.1	26.3	0.6	0.1	0.1	10.5	0.2	26.3	0.6
	平年	0.3	0.1	25.1	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	16.8	0.4
中西部	本年	0.0	0.0	254.4	3.0	0.0	0.0	2.9	0.1	0.0	0.0
	平年	0.5	0.1	139.5	1.7	0.3	0.1	1.5	0.1	15.4	0.2
西 部	本年	0.1	0.1	209.0	6.3	0.0	0.0	154.7	4.9	54.3	1.6
	平年	0.1	0.1	64.8	2.0	0.0	0.0	11.3	0.3	23.7	0.7
合 計	本年	0.6	0.1	489.7	2.7	0.1	0.1	174.1	1.0	86.6	0.5
	平年	1.0	0.1	240.0	1.4	0.3	0.1	12.9	0.1	57.5	0.3

		ヒメビウンカ		セジロウンカ		コブノメイガ		イネミズゾウムシ		イネゾウムシ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	0.8	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	5.7	0.4	0.8	0.1
中央部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7	1.4	131.4	2.8
	平年	7.8	0.2	12.1	0.3	0.0	0.0	341.6	7.3	90.6	1.9
中西部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	219.3	2.6	0.0	0.0
	平年	1.9	0.1	22.4	0.3	0.0	0.0	241.4	2.8	28.4	0.3
西 部	本年	25.1	0.8	33.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.5	3.1
	平年	1.3	0.1	6.8	0.2	0.0	0.0	124.9	3.7	50.1	1.5
合 計	本年	25.1	0.1	33.4	0.2	2.4	0.1	285.0	1.6	235.9	1.3
	平年	11.8	0.1	41.5	0.2	0.0	0.0	713.6	4.0	169.9	0.9

(2) 普通期稲(続き)

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		スクミリンゴガイ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	30.1	2.1
	平年	172.1	17.0
中央部	本年	262.8	9.7
	平年	155.3	5.8
中西部	本年	219.3	4.3
	平年	285.5	4.9
西 部	本年	522.5	28.1
	平年	209.4	7.8
合 計	本年	1,034.7	10.0
	平年	822.3	6.6

栽培面積 東部 361ha 中央部 1,183ha 中西部 2,120ha 西部 836ha 合計 4,500ha

2. カンキツ(温州ミカン, 中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

		そうか病		黒点病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部 (温州)	本年	45.8	7.2	22.9	1.8	0.0	0.0	160.2	23.2	0.0	0.0
	平年	40.8	3.9	68.6	5.4	0.0	0.0	103.9	10.3	16.2	2.3
東 部 (中晩柑類)	本年	8.8	0.3	8.8	0.3	8.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	97.0	3.0	68.6	2.1	7.1	0.2	179.3	12.2	21.6	0.9
中央部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	265.0	10.2	0.0	0.0	318.0	32.7	0.0	0.0
	平年	0.0	0.0	233.2	10.2	34.7	1.3	267.3	22.3	31.8	1.2
中西部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	293.2	16.1	0.0	0.0	251.3	28.6	0.0	0.0
	平年	8.6	0.4	170.4	7.3	54.4	2.3	297.2	24.4	30.6	2.4
西 部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	5.1	0.2	20.3	0.9	4.2	0.2	15.1	1.1	16.3	1.1
中晩柑類計	本年	8.8	0.1	567.0	6.2	8.8	0.1	569.3	14.5	0.0	0.0
	平年	110.7	1.1	492.5	5.0	100.4	1.0	758.9	15.0	100.3	1.3
カンキツ計	本年	54.6	7.2	589.9	8.0	8.8	0.1	729.5	37.7	0.0	0.0
	平年	151.5	5.0	561.1	10.4	100.4	1.0	862.8	25.2	116.5	3.7

		ミカンハモグリガ		アザミウマ類		カメムシ類		その他カイガラムシ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部 (温州)	本年	91.5	7.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	平年	60.0	4.7	0.1	0.0	2.3	0.2	0.1	0.0
東 部 (中晩柑類)	本年	343.5	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	136.9	6.9	0.0	0.0	4.1	0.1	0.0	0.0
中央部 (中晩柑類)	本年	53.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	57.1	2.2	35.4	1.4	10.6	0.4	17.3	0.7
中西部 (中晩柑類)	本年	41.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	100.5	5.0	14.0	0.6	8.4	0.4	0.1	0.0
西 部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	42.1	4.5	0.0	0.0	5.3	0.5	0.0	0.0
中晩柑類計	本年	438.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	336.6	4.8	49.4	0.5	28.4	0.3	17.4	0.2
カンキツ計	本年	529.9	12.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	平年	396.6	9.5	49.5	0.5	30.7	0.5	17.5	0.2

温州ミカン:栽培面積 中央部 183ha

中晩柑類:栽培面積 東部 458ha 中央部 371ha 中西部 335ha 西部 333ha 合計 1,497ha

3. ナシ 主要病害虫の発生面積(ha)

		黒星病		炭疽病		カメムシ類	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部	本年	0.0	0.0	50.0	14.3	0.0	0.0
	平年	3.6	1.0	22.6	12.0	0.3	0.1

栽培面積 中央部 50ha

4. 青ネギ

主要病害虫の発生面積(ha)





		黒斑病		さび病		べと病		軟腐病		ネギアザミウマ	
		発生面積(ha)	発病程度	発生面積(ha)	発病株率	発生面積(ha)	発病株率	発生面積(ha)	発病株率	発生面積(ha)	発生程度
中央部	本年	0.5	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	1.0	0.1	53.0	71.3
	平年	10.9	0.7	25.1	6.9	12.8	3.2	1.1	0.1	53.0	55.2

		ネギハモグリバエ		シロイチモジヨトウ		アブラムシ類	
		発生面積(ha)	発生程度	発生面積(ha)	発生虫数	発生面積(ha)	寄生株数
中央部	本年	0.0	0.0	10.6	0.4	0.0	0.0
	平年	8.5	0.2	14.0	2.1	1.2	0.1





栽培面積 中央部 53ha

V. トラップ調査





1. ハスモンヨトウ






2. アブラムシ



3. 果樹カメムシ



4. オオタバコガ



5. タバコガ

