8 高 農 セ 第 213 号
令 和 8 年 7 月 28 日

関係各位

高知県病害虫防除所長

令和 8 年度病害虫発生予察技術情報第 10 号

【水稲(早期稲)】斑点米カメムシ類の発生状況について

高知県内の水稲(早期稲)において 6 月中旬～7 月中旬に実施したすくい取り調査結果(捕虫網 50 回振り)について、下記のとおり取りまとめましたので防除指導の参考にしてください。

記

6 月中旬～7 月中旬に実施したすくい取り調査の結果、調査ほ場の 87%で斑点米カメムシ類の発生が見られました。1 ほ場あたりの捕獲頭数は、中央部で平年より多く(平年比約 2.2 倍)、中西部でやや多く(同約 1.3 倍)、西部で平年並、東部では平年より少なくなっており、県下全域では平年の約 1.6 倍の発生となっています。種別捕獲頭数は、クモヘリカメムシ(写真 1)、イネカメムシ(写真 2)の順に多く、ミナミアオカメムシ(写真 3)やホソハリカメムシ(写真 4)についても平年より多い発生となっています（表１、2)。なお、中央部では特に斑点米カメムシ類の発生が多かったことから、7 月 13 日付けで令和 8 年度病害虫発生予察注意報第 2 号 を発出しております。

この先も高温多照と予想されていることから、普通期稲においてもカメムシ類の発生が多くなると予想されますので注意してください。出穂期以降にカメムシ類がわずかでも見られる場合、斑点米が発生することが予想されますので、防除適期である出穂の 10 日後頃及びその 5～7 日後に防除を行ってください。ただし、イネカメムシの発生が多い場合には、出穂期の加害により不稔となる恐れがありますので、他のカメムシ類よりも早く、出穂期に防除を実施してください。

また、ミナミアオカメムシは合成ピレスロイド剤の効果が劣るので、他系統の剤による防除を行ってください。

薬剤については、県の病害虫防除指針(高知県農薬情報システム内に掲載、https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/haishinfile/list/kochi)を参照し、使用時期(収穫前日数)に注意して選定してください。防除に当たっては、農薬安全使用の遵守及び周辺農作物等への飛散防止対策を徹底してください。

表１　早期稲における斑点米カメムシ類の発生状況（令和８年度）

地域（調査ほ場数）		ミナミアオカメムシ	ホソハリカメムシ	クモヘリカメムシ	イネカメムシ	アカスジカスミカメ	その他	合　計	発生ほ場率
東部	**本年**	**2.3**	**1.4**	**2.2**	**1.9**	**0.7**	**0.5**	**9.0**	**83%**
(12)	平年	1.8	2.2	5.4	2.3	4.0	1.4	17.0	84%
中央部	**本年**	**2.1**	**5.6**	**18.9**	**7.0**	**0.6**	**2.6**	**36.8**	**88%**
(40)	平年	0.7	2.6	6.8	2.0	2.8	1.5	16.4	71%
中西部	**本年**	**1.9**	**2.3**	**9.4**	**4.8**	**0.3**	**0.9**	**19.6**	**100%**
(14)	平年	0.9	2.2	4.4	0.7	5.3	1.6	15.2	84%
西部	**本年**	**1.2**	**1.9**	**8.3**	**1.2**	**1.7**	**1.2**	**15.5**	**75%**
(16)	平年	0.7	2.0	4.0	4.1	2.7	1.5	15.0	87%
県内合計	**本年**	**1.9**	**3.7**	**12.8**	**4.7**	**0.8**	**1.7**	**25.6**	**87%**
(82)	平年	0.9	2.3	5.6	2.1	3.4	1.5	15.8	82%

※数字は１ほ場あたりの成幼虫数（捕虫網 50 回振り）で、
端数処理により合計が一致しない場合がある。

写真１　クモヘリカメムシ成虫



写真２　イネカメムシ成虫

写真３　ミナミアオカメムシ
（上段：成虫、下段：終齢幼虫）

写真４　ホソハリカメムシ成虫

表２　早期稲における斑点米カメムシ類のすくい取り調査(6 月下旬～7 月中旬)結果(捕虫網 50 回振り)

地域	調査場所		令和8年度																						令和7年度			令和6年度			令和5年度			令和4年度		
			調査日	(※)	ミナミアオカメムシ			ホソハリカメムシ			クモヘリカメムシ			イネカメムシ			アカスジカスミカメ			その他				合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	代表的な種	成	幼	計													
東部	室戸市　元	1	7/3	畑	1		1	1		1	4		4	1		1			0		0	0	0	7	7/1	出	0	7/1	出	22	7/4	始	5	7/12	畑	1
		2		畑	5		5			0			0	1		1			0	トゲシラホシカメムシ	2	0	2	8		出	0		出	1		始	3		畑	0
	室戸市　室津※※	1	7/3	出			0	2		2			0			0			0		0	0	0	2	7/1	始	0	7/1	孕	0	7/4	始	0	7/12	畑	0
		2		始			0	4		4			0			0			0		0	0	0	4		出	6		孕	3		始	1		畑	0
	安芸市　畠島	1	6/29	出			0			0			0			0			0		0	0	0	0	6/26	始	2	7/2	出	1	7/3	畑	16	7/11	畑	2
		2		畑	1		1			0	2		2			0			0		0	0	0	3		孕	11		出	28	7/4	畑	3		畑	12
	安芸市　井ノ口	1	6/29	畑			0			0			0			0			0		0	0	0	0	6/26	出	21	7/2	畑	57	7/4	畑	12	7/11	畑	14
		2		畑	2		2			0	1		1			0			0	ナガカメムシ類	1	0	1	4		出	8		畑	142	7/3	畑	23		畑	16
	安芸市　川北	1	6/29	畑	2		2	3		3	10		10	1		1	1		1		0	0	0	17	6/26	始	25	7/2	畑	26	6/29	畑	4	7/1	畑	17
		2		畑	1		1			0			0			0	3		3		0	0	0	4		出	51		畑	27		畑	14		畑	9
	室西村　西分	1	6/29	畑	1		1	4		4	4		4	4		4	4		4	アカヒメヘリカメシ	2	0	2	19	6/26	出	31	7/2	畑	92	7/4	畑	4	7/1	畑	27
		2		畑	13	1	14	2	1	3	7	1	8	13		13			0		1	0	1	39		畑	39		畑	60		畑	5		畑	9
東部の1匹場当たりの平均虫数					2.2	0.1	2.3	1.3	0.1	1.4	2.1	0.1	2.2	1.9	0	1.9	0.7	0	0.7		0.5	0	0.5	8.9			16.2			38.3			7.5			8.9
中央部	香南市　徳王子	1	6/30	始			0			0			0			0			0		0	0	0	0	7/4	始	4	7/2	畑	19	7/6	畑	2	6/28	始	56
		2		畑	13		13	17		17	33	14	47	19		19			0	ｷﾝﾓﾝﾐｶﾄﾞﾘﾊﾞｴﾒﾑｼ	1	0	1	97		畑	93		畑	6		畑	4		出	0
	香南市　吉原	1	6/29	畑			0			0			0			0			0		0	0	0	0	7/4	畑	20	7/2	始	34	7/6	出	3	6/30	出	9
		2		始	1		1	1		1	4		4	11		11	1		1		0	0	0	18		畑	16		出	7		出	4		出	5
	香南市　富家	1	6/30	出	3		3	5		5	16	4	20	4		4			0	シラホシカメムシ クロホシカメムシ	3	0	3	35	7/4	乳	18	7/2	出	9	7/6	出	4	6/28	始	0
		2		出			0	10		10	3		3	6		6			0		0	0	0	19		畑	10		出	17		畑	2		畑	73
	香南市　父箸寺	1	6/30	始			0	19		19	26		26	8		8			0	シラホシカメムシ ｷﾝﾓﾝﾐｶﾄﾞﾘﾊﾞｴﾒﾑｼ	2	0	2	55	7/4	畑	24	7/2	出	89	7/6	畑	14	7/1	始	2
		2		始	6		6	7		7	134	9	143			0			0		0	0	0	156		畑	4		出	37		出	8		出	0
	香美市　中野	1	6/29	畑	15		15	11		11	9	4	13	5		5	2		2	トゲシラホシカメムシ	1	0	1	47	7/3	乳	1	7/5	畑	27	7/6	出	3	6/28	出	10
		2		畑			0	13	1	14	4		4	7		7	1		1	トゲシラホシカメムシ イナズマカメムシ類	3	0	3	29		乳	2		畑	50		出	1		畑	7
	南国市　前浜	1	6/29	畑			0	2		2			0			0			0		0	0	0	2	7/3	乳	9	7/2	出	15	7/6	畑	10	6/30	出	16
		2		畑			0	12		12	2		2	1		1			0		0	0	0	15		乳	5		出	11		出	5		始	10
	南国市　三和	1	6/29	始			0			0			0	1		1			0		0	0	0	1	7/3	乳	21	7/2	出	22	7/6	畑	5	6/30	畑	7
		2		始			0			0			0			0			0		0	0	0	0		乳	5		出	16		畑	1		出	2
	南国市　野田・南	1	6/29	乳	2		2	15	1	16	24	6	30	3		3	3		3	イネカブリﾋﾒｸﾛｽｽﾞﾒ アカヒメヘリカメシ	2	0	2	56	6/18	孕	2	7/5	畑	566	6/29	畑	27	7/7	始	6
		2		乳	10	1	11	10		10	6	15	21	9		9	3	2	5		0	0	0	56		孕	3		畑	389		畑	55		始	1
	南国市　野田・北	1	7/7	出			0			0			0			0	1	1	2	イネカブリﾋﾒｸﾛｽｽﾞﾒ ヒゲナガカメムシ アカヒメヘリカメシ	2	0	2	4	7/3	出	15	7/5	出	0	―			7/7	畑	5
		2		出			0	2		2			0	2	2	4			0		1	0	1	7		出	202		出	12					畑	2
	南国市　長岡	1	6/29	畑			0	10		10	22		22			0			0		0	0	0	32	7/3	畑	17	7/5	畑	0	7/6	畑	0	6/30	出	10
		2		畑	2		2	12	1	13	19		19	2		2			0		0	0	0	36		畑	17		畑	6		畑	13		出	7
	南国市　久礼田	1	6/29	畑			0	19		19	74		74	23		23	3		3	シラホシカメムシ イネカブリﾋﾒｸﾛｽｽﾞﾒ シラホシカメムシ	3	0	3	122	7/4	畑	94	7/5	畑	130	6/29	始	18	6/30	出	94
		2		畑	15		15	4		4	94	1	95	166		166	1		1		1	0	1	282		畑	62		畑	51		始	32		出	23
	高知市　大津	1	7/7	始			0			0			0			0			0		0	0	0	0	7/3	孕	0	7/5	始	1	7/6	始	0	7/7	出	2
		2		始			0			0			0			0			0		0	0	0	0		孕	1		始	0		始	0		出	2
	高知市　布師田	1	6/29	畑	5		5			0	14	75	89			0			0	イチモンジカメムシ	1	0	1	95	7/3	乳	2	7/5	畑	52	6/29	始	0	6/30	畑	3
		2		畑			0			0		5	5			0			0		0	0	0	5		乳	2		畑	0		始	0		畑	0
	高知市　介良	1	6/29	始			0	3		3			0			0			0		0	0	0	3	7/3	畑	8	7/5	畑	25	7/6	出	1	6/30	出	0
		2		始			0	2		2			0			0			0		0	0	0	2		畑	4		畑	46		出	1		出	6
	高知市　五台山	1	6/29	畑			0	3		3	2		2			0			0		0	0	0	5	7/3	乳	0	7/5	乳	0	6/29	出	0	6/30	畑	1
		2		畑			0			0	2		2			0	1		1		0	0	0	3		乳	0		乳	4		出	0		畑	0

地域	調査場所		令和8年度																						令和7年度			令和6年度			令和5年度			令和4年度		
			調査日	(※)	ミナミアオカメムシ			ホソハリカメムシ			クモヘリカメムシ			イネカメムシ			アカスジカスミカメ			その他				合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計	調査日	(※)	合計
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		成	幼	計													
中央部	高知市　弘岡上	1	6/29	始	1		1	10		10	2	1	3			0			0		0	0	0	14	7/3	出	10	7/5	畑	4	7/6	出	1	6/30	畑	17
		2		始	2		2	16		16	14	1	15	1		1			0		0	0	0	34		畑	13		畑	1		出	3		畑	11
	高知市　西分	1	6/29	畑	1		1			0			0	1		1			0		0	0	0	2	7/3	畑	11	7/5	畑	9	7/6	出	1	7/1	畑	11
		2		始			0			0			0			0			0	トゲシラホシカメムシ	1	0	1	1		畑	3		出	4		始	0		畑	3
	高知市　鏡木	1	6/29	始			0	4		4	6		6			0	1		1		0	0	0	11	7/3	乳	6	7/5	畑	28	6/29	出	9	7/1	畑	11
		2		畑			0	5		5			0	1		1			0		0	0	0	6		孕	13		出	16	7/6	出	5		始	0
	いの町　枝川	1	7/7	始	4		4	1		1	5		5	2		2			0		0	0	0	12	7/3	始	13	7/5	始	10	―			7/1	孕	4
		2		孕	1		1			0	4		4			0			0	ミナミホソナガカメムシ	2	0	2	7	―		0		孕	3					孕	5
	日高村　仲名	1	7/7	始			0	3		3	10	24	34	4	1	5			0	ヒメヘリカメムシ類 ミナミホソナガカメムシ	19	0	19	61	7/3	出	31	6/18	出	17	7/6	畑	55	7/1	出	51
		2		始			0	4		4	17	52	69	1		1	3		3	ミナミホソナガカメムシ	62	0	62	139		出	80		出	106		出	23		出	52
中央部の1匹場当たりの平均虫数					2.0	0.0	2.1	5.5	0.1	5.6	13.7	5.3	18.9	6.9	0.1	7.0	0.5	0.1	0.6		2.6	0	2.6	36.7			21.6			46.1			6.6			13.2
中西部	土佐市　若戸	1	6/29	始	1		1	1		1	6	5	11	1		1			0		0	0	0	14	7/3	始	11	7/5	始	0	―			7/1	始	3
		2		始			0			0	4		4			0			0	ウスイロヒメヨコバイガカメムシ	1	0	1	5		始	0		始	0					始	1
	土佐市　波介	1	6/29	始			0			0			0			0	1		1		0	0	0	1	7/3	乳	15	7/5	畑	72	7/6	出	3	7/1	畑	21
		2		始			0			0	6		6			0			0		0	0	0	6		乳	40		畑	32		出	6		畑	16
	土佐市　鳴川	1	6/29	始			0	12		12	29		29	1		1			0	ミナミホソナガカメムシ	2	0	2	44	7/3	畑	41	7/5	畑	7	7/6	始	24	7/1	始	7
		2		始	3		3	10		10	22	2	24	1		1			0	ミナミホソナガカメムシ	3	0	3	41		畑	11		畑	95		出	24		始	3
	須崎市　浦ノ内	1	7/3	畑	2	1	3	4		4	6	1	7	37	1	38	1		1	ナガカメムシ類 ヒメヘリカメムシ類	5	0	5	58	7/1	畑	1	7/9	始	1	7/4	孕	0	7/7	孕	0
		2		畑	2	1	3	2		2	9	1	10	12		12			0		0	0	0	27		始	0		始	1		孕	0		孕	0
	須崎市　神田	1	7/3	始	4		4			0	7		7	2		2	2		2		0	0	0	15	7/1	始	22	7/9	出	9	7/4	畑	4	7/7	畑	24
		2		始	2		2			0	11		11	4		4			0	シラホシカメムシ	1	0	1	18		始	5		畑	27		畑	19		畑	6
	須崎市　安和	1	7/17	始			0			0	4		4	1		1			0	ツマアオカメムシ	1	0	1	6	7/10	始	59	7/9	畑	16	7/4	始	3	7/7	畑	9
		2		始			0			0	1		1	2		2			0		0	0	0	3		始	117		始	2		始	1		出	13
	中土佐町　佐場	1	7/3	畑	2	3	5	2		2	9		9			0			0		0	0	0	16	7/1	畑	8	7/9	畑	14	7/4	畑	12	7/7	畑	1
		2		畑	5	1	6	1		1	9		9	5		5			0		0	0	0	21		畑	27		畑	45		畑	21		畑	1
中西部の1匹場当たりの平均虫数					1.5	0.4	1.9	2.3	0	2.3	8.8	0.6	9.4	4.7	0.1	4.8	0.3	0	0.3		0.9	0	0.9	19.6			25.5			22.9			9.8			7.6
西部	四万十市　安並	1	6/29	出			0	6		6	10	13	23			0	1		1		0	0	0	30	7/4	畑	22	7/4	畑	6	7/4	出	6	7/8	畑	15
		2		出			0	1		1	8	3	11	10		10	1		1		0	0	0	23		畑	0		畑	14		出	39		畑	3
	四万十市　興津※※	1	7/10	出			0	1		1	11	10	21	1		1			0		0	0	0	23	7/4	畑	37	7/3	畑	1	7/4	出	12	7/8	畑	1
		2		出			0			0			0			0			0		0	0	0	0		畑	26		畑	0		出	20		畑	3
	黒潮町　中角	1	6/29	出	6	1	7	7		7	25	2	27	1		1	6		6	シラホシカメムシ	0	0	0	48	7/3	畑	32	7/4	畑	22	7/4	畑	12	7/8	畑	3
		2		出	1	2	3	2		2	21	8	29			0	16		16		2	0	2	52		畑	41		畑	11		畑	61		畑	0
	黒潮町　伊田	1	6/29	出		1	1			0			0			0			0		0	0	0	1	7/3	畑	24	7/4	畑	10	7/4	畑	3	7/8	畑	3
		2		出		1	1	1	2	2	6		6			0	3		3	イネクロカメムシ	4	0	4	16		畑	70		畑	13		畑	18		畑	0
	土佐清水市　益野	1	7/3	畑	6		6	1		1	6	2	10			0			0	イネカブリﾋﾒｸﾛｽｽﾞﾒ アカヒメヘリカメシ シラホシカメムシ	3	0	3	20	7/3	畑	7	7/3	畑	31	7/4	畑	26	7/8	乳	16
		2		畑			0	7		7	4		4			0			0	アカヒメヘリカメシ	4	0	4	15		畑	18		畑	40		畑	5		乳	4
	宿毛市　小筑紫	1	7/10	出			0	2		2			0	2		2			0	シラホシカメムシ イネクロカメムシ シラホシカメムシ	4	0	4	8	7/8	出	60	7/3	出	64	7/10	出	80	7/8	畑	24
		2		出	1		1			0	1		1	5		5			0		1	0	1	8		畑	4		畑	137		出	227		畑	35
	宿毛市　山奈	1	7/15	始			0			0			0			0			0		0	0	0	0	7/4	畑	0	7/3	畑	0	7/4	出	8	7/8	乳	0
		2		始			0			0			0			0			0		0	0	0	0		畑	1		畑	0		出	70		畑	1
	三原村　下長谷※※	1	7/15	畑			0			0			0			0			0		0	0	0	0	7/8	畑	2	7/4	畑	3	7/4	出	5	7/8	畑	16
		2		出			0	1		1			0			0			0	アカヒメヘリカメシ	1	0	1	2		畑	1		畑	3		出	2		畑	14
西部の1匹場当たりの平均虫数					0.9	0.3	1.2	1.9	0	1.9	5.9	2.4	8.3	1.2	0	1.2	1.7	0	1.7		1.2	0	1.2	15.4			21.6			22.3			37.1			8.8
県下1匹場あたりの平均虫数					1.7	0.2	1.9	3.6	0.0	3.7	9.6	3.2	12.8	4.7	0.0	4.7	0.7	0.0	0.8		1.8	0	1.8	25.6			21.4			36.4			14.6			10.7

※　　孕：妊帯期、始：出穂始、出：出穂期、畑：糊熟期、乳：乳熟期、黄：黄熟期、－：出穂皆のため調査未実施

※※　　R4年調査より興見から森沢に、R5年調査より来額岡から下長谷に、R8年調査より佐家から窪津に調査地点を変更

※※※　　端数処理により合計は一致しない場合がある。

お問合せは、病害虫防除所(TEL：088-863-1132)または環境農業推進課(TEL：088-821-4861)まで