

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所

病虫害発生予察情報について

令和8年度病虫害発生予察7月月報及び令和8年度予報第5号(8月)を送付します。

令和8年度病虫害発生予察7月月報

I. 気象概況 (7月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	24.7	25.4	28.0	29.0	22.1	22.6	107.0	73.4	15.5	20.0
2	25.6	26.1	28.9	29.8	23.2	23.2	21.5	63.0	7.0	22.9
3	29.0	26.8	33.2	30.6	25.0	23.7	0.0	51.5	55.5	27.1
4	30.2	27.3	34.8	31.3	26.0	24.1	35.0	47.9	54.9	30.7
5	30.8	27.7	35.2	31.7	26.8	24.4	0.0	53.7	60.4	32.6
6	30.5	28.0	36.1	32.1	26.0	24.7	13.5	73.2	57.9	40.3
合計及び平均	28.5	26.9	32.7	30.8	24.9	23.8	177.0	362.7	251.2	173.6

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	平年並	平年並	少ない
中旬	かなり高い	平年並	かなり多い
下旬	かなり高い	少ない	かなり多い
月平均	かなり高い	少ない	かなり多い

気象分布図(高知地方気象台提供)から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稲

早期稲 糊熟期～収穫期 時期: やや早 生育: やや早

収穫時期・生育ともにやや早く、収穫は南国そだちで7月13日、よさこい美人は7月18日、コシヒカリは7月22日頃から始まっている。穂いもちが発生しているほ場が多く見られ、発生程度の高いほ場では減収が懸念される。

普通期稲 分けつ期～穂ばらみ期 時期: 並 生育: 並
生育は概ね順調であるが、多くのほ場で葉いもちが見られる。また、一部ほ場で赤枯症が確認されている。

2. カンキツ

果実肥大期 時期: 並 生育: 並

温州の着果量は平年並、果実肥大も平年並で概ね順調である。ユズの着果量は平年並～やや少なく、果実肥大は平年並だが、地域によりばらつきが見られる。文旦は着花量が多かったが生理落果も多かったため、着果量は平年並～やや少なく、果実肥大は平年並だが、地域によりばらつきが見られる。ポンカン着果量は平年並～やや少なく、果実肥大は平年並～やや小さい。

3. 新高ナシ

果実肥大期 時期: 早 生育: 並

開花期の大雨の影響で落花が多く、着果量はやや少ない。果実肥大は平年並で推移している。気温は平年に比べ高めで推移しており、収穫開始目安となる積算温度は7月末時点で平年値を上回っている。今後も同様の傾向が続くことから、収穫開始時期は平年より早くなる見込み。

4. 青ネギ

生育期 時期: 並 生育: 並

高温の影響による生育の遅れ、葉先枯れが見られる。

Ⅲ. 病害虫発生概況

作物名	病害虫名	全 般		東 部		中央部		中西部		西 部	
		面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稲 ＜早期稲＞	葉いもち	多	高	少	低	多	高	やや少	やや低	多	高
	穂いもち	多	高	少	低	多	高	多	やや高	多	高
	紋枯病	平年並	やや低	—	—	やや多	平年並	平年並	平年並	やや少	やや低
	ごま葉枯病	平年並	やや低	—	—	多	やや高	少	低	少	低
	ツマグロヨコバイ	少	低	やや少	やや低	少	低	少	低	少	低
	ヒメトビウンカ	やや少	やや低	—	—	少	低	少	低	多	高
	セジロウンカ	やや多	やや高	少	低	平年並	平年並	やや少	やや低	多	高
	トビイロウンカ	多	平年並	多	高	多	やや高	多	平年並	—	—
	ニカメイガ	多	やや高	—	—	多	高	—	—	—	—
	コブノメイガ	多	高	多	高	—	—	—	—	多	高
	フタオビコヤガ	やや少	平年並	多	高	—	—	—	—	—	—
	イネヨトウ	多	高	多	高	多	高	多	高	—	—
水稲 ＜普通期稲＞	斑点米カメムシ類	平年並	やや高	平年並	やや低	平年並	高	多	やや高	平年並	平年並
	イネクロカメムシ	多	高	多	高	多	高	—	—	多	高
	スクミリンゴガイ	少	低	少	低	少	やや低	少	低	—	—
	葉いもち	やや多	高	少	低	やや多	平年並	やや多	やや高	多	高
	紋枯病	平年並	平年並	—	—	やや少	平年並	平年並	平年並	やや多	やや高
	ごま葉枯病	多	高	—	—	多	高	多	高	やや多	やや高
	ツマグロヨコバイ	多	高	少	低	平年並	平年並	少	低	多	高
	ヒメトビウンカ	平年並	平年並	—	—	少	低	やや少	平年並	多	高
	セジロウンカ	平年並	平年並	少	低	平年並	平年並	平年並	平年並	やや多	高
	トビイロウンカ	多	平年並	多	高	多	高	多	平年並	—	—
	コブノメイガ	平年並	平年並	多	高	少	低	少	低	多	高
	イネヨトウ	多	高	—	—	多	高	—	—	—	—
カンキツ ＜温州ミカン＞	フタオビコヤガ	平年並	低	多	高	やや少	平年並	—	—	やや少	やや低
	イチモンジセセリ	多	平年並	多	平年並	平年並	平年並	多	高	—	—
	イネクロカメムシ	多	高	—	—	多	高	—	—	—	—
	スクミリンゴガイ	平年並	平年並	やや少	低	やや多	やや高	やや少	低	やや多	高
	そうか病	多	やや高			多	やや高				
	黒点病	やや多	平年並			やや多	平年並				
カンキツ ＜中晩柑類＞	かいよう病	多	高			多	高				
	ミカンハダニ	平年並	高			平年並	高				
	ミカンハモグリガ	やや少	低			やや少	低				
	アザミウマ類	多	高			多	高				
	そうか病	少	低	少	低	—	—	—	—	—	—
	黒点病	やや多	平年並	やや少	やや低	多	低	平年並	高	多	高
ナシ	かいよう病	少	低	やや多	やや高	—	—	—	—	—	—
	ミカンハダニ	やや多	平年並	平年並	低	平年並	平年並	多	高	多	高
	アブラムシ類	平年並	高	多	高	—	—	—	—	—	—
	ミカンハモグリガ	多	やや高	多	平年並	平年並	平年並	多	やや高	多	高
	炭疽病	多	高			多	高				
青ネギ	さび病	平年並	低			平年並	低				
	べと病	多	やや高			多	やや高				
	ネギアザミウマ	多	高			多	高				
	シロイチモジヨトウ	やや多	高			やや多	高				
	ネギコガ	平年並	高			平年並	高				

トラップ調査※	害虫名	全般	東 部	中央部 (香美)	中央部 (南国)	中西部	西 部
	ハスモンヨトウ	平年並	平年並		少	平年並	多
	アブラムシ	やや少	少		やや少	やや少	やや少
	果樹カメムシ類	多	多	多		多	多
	オオタバコガ	多	多		多		少
	タバコガ	平年並	多		平年並		少

※各害虫の詳細な発生推移については、病害虫防除所のホームページに掲載していますのでご参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 早期稲

早期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		葉いもち		穂いもち		紋枯病		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	10.8	0.4	4.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	1.3
	平年	37.0	2.1	36.9	1.7	49.8	2.2	11.4	0.6	50.2	2.0
中央部	本年	704.7	5.3	509.3	3.8	195.3	1.7	572.1	4.3	27.9	0.2
	平年	446.9	3.5	255.1	2.2	161.2	1.8	373.6	3.4	159.0	1.5
中西部	本年	61.9	2.4	28.2	1.1	5.6	0.2	15.0	0.6	1.9	0.1
	平年	89.0	3.5	19.1	0.8	4.8	0.2	95.6	3.7	6.5	0.3
西 部	本年	801.1	16.1	823.2	17.8	114.0	2.1	121.3	2.1	102.9	1.8
	平年	313.2	6.3	176.9	4.0	149.3	3.0	345.6	6.7	196.1	3.5
合 計	本年	1,578.5	7.1	1,365.1	6.5	314.9	1.5	708.4	2.9	167.3	0.7
	平年	886.1	4.0	488.0	2.4	365.1	2.0	826.2	3.9	411.8	1.9

		ヒメビウンカ		セジロウンカ		トビイロウンカ		ニカメイガ		コブノメイガ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	0.0	0.0	10.8	0.4	8.7	0.3	0.0	0.0	23.8	0.9
	平年	49.9	2.5	68.4	2.7	0.6	0.1	0.2	0.1	7.8	0.3
中央部	本年	48.8	0.4	188.4	1.4	17.4	0.1	87.2	0.7	0.0	0.0
	平年	228.0	1.8	170.1	1.3	2.7	0.1	39.6	0.3	21.1	0.2
中西部	本年	15.0	0.6	45.1	1.7	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	34.5	1.4	57.4	2.2	1.3	0.1	17.8	0.7	2.1	0.1
西 部	本年	205.9	3.9	477.7	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	158.0	2.7
	平年	72.4	1.2	265.1	4.5	2.2	0.1	1.5	0.1	8.8	0.1
合 計	本年	269.7	1.2	722.0	3.1	28.0	0.1	87.2	0.4	181.8	0.7
	平年	384.8	1.7	561.0	2.3	6.8	0.1	59.1	0.3	39.8	0.2

		フタオビコヤガ		イネヨトウ		斑点米カメムシ類		イネクロカメムシ		スクミリンゴガイ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	10.8	0.4	21.6	0.8	540.9	31.3	27.0	1.0	54.1	2.1
	平年	2.8	0.1	10.8	0.4	526.6	41.1	5.4	0.2	200.8	11.2
中央部	本年	0.0	0.0	348.8	2.6	3,052.4	52.0	87.2	0.7	697.7	9.9
	平年	10.1	0.1	8.6	0.1	2,696.4	37.0	13.4	0.1	1,227.1	14.3
中西部	本年	0.0	0.0	140.8	5.4	657.0	48.2	0.0	0.0	46.9	3.6
	平年	0.0	0.0	3.3	0.1	551.3	36.1	0.0	0.0	199.7	10.8
西 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	1,102.5	39.1	183.8	3.1	0.0	0.0
	平年	2.7	0.1	0.4	0.1	1,267.8	39.1	2.9	0.1	147.6	2.6
合 計	本年	10.8	0.1	511.2	2.1	5,352.8	46.2	298.0	1.2	798.7	6.0
	平年	15.6	0.1	23.1	0.1	5,042.1	37.8	21.7	0.1	1,775.2	10.7

栽培面積 東部 649ha 中央部 3,314ha 中西部 657ha 西部 1,470ha 合計 6,090ha

(2) 普通期稲

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		葉いもち		紋枯病		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ		ヒメビウンカ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	25.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.2	0.0	0.0
	平年	60.8	5.5	0.7	0.1	1.9	0.2	28.5	2.0	19.3	1.6
中央部	本年	412.7	9.3	2.6	0.1	207.7	4.4	78.9	1.7	10.5	0.2
	平年	334.3	8.6	4.2	0.1	54.7	1.2	77.2	1.7	31.2	0.7
中西部	本年	1,142.0	16.3	5.7	0.1	378.8	4.9	33.9	0.4	25.4	0.4
	平年	837.2	12.2	5.9	0.1	124.2	1.5	71.7	0.9	34.9	0.4
西 部	本年	706.3	35.4	20.9	0.6	100.3	3.0	392.9	14.0	62.7	1.9
	平年	418.1	18.3	15.6	0.5	79.2	2.4	138.3	4.5	29.0	0.9
合 計	本年	2,286.3	16.8	29.2	0.2	686.8	4.0	509.3	3.2	98.6	0.6
	平年	1,650.4	11.9	26.4	0.2	260.0	1.5	315.7	1.9	114.4	0.7

		セジロウンカ		トビイロウンカ		コブノメイガ		イネヨトウ		フタオビコヤガ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	7.2	0.5	8.4	0.6	26.5	1.8	0.0	0.0	3.6	0.2
	平年	48.8	3.5	0.0	0.0	12.8	0.9	0.0	0.0	0.6	0.1
中央部	本年	139.3	3.2	7.9	0.2	7.9	0.2	65.7	1.4	2.6	0.1
	平年	122.1	2.7	0.8	0.1	17.0	0.4	0.0	0.0	4.0	0.1
中西部	本年	282.7	3.3	5.7	0.1	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	302.4	3.7	2.8	0.1	70.3	0.8	0.0	0.0	0.6	0.1
西 部	本年	376.2	12.5	0.0	0.0	125.4	3.9	0.0	0.0	16.7	0.5
	平年	279.1	8.7	3.1	0.1	51.5	1.6	0.0	0.0	22.5	0.7
合 計	本年	805.4	4.8	22.0	0.1	162.6	1.0	65.7	0.4	22.9	0.1
	平年	752.4	4.3	6.7	0.1	151.6	0.9	0.0	0.0	27.7	0.2

(2) 普通期稲(続き)

普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		イチモンジセセリ		イネクロカメムシ		スクミリンゴガイ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	1.2	0.1	0.0	0.0	150.4	10.4
	平年	0.2	0.1	9.3	0.7	197.5	20.1
中央部	本年	2.6	0.1	65.7	1.4	197.1	6.9
	平年	2.2	0.1	6.6	0.1	150.5	5.1
中西部	本年	11.4	0.2	0.0	0.0	141.3	1.7
	平年	4.8	0.1	14.1	0.2	225.6	3.9
西 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	209.0	12.5
	平年	1.7	0.1	0.0	0.0	164.4	5.3
合 計	本年	15.2	0.1	65.7	0.4	697.8	5.8
	平年	8.9	0.1	30.0	0.2	738.0	5.8

栽培面積 東部 361ha 中央部 1,183ha 中西部 2,120ha 西部 836ha 合計 4,500ha

2. カンキツ(温州ミカン,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

		そうか病		黒点病		かいよう病		ミカンハダニ		アブラムシ類	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部 (温州)	本年	68.6	5.4	160.1	12.5	10.0	0.8	137.3	25.0	0.0	0.0
	平年	45.3	3.9	121.7	11.1	0.0	0.0	121.7	15.8	32.1	3.9
東 部 (中晩柑類)	本年	8.8	0.3	104.2	3.3	17.6	0.5	302.4	9.4	146.8	14.0
	平年	93.0	2.9	131.4	4.1	14.0	0.4	256.1	22.7	103.3	6.8
中央部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	371.0	14.3	0.0	0.0	265.0	22.4	0.0	0.0
	平年	0.2	0.0	360.4	26.3	25.3	1.0	259.6	24.5	10.6	0.4
中西部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	293.1	30.4	0.0	0.0	335.0	64.3	0.0	0.0
	平年	20.9	0.9	280.5	15.9	37.7	1.6	284.8	42.7	8.8	1.4
西 部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	333.0	14.3	0.0	0.0	333.0	14.3	0.0	0.0
	平年	16.3	0.7	84.7	4.0	16.3	0.7	106.8	7.7	8.5	0.4
中晩柑類計	本年	8.8	0.1	1,101.3	14.5	17.6	0.2	1,235.4	26.0	146.8	4.3
	平年	130.4	1.2	857.0	12.2	93.3	0.9	907.3	24.3	131.2	2.6
カンキツ計	本年	77.4	5.4	1,261.4	27.0	27.6	0.9	1,372.7	51.0	146.8	4.3
	平年	175.7	5.1	978.7	23.3	93.3	0.9	1,029.0	40.1	163.3	6.5

		ミカンハモグリガ		アザミウマ類	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部 (温州)	本年	45.8	3.6	22.9	1.8
	平年	60.9	8.3	0.1	0.0
東 部 (中晩柑類)	本年	311.2	10.5	0.0	0.0
	平年	214.5	12.6	0.3	0.0
中央部 (中晩柑類)	本年	106.0	4.1	0.0	0.0
	平年	90.1	4.7	0.7	0.0
中西部 (中晩柑類)	本年	209.4	8.9	0.0	0.0
	平年	108.8	7.1	55.8	2.4
西 部 (中晩柑類)	本年	166.6	14.3	0.0	0.0
	平年	57.3	4.2	6.1	0.3
中晩柑類計	本年	793.2	9.4	0.0	0.0
	平年	470.7	7.5	62.9	0.6
カンキツ計	本年	839.0	13.0	22.9	1.8
	平年	531.6	15.9	63.0	0.6

温州ミカン:栽培面積 中央部 183ha

中晩柑類:栽培面積 東部 458ha 中央部 371ha 中西部 335ha 西部 333ha 合計 1,497ha

3. ナシ 主要病害虫の発生面積(ha)

		炭疽病	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部	本年	50.0	42.7
	平年	2.6	1.2

栽培面積 中央部 50ha

4. 青ネギ





主要病害虫の発生面積(ha)

		さび病		べと病		ネギアザミウマ		シロイチモジヨトウ		ネギコガ	
		発生面積(ha)	発病株率(%)	発生面積(ha)	発病株率	発生面積(ha)	発生程度	発生面積(ha)	発生虫数	発生面積(ha)	寄生虫数(%)
中央部	本年	7.5	0.4	31.8	3.6	53.0	48.6	21.2	7.6	8	0.8
	平年	7.5	2.3	5.3	2.8	50.9	29.5	17.0	3.7	8.2	0.5





栽培面積 中央部 53ha

V. トラップ調査





1. ハスモンヨトウ






2. アブラムシ



3.果樹カメシ類



4.オオタバコガ



5.タバコガ

