

各関係機関長 様

高知県病虫害防除所

病虫害発生予察情報について

令和8年度病虫害発生予察8月月報及び令和8年度予報第6号(9月)を送付します。

令和8年度病虫害発生予察8月月報

I. 気象概況 (8月)

半 旬	平均気温		最高気温		最低気温		降 水 量		日照時間	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
1	30.0	28.2	35.2	32.4	26.2	24.8	6.5	58.7	40.1	34.5
2	29.1	28.2	33.9	32.4	25.1	24.8	13.5	53.2	37.0	34.1
3	27.7	28.1	33.0	32.3	23.9	24.8	7.5	49.7	32.9	32.9
4	27.3	27.9	31.9	32.1	23.9	24.5	61.0	44.4	32.2	32.3
5	29.3	27.6	33.9	31.9	25.3	24.2	1.0	38.5	59.6	31.9
6	29.4	27.2	33.3	31.5	26.5	23.7	4.5	54.8	40.6	36.5
合計及び平均	28.8	27.9	33.5	32.1	25.2	24.5	94.0	299.3	242.4	202.2

アメダスデータ(高知市)

平年比

旬 別	平均気温	降 水 量	日照時間
上旬	かなり高い	少ない	平年並
中旬	低い	平年並	平年並
下旬	かなり高い	かなり少ない	多い
月平均	高い	少ない	多い

気象分布図(高知地方気象台提供)から抜粋

II. 作物生育概況

1. 水稻

普通期稲 出穂期～黄熟期 時期:並 生育:並

生育は概ね順調。出穂時期は、吟の夢で8月第2半旬頃、ヒノヒカリとにこまるで8月第3～4半旬頃、収穫時期は9月中旬以降と見込まれており、平年並となる見込みである。7、8月の降水量が平年より少なく、一部ほ場では生育遅れが見られる。少雨による収量への影響が懸念される。

2. カンキツ類

果実肥大期 時期:並 生育:並～やや不良

温州ミカン果実肥大、着果量ともに平年並である。文旦の果実肥大は7月まで順調であったが、8月以降の少雨によりやや小玉傾向となっている。着果量は生理落果が多かったことや裏年により、平年並～やや少ない。ユズの果実肥大は概ね順調であり、着果量は生理落果が多かったため、平年並～やや少ない。いずれも高温による日焼け果が発生している。また、葉の退色や黄化が見られるほ場があり、少雨による影響と考えられる。

3. 新高ナシ

果実肥大期 時期:並 生育:並

果実肥大は平年並、着果量は平年並～やや少なくなっている。8月末時点の積算温度は平年より高く、向こう1ヶ月の気温も高いと予想されることから、収穫開始時期は平年(9月24日)より早くなる見込み。早生品種で果樹カメムシ類による果実の吸汁被害が確認されている。

4. 青ネギ

生育期 時期:並 生育:並

高温による葉先枯れなど、生育への影響が懸念されたが、概ね順調に生育している。

Ⅲ. 病虫害発生概況

作物名	病虫害名	全般		東部		中央部		中西部		西部	
		面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度	面積	程度
水稻 ＜普通期稲＞	葉いもち	多	高	平年並	やや低	多	高	多	高	平年並	平年並
	穂いもち	多	高	—	—	—	—	多	高	—	—
	紋枯病	多	高	—	—	多	高	やや多	平年並	多	高
	ごま葉枯病	平年並	平年並	少	低	平年並	平年並	やや少	やや低	やや多	高
	ツマグロヨコバイ	やや多	やや高	やや多	やや高	多	高	—	—	多	高
	ヒメビウンカ	多	高	多	高	少	低	平年並	平年並	多	高
	セジロウンカ	多	高	多	高	多	高	多	高	平年並	やや低
	トビイロウンカ	やや少	やや低	多	高	—	—	平年並	平年並	—	—
	コブノメイガ	多	高	多	高	少	低	少	低	多	高
	斑点米カメムシ類	平年並	平年並	平年並	やや低	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	高
	イネヨトウ	多	高	—	—	多	高	—	—	—	—
	フタオビコヤガ	多	平年並	—	—	多	平年並	—	—	多	高
カンキツ ＜温州ミカン＞	いちょう病	多	高			多	高				
	ミカンハダニ	平年並	高			平年並	高				
	その他カイガラムシ	多	高			多	高				
	アブラムシ類	平年並	やや高			平年並	やや高				
	そうか病	少	低			少	低				
	黒点病	少	低			少	低				
カンキツ ＜中晩柑類＞	いちょう病	多	やや高	少	低	多	高	—	—	—	—
	ミカンハダニ	多	高	やや多	平年並	やや多	平年並	多	高	多	高
	ミカンハモグリガ	平年並	平年並	やや多	低	—	—	平年並	平年並	多	高
	アブラムシ類	やや少	低	平年並	低	—	—	—	—	—	—
	アザミウマ類	多	高	—	—	—	—	—	—	多	高
	炭疽病	多	高			多	高				
	カメムシ類	多	高			多	高				
ナシ	軟腐病	多	平年並			多	平年並				
	ネギアザミウマ	多	高			多	高				
	シロイチモジヨトウ	多	高			多	高				

トラップ調査※	害虫名	全般	東部	中央部 (香美)	中央部 (南国)	中西部	西部
	ハスモンヨトウ	平年並	やや多		やや少	平年並	平年並
	アブラムシ	平年並	少		多	やや少	少
	果樹カメムシ類	多	多	多		多	多
	オオタバコガ	多	多		多		少
	タバコガ	やや少	やや多		少		少

※各害虫の詳細な発生推移については、病虫害防除所のホームページに掲載していますので参照ください。

IV. 主要病害虫の発生面積

1. 水稻

(1) 普通期稲 普通期稲における主要病害虫の発生面積(ha)

		葉いもち		穂いもち		紋枯病		ごま葉枯病		ツマグロヨコバイ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	44.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.2	73.4	5.1
	平年	40.0	4.0	0.9	0.1	15.3	1.2	22.1	1.6	54.4	4.0
中央部	本年	194.5	4.8	0.0	0.0	144.5	3.3	667.7	16.1	47.3	1.0
	平年	126.9	3.2	5.3	0.1	31.2	1.0	667.9	17.9	31.2	0.7
中西部	本年	768.9	10.1	203.5	2.4	42.4	0.5	921.5	14.6	0.0	0.0
	平年	293.0	4.1	18.0	0.2	32.7	0.4	1,274.5	19.5	69.6	0.8
西 部	本年	229.9	9.9	0.0	0.0	137.9	4.9	681.4	32.4	213.2	7.5
	平年	258.7	9.6	0.0	0.0	81.7	2.9	500.0	19.6	108.9	3.5
合 計	本年	1,237.8	8.1	203.5	1.1	324.8	2.0	2,274.2	17.2	333.9	2.1
	平年	718.6	4.9	24.2	0.1	160.9	1.1	2,464.5	17.7	264.1	1.5

		ヒメビウンカ		セジロウンカ		トビイロウンカ		コブノメイガ		斑点米カメムシ類	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	49.3	4.2	81.8	5.7	43.3	3.0	239.4	22.4	331.0	37.5
	平年	16.8	1.4	55.3	3.9	3.7	0.3	28.8	2.6	337.5	47.5
中央部	本年	28.9	0.6	186.6	5.0	0.0	0.0	44.7	0.9	985.9	52.8
	平年	76.0	1.6	80.3	1.7	41.0	0.9	89.8	2.3	1,134.8	54.7
中西部	本年	76.3	1.2	667.1	9.6	62.2	0.7	14.1	0.2	1,413.3	35.0
	平年	90.3	1.1	315.2	3.8	68.4	0.8	106.2	1.4	1,723.3	31.8
西 部	本年	213.2	8.1	255.0	7.6	0.0	0.0	384.5	16.7	836.0	62.5
	平年	74.0	2.3	296.0	9.8	44.8	1.4	97.4	3.5	752.5	40.6
合 計	本年	367.7	2.6	1,190.5	7.7	105.5	0.6	682.7	5.2	3,566.2	45.0
	平年	257.1	1.5	746.8	4.4	157.9	0.9	322.2	2.1	3,948.1	40.7

		イネヨトウ		フタオビコヤガ		イチモンジセセリ		イネクロカメムシ		スクミリンゴガイ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
東 部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.2	38.5	2.7
	平年	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	6.0	0.8	100.9	11.4
中央部	本年	131.4	2.8	5.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	197.2	8.3
	平年	0.0	0.0	1.8	0.1	0.5	0.1	6.6	0.1	171.8	4.7
中西部	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	0.8
	平年	9.1	0.1	0.5	0.1	1.7	0.1	0.0	0.0	268.5	4.2
西 部	本年	0.0	0.0	8.4	0.3	4.2	0.1	0.0	0.0	627.0	31.3
	平年	0.0	0.0	2.5	0.1	0.9	0.1	0.5	0.1	248.9	9.4
合 計	本年	131.4	0.7	13.7	0.1	4.2	0.1	3.0	0.1	933.4	8.6
	平年	9.1	0.1	5.1	0.1	3.2	0.1	13.1	0.1	790.1	5.9

栽培面積 東部 361ha 中央部 1,183ha 中西部 2,120ha 西部 836ha 合計 4,500ha

2. カンキツ(温州ミカン,中晩柑類)

主要病害虫の発生面積(ha)

		そうか病		黒点病		かいよう病		ミカンハダニ		その他カイガラムシ	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部 (温州)	本年	22.9	1.8	68.7	8.9	68.6	5.4	137.3	28.6	22.9	1.8
	平年	43.0	3.7	146.5	16.6	11.4	0.9	129.9	16.7	2.3	0.2
東 部 (中晩柑類)	本年	8.8	0.3	172.2	5.4	4.4	0.1	171.8	5.4	0.0	0.0
	平年	41.3	1.3	253.8	8.7	16.4	0.5	126.9	6.7	0.6	0.0
中央部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	371.0	18.4	159.0	6.1	318.0	12.2	0.0	0.0
	平年	5.3	0.2	371.0	31.1	46.5	1.8	255.6	15.1	12.1	0.5
中西部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	335.0	32.1	0.0	0.0	335.0	50.0	0.0	0.0
	平年	22.6	1.0	301.5	21.8	33.5	1.8	242.9	21.6	1.2	0.1
西 部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	333.0	14.3	0.0	0.0	166.5	7.1	0.0	0.0
	平年	12.5	0.5	105.2	4.9	15.2	0.7	58.6	2.5	0.0	0.0
中晩柑類計	本年	8.8	0.1	1,211.2	16.6	163.4	1.6	991.3	17.5	0.0	0.0
	平年	81.7	0.8	1,031.5	16.3	111.6	1.1	684.0	11.2	13.9	0.1
カンキツ計	本年	31.7	1.9	1,279.9	25.5	232.0	6.9	1,128.6	46.0	22.9	1.8
	平年	124.7	4.5	1,178.0	32.9	123.0	2.0	813.9	27.8	16.2	0.3

		ミカンハモグリガ		アブラムシ類		アザミウマ類	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部 (温州)	本年	0.0	0.0	22.9	5.4	0.0	0.0
	平年	64.1	8.2	23.1	4.1	8.6	0.7
東 部 (中晩柑類)	本年	293.6	9.2	57.3	1.8	0.0	0.0
	平年	231.5	17.5	66.1	3.4	0.7	0.0
中央部 (中晩柑類)	本年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	74.2	2.9	5.3	0.2	0.0	0.0
中西部 (中晩柑類)	本年	125.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年	117.7	6.1	12.6	1.8	41.9	1.8
西 部 (中晩柑類)	本年	166.6	14.3	0.0	0.0	83.3	3.6
	平年	71.2	4.8	6.8	0.4	4.2	0.2
中晩柑類計	本年	585.8	7.2	57.3	0.5	83.3	0.8
	平年	494.6	8.5	90.8	1.6	46.8	0.4
カンキツ計	本年	585.8	7.2	80.2	5.9	83.3	0.8
	平年	558.7	16.7	113.9	5.7	55.4	1.1

温州ミカン:栽培面積 中央部 183ha

中晩柑類:栽培面積 東部 458ha 中央部 371ha 中西部 335ha 西部 333ha 合計 1,497ha

3. ナシ 主要病害虫の発生面積(ha)

		炭疽病		カメムシ類	
		発生面積(ha)	平均発生程度(%)	発生面積(ha)	平均発生程度(%)
中央部	本年	50.0	33.3	10.0	5.7
	平年	31.6	20.1	0.6	0.2

栽培面積 中央部 50ha

4. 青ネギ





主要病害虫の発生面積(ha)

		軟腐病		ネギアザミウマ		シロイチモジヨトウ	
		発生面積(ha)	発病程度	発生面積(ha)	発生程度	発生面積(ha)	発生虫数
中央部	本年	1.1	0.1	53.0	54.2	31.8	5.2
	平年	0.4	0.1	47.5	32.6	21.3	3.7





栽培面積 中央部 53ha

V. トラップ調査





1. ハスモンヨトウ






2. アブラムシ



3. 果樹カメムシ類



4. オオタバコガ



5. タバコガ

