8 高 農 セ 第 2 8 5 号
令 和 8 年 9 月 24 日

関係各位

高知県病害虫防除所長

令和8年度病害虫発生予察技術情報第12号

鱗翅目害虫(ハスモンヨトウ、オオタバコガ、タバコガ)の発生状況について

ハスモンヨトウ(写真 1)のフェロモントラップによる 8 月までの誘殺数は、東部、西部で平年を上回っており(表 1)、9 月に入っても西部では平年よりも多い発生で推移しています(図 1)。また、8 月に実施した調査では、サトイモ 50 株あたりの卵塊数は、西部で平年よりも多くなっており、8 月下旬の調査では中央部においても平年より多くなっています(表 2)。

オオタバコガ(写真 2)のフェロモントラップによる 8 月までの誘殺数は、東部、中央部で平年を大きく上回っており(表 1)、9 月に入っても中央部では同様の傾向で推移しています(図 1)。

タバコガ(写真 3)のフェロモントラップによる 8 月までの誘殺数は、東部で平年を上回る発生が続いていましたが(表 1)、9 月に入ってからはいずれの地域も平年を下回っています(図 1)。

気象庁の 1 か月予報(9 月 24 日発表)では、向こう 1 か月の気温は平年よりも高いと予想されており、本虫の増殖に好適な条件が続くことから、発生が多くなると予想されます。

施設果菜類は定植中から終わっているものまでありますが、すでに本虫が多発しているほ場が見られており、被害も確認されています。今後の発生状況に十分注意し、適切な防除対策を行ってください。

薬剤防除に当たっては、県の「病害虫防除指針(高知県農薬情報システム内)」を参照し、農薬使用基準の遵守及び周辺農作物等への飛散防止対策の徹底をお願いします。

県農薬情報システム http://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/haishinfile/list/kochi



写真 1　ハスモンヨトウの幼虫(上)と卵塊(下)



写真 2　オオタバコガの幼虫



写真 3　タバコガの幼虫

表１　フェロモントラップにおける鱗翅目害虫の発生状況(4 月～8 月)

ハスモンヨトウ

地域		4月	5月	6月	7月	8月	合計
東部	**本年**	**234**	**234**	**642**	**747**	**948**	**2805**
(安芸市)	平年	155.6	320.5	385.0	659.6	761.5	2282.2
中央部	**本年**	**75**	**85**	**205**	**163**	**369**	**897**
(南国市)	平年	79.0	156.8	159.5	289.9	494.4	1179.6
中西部	**本年**	**18**	**78**	**74**	**215**	**397**	**782**
(須崎市)	平年	22.1	85.1	138.7	217.8	408.1	871.8
西部	**本年**	**143**	**129**	**357**	**313**	**278**	**1220**
(四万十市)	平年	78.8	149.2	133.9	116.8	232.9	711.6

オオタバコガ

地域		4月	5月	6月	7月	8月	合計
東部	**本年**	**61**	**27**	**108**	**98**	**144**	**438**
(安芸市)	平年	9.3	12.8	30.5	37.9	45.4	135.9
中央部	**本年**	**55**	**32**	**80**	**83**	**120**	**370**
(南国市)	平年	13.4	16.5	28.7	33.4	27.1	119.1
西部	**本年**	**27**	**14**	**25**	**4**	**2**	**72**
(四万十市)	平年	18.3	23.8	24.6	16.7	20.7	104.1


タバコガ

地域		4月	5月	6月	7月	8月	合計
東部	**本年**	**12**	**37**	**34**	**28**	**51**	**162**
(安芸市)	平年	1.7	14.8	18.3	19.3	41.4	95.5
中央部	**本年**	**11**	**47**	**17**	**19**	**32**	**126**
(南国市)	平年	4.0	15.4	7.6	21.3	56.1	104.4
西部	**本年**	**1**	**7**	**3**	**1**	**3**	**15**
(四万十市)	平年	1.3	5.2	5.1	6.1	10.2	27.9


※数字は各月の誘殺数の合計。

平年値は過去 10 年間（令和 7 年～平成 28 年）の平均値を示す

ハスモンヨトウ



オオタバコガ



タバコガ




図１　フェロモントラップによる鱗翅目害虫の誘殺数の推移

表２　サトイモにおけるハスモンヨトウの卵塊調査結果(卵塊数/50 株)

時期	地域	調査年 / 調査地点	令和8年(2026) 調査日(平年値)	令和8年(2026) 卵塊数	令和７年(2025) 調査日(平年値)	令和７年(2025) 卵塊数	令和６年(2024) 調査日	令和６年(2024) 卵塊数	令和５年(2023) 調査日	令和５年(2023) 卵塊数
8月上旬	東部	安芸市　川北	8/7	1.0	8/4	5.0	8/8	7.0	8/9	10.0
		安芸市　伊尾木	8/7	1.0	8/4	12.0	8/8	3.0	8/3	15.0
		安芸市　穴内	8/7	4.0	8/4	10.0	8/8	1.0	8/3	32.0
		平均	(5.1)	2.0	(4.3)	9.0		3.7		19.0
	中央部	越知町　今成	8/6	1.0	8/6	0.5	8/8	0.0	8/7	0.5
		いの町　枝川	8/6･7	0.0	8/6	0.5	8/8	0.0	8/7	0.0
		平均	(0.9)	0.5	(0.8)	0.5		0.0		0.3
	中西部	須崎市　下分･上分	8/4	0.0	8/8	4.5	8/14	0.0	8/3	5.0
		津野町　三間川	8/4	0.0	8/8	1.0	8/14	2.0	8/3	0.0
		中土佐町 上ノ加江	8/3	0.5	8/8	4.0	8/14	5.0	8/3	0.0
		平均	(1.8)	0.2	(1.5)	3.2		2.3		1.7
	西部	四万十市 入田	8/5	2.0	8/7	2.5	8/4	2.5	8/4	3.5
		四万十市 間崎	8/5	4.5	8/7	6.5	8/4	2.5	8/4	5.5
		平均	(1.5)	3.3	(1.5)	4.5		2.5		4.5
	県内平均		(2.5)	1.4	(2.2)	4.7		2.3		7.2
8月中旬～下旬	東部	安芸市　川北	8/28	8.0	8/21	0.0	8/26	4.0	8/28	11.0
		安芸市　伊尾木	8/28	1.0	8/21	1.0	8/26	2.0	8/28	12.0
		安芸市　穴内	8/28	4.0	8/21	15.0	8/26	7.0	8/28	10.0
		平均	(5.8)	4.3	(5.4)	5.3		4.3		11.0
	中央部	越知町　今成	8/19	6.0	8/20	0.0	8/21	1.5	8/21	0.5
		いの町　枝川	8/19	1.0	8/20	0.0	8/21	0.0	8/21	0.0
		平均	(2.3)	3.5	(2.4)	0.0		0.8		0.3
	中西部	須崎市　上分	8/26	0.0	8/27	0.5	8/27	7.0	8/31	7.0
		津野町　三間川	8/26	0.0	8/27	0.0	8/27	6.0	8/31	6.0
		中土佐町 上ノ加江	8/26	2.5	8/27	1.5	8/27	2.5	8/31	3.0
		平均	(3.7)	0.8	(4.1)	0.7		5.2		5.3
	西部	四万十市 入田	8/26	9.5	8/29	4.5	8/26	8.5	8/21	1.0
		四万十市 間崎	8/26	4.5	8/29	9.0	8/26	8.0	8/21	4.0
		平均	(3.6)	7.0	(3.3)	6.8		8.3		2.5
	県内平均		(4.0)	3.7	(4.0)	3.2		4.7		5.5

注１）平年値は過去10年（令和7年～平成28年）の平均値を示す
注２）調査地点変更：四万十市入田（令和5年までは四万十市鍋島で調査）
：安芸市穴内（令和7年までは僧津で調査）

お問合せは、病害虫防除所(TEL：088-863-1132)または環境農業推進課(TEL：088-821-4861)まで